




VERMONE B. 9







Handwritten signature or initials in the top right corner.

N. d' inventario

8243

Note di Botanica



8243

Note to Botany

81.5. III

Tab.
54
f. 4.

Tab.
58.
fig. 1.
page

Lichen-Agaricus.



Ordo I. Pag. 104.

Lichenes agarici erecti, ramosi, & non ramosi.

1. Lichen-agaricus nigricans, ligno adnascens, plerumque multifidus, & compressus, in parte villosus, summa vero glaber, albidus, et pulverulentus
Tab. 55. f. 1. Clavaria hypoxylon Linn.

In putrescentibus lignis.

2. Lichen-agaricus, qui Licophyptoides terrestris, digitatus, nigrum (Tab. 54. f. 4)

3. Lichen-agaricus nigricans, cypressiformis, ramosus, & non ramosus, lignis aridis adnascens Tab. 55. Fig. 2.

In Quercineis lignis.

- Tab. 54. f. 4. 4. Lichen-Agaricus terrestris, digitatus, niger, apicibus albo-rufis, seminibus griseis, undique confertis conspersis, radice membranacea, longissima, varie divaricata, & implexa.

In umbrosis ambularis, ubi radicem suam usque ad cubitalem longitudinem in humo demittit.

Ordo II.

Lichenes-agarici, alii tuberosi, alii crustacei, receptaculis florum vel supra, vel infra superficiem locatis.

Lichen-Agaricus tuberosus, niger, Agarici officinalis facie, cortice nitido, et fere splendente.

Ad segetarum arborum caudices erit.

- Tab. 55. fig. 1. 2. Lichen-agaricus crustaceus, initio subhirsutus, & olea condita coloris, per siccitatem glaber, niger, & veluti deustus, receptaculis florum mammiformibus elegantissimis.

pag. 105. Ad emortuas Lauri radices &c.

*Hypoxylon
ustulatum
Bulliard.*

3. *Lichen-agaricus crustaceus, crassus, Boonium renem &c. Vid. Bull. p. 30.* Tab. 54. Fig. 1.
Ad emortuas fagi radices frequens in Vallepidii.

4. *Lichen-agaricus crustaceus, crassus, lignis emortuis adnascens, albus.*
Ad putrida Castanearum ligna.

5. *Lichen-agaricus crustaceus, niger, et veluti densus, sub soluta ^{Castanearum} arborum dejectarum cute innascens, capsulis oblongis, cylindraceis et late se diffundens.*

6. *Lichen-agaricus crustaceus, niger, et veluti densus, sub soluta arborum dejectarum cute innascens, capsulis oblongis, cylindraceis.*

7. *Lichen-agaricus, obscurus, in arborum corticibus, et praecipue ad Flices innascens, superficie savi, et veluti subhirsuta.* Tab. 55. Fig. 2.

Variolaria punctata Bull. 8. *Lichen-agaricus, bullatus, parvus, ex obscuro-nigricans. &c.* ... Tab. 54. f. 2.
In corticibus Fagi.

9. *Lichen-agaricus terrestris, scutatus, albus. ... In agnis Martis.* Tab. 54. f. 3.

Ordo III.

Lichenes-agarii non crustacei, sed cespitosi; receptaculis florum in superficie.

1. *Lichen-agaricus cespitosus, acaulis, nigricans sub cute Anagyridis non foetidae erumpens.* T. 54. f. 5.

2. *Lichen-agaricus ~~non~~ cespitosus, acaulis, ruber, sub cute Anagyrinis foetidae erumpens.*

3. *Lichen-agaricus cespitosus, acaulis, ruber, in Abietum corticibus innascens, receptaculis florum sphaericis & artidis.*

4. *Lichen-agaricus cespitosus, acaulis, ex rubro-ferrugineus, in arborum castris innascens. Ad Ulmos, et Castaneas plerumque oritur.*

5. *Lichen-agaricus cespitosus, acaulis, nigricans, et dum sub arborum cute erumpit, pulvisculo farinaceo, quo est involutus se se exonerat.*

In variis arborum exsiccatarum ramis.

Lichenoides

1. *Lichenoides crustaceum, arboribus adnascens, tenuissimum, ex cinereo-nigrum, capsulis majoribus et rarioribus.* T. 56. Fig. 1.

In sylvis ad arbores, et praecipue ad Coriflos.

pag. 106. 2. *Lichenoides crustaceum, arboribus adnascens, tenuissimum, ex cinereo-album, capsulis majoribus, crebris.*

pag. 106. 3. Lichenoides crustaceum, arboribus adnascens, tenuissimum, ex cinereo-rufum, Tab. 56.
Capsulis exiguis, crebris . . . fig. 2.

Agaricum.

Ordo I.

p. 107. Agarica duplici substantia praedita, quorum pars inferior a superiori facile separa-
bilis, & innumeri, cylindraceis, angustissimis, et in ore marginatis tubulis inter se se-
gregabilibus composita, in quibus continentur ovata, et minutissima semina, ut in
Sullo demonstrabimus.

p. 117. Agaricum esculentum, castaneae adnascens, latissimum, hepatis facie, superne ex
rubro-ferrugineum, interne sanguineum, subus ochroleucum. Tab. 60.

Ordo II. Boletus Linn. Bulliard.

p. 118. Agarica simpliciter substantia, quorum inferior pars in nonnullis speciebus breviter, in aliis
altius perforata, in omnibus vero ex angustissimis et cylindraceis tubulis invicem con-
junctis, ut in Anurina Indica facta constat, quibus tubulis adherent semina.

1. Agaricum igniarium, Agarici officinalis facie, sed non amarum, superne ex
albo-cinereum, et glabrum, inferne primum ejusdem coloris, deinde obscurum, argutissi-
me & densissime perforatum, foraminulis rotundis

Agar. pedis Equini facie. Tourn. F. R. H. 562.

Fungus in caudicibus nascens unguis equini figura. C. B. Pin. 372.

2. Agaricum Quercubus, & Illicibus adnascens, ferrugineum & glabrum, inferne
album, & argutissime, & densissime perforatum, foraminulis rotundis. Esca bastarda.

3. Agaricum Qelsis, seu Moris adnascens, ex obscuro-ferrugineum, inferne al-
bum, tenuissime, et densissime perforatum, foraminulis rotundis. Lingua di Moro cattiva.

4. Agaricum Quercubus & Illicibus adnascens figura varians, superne ferrugi-
neum, inferne album, & argutissime & densissime perforatum, foraminulis rotundis.

Fungus Ventilabii figuram habens. Aldrov. Dendr. 120. Lingua lignosa di quercia gambara.

5. Agaricum flabelliforme, superne e rufo-flavum, cute laevia, & veluti
subhirsuta, inferne album, et tenuissime porosum, foraminulis rotundis, pediculo bre-
viori ad latera donatum. Lingua di Cerro.

Augusto. Ad Cerros, & ad alias glandiferas arbores erumpit.

Vol. hirsutus 6. Agaricum squamosum, Illicibus, Lauris, et Oxijacanthae plerumque in-
Scopoli - nascens, superne hirsutum, et obscurum, subus ex fulvo-aureum, densissime, et te-
nissime perforatum, foraminulis rotundis, brevissimis.

Pag. 118. 7. Agaricum Gelsis, seu Moris adnascens, squamosum, & lignosum sordide luteum ubique, superne subhirsutum, inferne tenuissime, densissime, & breviter perforatum, foraminulis rotundis.

8. Agaricum tuberosum, crassum, odoratum, tenacioris substantiæ, intus & extra egriseo-rufescens, inferne tenuissime, densissime, & superficialiter perforatum, foraminulis rotundis. — Ad Ulmorum radices, iuxta aqueas foveas.

Pag. 119. 9. Agaricum tuberosum, durum, Prunis, aut Malis adnascens, initio album, deinde e fulvo-flavescens, inferne perbrevis, rotundis, atque angustissimis foraminulis munitum. — In Pomariis, atque in agris ad prædictas arbores in.

10. Agaricum Esculentum, flabelliforme, superne fulvum, cute laeva, & veluti squamosa, inferne album, tenuissime, densissime, ac rotunde perforatum, pediculo concolore, obeso. — Septembri & Martio fici, tum in hortis, tum in agris arumgit.

11. Agaricum squamosum, superne sericeum, & versicolor, inferne album, foraminulis brevibus, densissimis, angustissimis, et quasi pentagonis.

12. Agaricum squamosum, & bichenosum, superne hirsutum, & album, inferne griseo-plumbeum, foraminulis rotundis, densissimis, brevissimis, ac peræquis.

13. Agaricum squamosum, cespitosum, Esculentum, cristatum, & laciniatum superne obscurum, inferne album, foraminulis brevissimis, rotundis, exiguis, ac densioribus. — Autumnalis. — Garvel. icon. 1272?

14. Agaricum squamosum, superne album, & villosum parvi coloris, inferne aurum, tenuissime, ac densissime perforatum, foraminulis brevissimis, rotundis. — Autumno.

15. Agaricum squamosum, superne album & villosum, inferne caeruleum, tenuissime, ac densissime perforatum, foraminulis brevissimis, rotundis.

16. Agaricum squamosum, albidum, superne villosum, & per longitudinem sulcatum, inferne foraminulis rotundis, angustis, brevibus, ac densis.

17. Agaricum squamosum, superne villosum, per longitudinem sulcatum, album, inferne dilute griseum, & foraminulis rotundis densissimis, ac minutissimis insculptum. Ad Pyros veteres. februario.

18. Agaricum crustaceum, placensiforme, superficie in semiglobulos veluti subdivisa, foraminulis rotundis, et densioribus.

19. Agaricum Gelsis, seu Moris adnascens, subpurpureum, superne hirsutum, inferne porosum, foraminulis angustis, rotundis. — Pellicia di Re.

pag. 119.

Ordo III.

Boletus
Laricis

Agaricia simplicis Substrata, quorum inferior pars, modo late, modo anguste
& varie perforata, in ipsius foraminulis autem adherent semina ut supra.

Agaricum, sive fungus Laricis.

Tab. 61.

pag. 120. 2. Agaricum cespitosum, maximum, esculentum, Abiesibus adnascens,
Superne rufescens, & veluti filamentorum, inferne album, varie, et argute
perforatum. — Autumni tempore.

3. Agaricum Dadales Sinubus excavatum. In dom. quam in spont.
Arboribus nascitur.

4. Agaricum esculentum, Galsis, seu Moris adnascens, luteum, tinc-
torium, Superne villosum, inferne subasperum, alius perforatum, forami-
nulis angustis, et ore inequalibus.

Rustici Mulieres non solum hoc Agaricum coquunt ad Esu, sed
etiam ad pannos lineos, colore sordide luteo tingendos: ideoque dicitur
Lingua di Moro bona attingere, e a mangiare.

5. Agaricum tuberosum, esculentum, album, inferne brevissime, ac
tenuissime varie perforatum. — Ad Cerros estate plerumque.

6. Agaricum squamosum, Superne aurum, et in aliqua parte
rubore vivacissimo perfusum, inferne ochroleucum, et favi ad instar
perforatum, foraminulis brevibus, densis, et angustis. — Aristivus.

7. Agaricum squamosum, crispum, Superne album, & lanuginos-
um, inferne primum ejusdem coloris, postea rufescit, tenuissime, elegan-
ter & varie perforatum. — Decembri.

8. Agaricum esculentum, candidum, flabelli forme, multiplex,
pediculo donatum, & favi modo ample perforatum — junio — Tab. 61.
f. 2.

Boletus
imbricatus
Scopjol.
var. 1.

9. Agaricum squamosum, crassum, & mollius in Rosam plerumque
congestum, lobis cristatis, alius radicum, ex rufo ferrugineum, inferne
tenuissime, et varie perforatum. — ad Olea radices — Decembri.

10. Agaricum squamosum, crassum, et mollius, in Rosam plerum-
que congestum, lobis cristatis, alius radicum, album, inferne tenuissime
et varie perforatum. — Loco, ubi anterior.

11. Agaricum squamosum, album, Superne non striatum, sed instar
Serici nitens, inferne pulchre, et tenuissime perforatum.

Tempore brumali in variis Arborum caudicibus.

12. Agaricum Squamosum, villosum, ^{esulentum, album, inferne pal-} ~~superne non striatum, sed instar~~ ~~serici nitens~~ lesens, pulchre, varie, & omnium angustissime perforatum.
13. Agaricum Squamosum, superne album & villosum, inferne griseum subtilissime, pulchre, & diversimode perforatum, foraminulis brevioribus, ac densioribus. Ad Castaneas.
14. Agaricum Squamosum purpureum, superne lanugine sericea praeditum, inferne subtilissime, densissime, & varie perforatum, ~~foraminulis brevioribus, ac densioribus~~. In arborum stipitibus.
15. Agaricum Squamosum pediculo donatum, rufescens, inferne albidum, & varie perforatum. Ad quercus.
16. Agaricum Squamosum, durum, totum album, superficialiter in filamenta tenuissima serici instar veluti scissum, inferne accurissime, & varie perforatum. In agris super putrida ligna.
17. Agaricum terrestre album, crassum, lichenis facie, varie perforatum, foraminulis usque ad superiorem superficiem excurrentibus. In sylvis. Octob.
18. Agaricum Squamosum, & villosum, album primum, postea ad fulvum vergens, inferne favi instar perforatum, foraminulis densis, brevibus, & angustis. Autumni tempore in Acerum Campestrium semimortuorum caudicibus, necnon vitium columnis, & quandoque in sylvis ad glandiferas arbores.
19. Agaricum Squamosum Felsis, seu Moris innascens, superne album, & villosum, inferne griseum, densissime & pulchre perforatum.
20. Agaricum Squamosum, superne variegatum, & instar serici nitens subris album, pulchre, & tenuissime perforatum.
21. Agaricum lichenis facie, rufescens, cartilagineum, verrucosum, & varie perforatum. Ad Flices.
22. Agaricum terrestre lichenis facie, minimum, album, in humidis proveniens, varie perforatum. In humectis, ad aquarum scaturig. & stillicidia.
23. Agaricum Crustaceum, durum, varie perforatum, opibus Equinis innascens.
24. Agaricum Crustaceum, album, tenuioris substantie, varie perforatum.
Super & inter semiputrida quercus folia & ligna viget.

Ordo IV.

7.

Agarica simplicis substantia, & ex pluribus laminis, vel asserculis instat superpositis Constantia, quorum singuli ex una, usque ad alteram superficiem ita densissime & tenuissime perforati, ut quasi cylindraceis tubulis inter se colligatis, quæ madidum in Arundine Jlica, compositi videantur, in quorum cavitate semina continentur ut supra.

*Agaricum durum, crassum, asseratum, Filicibus innascens, griseum. Tab. 62.
Per plures annos vixit in arborum caudicibus.*

Ordo V.

Agarica simplicis substantia, ubique spongiosa, quorum in foraminulorum Superficie adherent semina.

1. *Agaricum album, terrestre, medullam parvis reficiens. Autumn. ad radic. Arbor. - Tab. 63. f. 2.*
2. *Agaricum spongiosum, nigrum, in plantarum diversarum caulis - parti innascens, eamque amplectens. - --- Tine, Orvoco, gramine, - Tab. 63. f. 1.
Vicia maritima, cyclamino, aliisque consimilibus plantis adnascitur, easque am-
-plectitur, ut in Icône patet.*
3. *Agaricum album, spongiosum, Brenellæ plerumque adnascens.
Sub Pinis, &c. julis.*

Ordo VI.

Agarica singulari substantia; semina adherent superficiem denticulorum, vel teretium, vel planorum.

1. *Agaricum esculentum, album, clavæ effigie, aculeis longis, innoxius, munitum. - --- Tab. 64. fig. 1.*
2. *Agaricum esculentum, album, cespitosum, multifidum, & denticulatum, denticulis asperis - --- Ad Jlicas, & ad Moros, sed rarum, etiam - Tab. 64. fig. 2.
- que super fagos, & albetes.*
3. *Agaricum esculentum, latum, maximum, superne, & inferne Capreolini coloris, denticulis longioribus, teretibus, pediculo breviori ad latera donatum.*
4. *Agaricum squamosum, album, superne villosum, inferne denticulis longioribus, & planis præditum. Tab. 64. f. 3.*
5. *Agaricum squamosum, album, superne subhirsutum, inferne inferne pectinatum. - --- Ad Vitiæ pedamenta. Tab. 64. f. 4.*

8. Agaricum squamosum, ex rufo-fulvescens, Squamis amplioribus & longioribus, laciniatis, non hirsutis, inferne lamellatis — bis.

9. Agaricum squamosum, fulvum, lobis pectunculiforma, superne hirsutum, inferne lamellatum. — Ad quercus viger verno tempore.

10. Agaricum squamosum, esculentum, non hirsutum, totum album. Ad quercus.

11. Agaricum squamosum, superne album, et villosum, inferne lamellis densis, aureis, et undosis.

Ag. lingua 12. Agaricum squamosum, Squamis parvis, superne fulvis & glabris, inferne lamellis purpureis. — Ad Populos nigras semimortuas. Tab. 65. f. 3.

13. Agaricum esculentum, carnosum, album, desuper globulosum, subter lamellatum. — Ad caudices Mali Armeniaci.

14. Agaricum squamosum, & laciniatum, superne album, & villosum, inferne lamellis subruptis. — Ad Pinus & quercus. Tab. 65. f. 4.

15. Agaricum squamosum juglandibus adnascens, totum album, superne villosum, inferne lamellis cartilagineis.

16. Agaricum infundibulum dimidiatum imitans, per oras undulatum, superna parte obscurum, & veluti sericum, inferne lamellatum, & album. Tab. 65. f. 5.

17. Agaricum infundibuliforme, ad oras undulatum, superne gilvum, inferne album, & tenuissime lamellatum.

18. Agaricum squamosum, rufescens, pediculo donatum, subter lam. densis. — Ad detruncatas arbores, & in campestribus ad Virium Colum-nas. Tab. 65. f. 7.

agar. 19. Agaricum cespitosum, sordide luteum, Cochlearis, vel spatulae forma, glabrum — Ad quercus. Tab. 65. f. 6.

Cespitosus } 20. Agaricum cespitosum fulvum, cochlearis, vel spatulae forma, hirsutum. — Cum superiori. Tab. 65. f. 8.

21. Agaricum squamosum, adiposum, lamellatum, foetidum, fulvum. Agaricum squam. adipos. foetid. superna limbi parte ramosa, supra balneum ossa adhuc pinguedine repleta natum. H. Pis. Tab. 3.

Ordo VIII.

Agarica singulari substantia, nullis foraminulis, denticulis, et lamellis interrupta, sed locis, quædam superna, quædam inferna superficie semina donata.

1. *Agaricum auriculæ-forma* - - - - - T. 66. f. 1.
2. *Agaricum membranaceum, violaceum, minimum.*
ad truncatarum *Thium* radices, necnon ad columnas vitium
3. *Agaricum gelatinosum, membranaceum, aureum, sinuatum, & crispum.*
crostoch luteum, mesenterii-forma - Bot. Paris. Tab. XIV. f. 4. - Fungo giallo increspato di gelatina. - In dejectis, & semiputridis arboribus - hyemale.
4. *Agaricum gelatinosum, cepitosum, infundibulum dimidiatum referens, sordide aureum.* - *Abietinum, ad caudices.*
5. *Agaricum squamosum, & lichenosum, substantia gelatinosa superne* T. 66. *variegatum, & villosum, inferne primum violaceum, postea griseum, & mesenterii* f. 4. *instar cornigatum.* - ad *Ulinos, &c.*
6. *Agaricum, & lichenosum, rufum.* - In *Thiibus, &c.* -
7. *Agaricum alpinum squamosum, membranaceum, superne obscurum,* T. 66. *& sericeum, inferne ex albo-rufescens.* - f. 2.
8. *Agaricum squamosum, & lichenosum, membranaceum, superne chisum,* *& variegatum, inferne subobscurum, & instar lintei sericei nitens.*
9. *Agaricum Lichenis facie cæruleum* - Post pluvias in Pergularum lignis. T. 66. f. 6.
10. *Agaricum Lichenis facie cinereum.* - In *Thium* caudicibus.
11. *Agaricum Lichenis facie aureum.* - Ad truncata ligna.
12. *Agaricum Lichenis facie rufescens, lava, mollionis substantia.*
13. *Agaricum Lichenis facie, sordidissimum, rugosum, & verrucosum* T. 66. *odoratum* - In Pergularum lignis &c. - f. 7.
14. *Agaricum terrestre Lichenis facie album.*
15. *Agaricum Lichenosum album, eleganter laciniatum.* - Tab. 66. *Humali tempore inter humum, & putrida folia late se diffundit ac crescit.* f. 6.
16. *Agaricum coriaceum, latissimum, rufescens, in emortuorum fagorum* *Ligni substantia crescit. Cum sequenti.*

- p. 128. 17. Agaricum membranaceum, dichotomum & radiceum, in emortuorum
fagorum ligni substantia crevit — In jugis varium, Supradictum vero magis
obvium.
18. Agaricum terrestre, erectum, membranaceum, fulvum, ensiforme,
in summitate bifidum.
19. Agaricum luteum, radicibus arborum fibrosis simile, inter humum
& lignum, vel lapidas innascens.
20. Agaricum nigrum, reticulatum, compressum, emortuis arboribus T. 66
inter corticem & lignum, interdum in ipso ligno innascens ac late se diffundens f. 3.
Fungus niger compressus, varie divaricatus, & simplex inter lignum & corti-
cem. Reit. Synopsis. ed. 7. App. 333. et ed. 3. 13.
Fungus ramosissimus niger, compressus, in cribrum veluti formatus. Ely d.
Hist. Tom. 3. 21.
21. Agaricum nigrum, reticulatum, non compressum. —
Quercuum Cavernis innascens ac late se diffundens. — varium.
22. Agaricum candidum, radicibus arborum fibrosis simile, inter hu-
-mum & lignum, vel lapideum innascens.
23. Agaricum album, reticulatum, hirsutum, & fistulosum.
In testarum fungis inter saxa ad obstruenda earundem testarum foramina inservientia.

Ceratospermum.

Ceratospermum est plantae genus, ab Agarico diversum, seminibus cor-
niculatis, aut Luna crepentes figura in superficie donatum.

1. Ceratospermum aquaticum, crustaceum, crispum, gelatinosum, Lu- f. 56
-brium, latissimum, extra fulvum, intus album, & instar quercu ligni vi- f. 2.
-mosum — In aquarum rivulorum fundo toto anno viget, praesertim autum.
2. Ceratospermum nigrum, minimum, discoides, e diversarum arborum ra- T. 56.
-morum emortuorum corticibus, & praecipue Corylo erumpens — f. 1.
3. Ceratospermum minimum, cornuopioides, album, & subhirsutum, seminibus incarnati coloris — Autum. Lauri corticibus adnascens. T. 56.
f. 3.

Ceratospermum dicitur a vocibus Graecis κερας cornu, & σπέρμα Semen, quasi di-
-citur Semen cornutum, vel corniculatum.

Linckia

Linckia est planta genus inter *Agaricum* & *Leratoypervium*, a quibus Tab. 67.
differt ob seminum dispositionem, atque situm, quod in tortuosam, nodosamque
Lineam Coralli, aut Margaritarum, moniliun instar, disponuntur, quoad-
modum Microscopium exhibet. A quod semina ipsi plantae corpori affiguntur.

1. *Linckia* *terrestis*, gelatinosa, membranacea, vulgarissima, ex
pallida & virascente fulva.

Muscus fugax, membranaceus, pinguis, statim post pluvias oritur. Bot. m. T. 67.

In *Pinetis* & herbosis locis, in pratis & pascuis, &c. pluvio, vel humido Temp. f. 1.

2. *Linckia* *palustris*, gelatinosa, saxis adnascens, ex obscuro fulva, 7. 67.
& concava, vesicam referens. — In aquarum rivulis. f. 2.

Linckia a *Linkio* Joanne Pharmacopoeo Lipsiense.

Suillus

Suilli unicolores, lutei

1. *Suillus* *esulentus*, crassus, totus pallidus; Porcino o Cappatello buono, giallo.
In ericetis & sylvis *Adonis*. varus.

Bicolors, albi, & pallidi.

2. *Suillus* *esulentus*, crassus, albus, subrus pallidus, pediculo ventricosus,
pantus albo — Provenit in eisdem locis.

Sulphurei, Achard, seu suave rubentis coloris.

3. *Suillus* *esulentus*, Alpinus, crassus, desuper Sulphureus, cute lacera,
quasi hirsuta, inferne Achard dilutissimo rubore praeditus, pediculo ventri-
coso, Superne pileoli parte concoloris. — In sylvis obignis.

Lutei, & rubri.

4. *Suillus* *esulentus*, crassus, Superne sordide rubens, vel ex rubro-
ferugineus, inferne dilute luteus. — Autumn. Temp. a Rusticis Vanuatur.

5. *Suillus* *parvus*, crassus, initio dilute luteus, postea parum concolor, parum
foecum vini simulans, interdum undique ruber. — Cambia colore. — In querce-
tis, & ceduis sylvis, necnon in ericetis, vasa, & autumno, cum vulgari. Crescit.

p. 127.

Rubro-ferruginei, & albid.

6. *Suillus esculentus*, crassus, superne ex rubro-ferrugineus, inferne albidus, pediculo concolore, rimoso, vel striato. — In pinetibus.

Ex auro-fulvi, & ex albo-pallidi

Suillus parvus, crassus, pileolo desuper ex auro-fulvo, inferne ex albo pallido, pediculo superne pileoli partis ejusdem coloris.
In horris &c.

Fulvi & Flavi.

Suillus esculentus, crassus, superne fulvus, inferne initio albidus, deinde ex flavo subvirescens, pediculo ventricosus, & superne pilei parti concolore. — In montosis sylvis & inter Ericas. — venundatur.

p. 128. 9. *Suillus esculentus*, superne pulchre fulvus, inferne citrinus, & 7. 68.
subtilissime perforatus, pediculo concolore. f. 1.

Porcino col capello di sopra di colore leonato bello, e di sotto insieme col gambo limonato.

10. *Suillus esculentus*, crassus, superne fulvus, inferne luteus, pediculo concolore, rugoso & aspero. Leuino. — In sylvis.

11. *Suillus crassus*, pileolo desuper fulvo, inferne sordide luteo, pediculo concolore, tenuiori. — Per prata.

12. *Suillus parvus*, crassus, pediculo, & superne pilei parte fulvis 7. 68.
sericea, perbrevis lanugine infectis, inferna vero ochroleuca. f. 2.
Ad Sticum radices. — Porcinello peloso.

Obscuri & Flavi.

Suillus esculentus, crassus, superne obscurus, inferne initio albidus, deinde ex flavo, sordide virescens, pediculo ventricosus, & superne pileoli parte concolore. — Crescit in sylvis ubique.

14. *Suillus perniciosus*, superne obscurus, inferne ochroleucus, 7. 69.
pediculo ventricosus, superne pileoli parti concolore, radicem in- f. 3.
maionem longum sensim attenuatum producta. — In quercetis

Obscuri & murini

Suillus esculentus, crassus, desuper obscurus, inferne murini coloris, pediculo superne pileoli parti concolore, & sericea, perbrevis lanugine infecto. — In sylvis.

p. 128.

Tricolores albi, lutei, & rubri.

Suillus esculentus, montanus crassus, pileolo desuper ex rubro ferrugineo, inferne albedo, pediculo longiore, albo, punctis rubris distincto. In Castanearum Sylvis, autumnus.

Albi, lutei, & obscuri.

Suillus esculentus, crassus, viscidus, superne obscurus, inferne sub-luteus, pediculo brevi, tenui, conicolore, punctis, & litoris rubris notato. Tab. 69. f. 1.

p. 129.

Fulvi, lutei, & rubri.

Suillus esculentus, viscidus, crassus, superne fulvus, inferne luteus, pediculo subnitens albo, deinde ejusdem coloris, punctulis, & litoris sanguineis notato. — Pinuzzo buono colore di fogliamorta, e col gambo giallo puntato di rosso. — In Sylvis.

19. *Suillus esculentus*, viscidus, crassus, superne subfulvi pallescentis coloris, inferne ochroleucus, pediculo conicolore, litoris, vel punctulis sanguineis notato. — Pinuzzo buono Zolfino, o biancastro. — &c. — in Sylvis.

Ex obscuro fulvi, lutei, & luteo-rubentes.

Suillus magnus, crassus, superne ex obscuro fulvus, inferne luteus, pediculo ex luteo-rubente primium, postea simul cum superne pileoli parte ad elegantem ruborem instar fœcum vini vergans. — Porcino malefico, cambia colore.

21. *Suillus esculentus*, crassus, magnus, vernus, pileolo supina parte fulvo, pronaluteo, pediculo crassiore, conicolore, punctulis, & litoris rubris notato. Tab. 69. f. 2.

22. *Suillus* crassus, superne fulvus, & latoris, inferne luteus, pulpa rosea, pediculo ex fulvo-subrubente, ac veluti reticulato.

23. *Suillus esculentus* crassus, superne fulvus, & nonnihil hirsutus, inferne & inferne luteus, pediculo ex fulvo-subrubente. — Porcino bastardo buono, pelosiccio.

Purpurei ex aureo-fulvi, & rubentes.

Suillus crassus, superne purpureus, inferne ex aureo-fulvus, pediculo tenui subrubente. — Pinuzzo malefico, rosso, di gambo corrucciuto.

Obscuri, lutei, & medii coloris.

Suillus crassus, superne obscurus, inferne luteus, pediculo medii coloris, & summa parte striato. — Pinarello.

Suillus, qui & *Porcinus* dicitur a *Sue*, quia non solum *Sues* innumlibenter devorant, verum etiam, quia in locis ubi nascitur commemorantur ad pascua.

Polyporus

Fungus, cujus capitulum non separatur ab inferiori parte
 & non ex fistulis solatis composita est, sed instar cribri, aut
 Apium favi duntaxat perforata, in cujus foraminulorum ore
 reperiuntur flores, & in eorumdem cavitate semina, que
 - in eodem in antecedenti genere.

p. 130.

Polypori unicolores, albi.

Polyporus exiguus, coriaceus, albus, lignis adnascens.

T. 70. f. 7.

Fungus porus minor, candidus, siccioris substantiæ, ex ligno natus.

Cinerei

Polyporus alpinus, cinereus, pileolo superna parte lacero, & veluti
 tepestato, inferne instar favi ample perforato. — Per Sylvas fagi, et albas

T. 71. f. 2.

Fulvi

Polyporus coriaceus fulvus, infundibuliforma, pediculo crassiore —
 In Castanearum Sylvis — Septembri.

T. 70. f. 4

4. Polyporus lignosus, fulvus, infundibuliforma, ad oras fimbriatus, pe-
 -diculo tenuiore — T. 70. f. 8.

5. Polyporus exiguus, coriaceus, fulvus, pileolo concavo, ac in medio
 nonnihil umbilicato. — Michienus de Prati — Julio &c.

T. 70. f. 9.

6. Polyporus exiguus, alpinus, fulvus, infundibuliforma, pediculo
 brevior — In Alpidibus.

T. 70. f. 10.

Bicolors albi, & obscuri.

7 Polyporus esculentus, parvus, pileolo desuper obscuro, inferne
 tenuissime poroso, & albo, pediculo superius pileoli parti concolore.
 — Scopetino ab Atraliis vocatur quod nascitur in Ericetis. Aurum.

T. 70. f. 3.

Spadiceo-negi, et luteo-virides.

8. Polyporus Alni radicibus innascens, molli, & crassa pulpa, pileolo de-
 -super ex spadiceo-fulvo, inferne luteo-viridi, pediculo brevi, superius
 pileoli parti concolore. — Augustus & Sept. in Alnetis præservin.

T. 70.

f. 1.

p. 130.

Albi, & spadicæ-rufi.

Polyporus exiguus, pileolo hemisphaerico, ex spadicæo-rufo, adoras Tab. 70.
 piloso, subtus albo, rhomboideis, & amplioribus foraminulis fenestrato, f. 8.
 pediculo superiore pileoli parte concoloro. — In sylvis — inajo —

Albi, & grisei.

p. 131.

Polyporus esculentus, parvus, & habitior, ex griseo, & obscuro ni- T. 70.
 -gricans inferne albus, & tenuissime porosus, pediculo cumdisperna f. 2.
 pileoli parte ejusdem coloris — Fungo cono, Carbonajo — Octobri.

Cespitosi, vel ramosi, unicolores, albi.

Polyporus Cespitosus & ramosus, albus. Barrel. 117. ic. 1270.

Unicolores, pallido-lutei.

Polyporus Cespitosus, ramosus, pallide luteus. Barr. ic. 1269.

Bicolores albi & rufi.

Polyporus esculentus, ex ingenti, perenni, & tuberosa radice in singu- T. 71.
 -los menses plerumque nascent, superiore rufescens, inferne simul cum pe- f. 1.
 -diculo albus. — fungo della pietra fungaja. — Battar. Tab. 24. A.

Albi & nigri.

Polyporus lignosus, & cespitosus, infundibulum imitans, superiore ni- T. 70.
 -gricans, inferne cum pediculo albus, areolis carbonariis innascentibus aut. f. 6.

p. 132.

Erinaceus

Hydnum imbric. *Erinaceus esculentus*, albus, ^{Erin. unicol. albi.} crassus — In Ericetis, Arbutetis, & caudis sylvis. f. 2. T. 72.

Lutei

H. repandum. *Erinaceus esculentus*, pallide luteus. — — — — — T. 72. f. 3.

fulvi

Erinaceus infundibulum imitans, coriaceus, colore ex fulvo ferrugineo, T. 71. f. 4.
 pileolo desuper veluti sericeo, & pluribus striis circularibus excavato.
 Sarcocarino salvatico color di esca, o di foglia morta.

p. 137.

137

Hydn. auriscalp. 4. *Erinaceus Alpinus*, minor discoides, fulvo-ferrugineus; Srecheri-
L. -no alpigiano pinolo, colore di foglia inorta. - In fagin & abiegn. Sylvi. T. 72.
estate. f. 7.

6. *Erinaceus cespitosus*, coniceus, ferrugineus, Superne circula-
-ribus foris excavatus, & sericeus, pediculo tenuiori - Octobri.

Hydn. auriscalp. 8. *Erinaceus parvus hirsutus*, ex fusca-fulvus, pileolo semi-orbi-
L. -culari, pediculo tenuiore T. 72.
f. 8.

Nigri.

Erinaceus niger, ramosus, non vascus - In sylvis & nemetis. T. 72. f. 6.

Bicolores ferruginei & cinerei.

Erinaceus ex obscuro-ferrugineus, subtus denticulis longioribus, T. 72. f. 1.
cinereis - Septembri in Sylvis &c.

p. 133.

Fuliginosi & cinerei

Erinaceus esculentus, pileolo superne valuti squamoso, &
fuliginoso, inferne cinereo, pediculo eam superne pileoli parte epis-
-dem coloris.

Nigri & Plumbei

Erinaceus infundibulumimitans, colore pullo, superne seri-
-ceus, & circularibus foris excavatus, inferne plumbecus, pediculo
concolore - Srecherino vero malefico - Octobri T. 72.
f. 8.

F U N G I

p. 161.

~~Unicolores, albi~~

- I. Fungi simplices, seu non cespitosi, nempe ab una radice singulares exeuntes.
- II. Ramosi.
- III. Solva non erumpentes.
- IV. Pediculo non annulato.
- V. Pileolo desuper non striato.
- VI. Neque lactescentes, neque acres.

Unicolores, albi.

Fungus ramosus, parvus, albus, pileis in tubum valvati contractis. T. 79.
 Fungo ramoso. — Octobr. in necronibus. f. 3.

II. Non ramosi

VI. Lactescentes, acres, vel non acres.

Unicolores, albi

Agaricus Piperatus. Fungus piperatus, albus, crassus, lacteo succo turgens. F. B. 323. J. H. R. H. 558.

2. Fungus esculentus, piperatus, totus albus, lacteo succo turgens, lamellis angustioribus, pediculo aliori, & habitiori. — In Italia inter. v. d.

3. Fungus piperatus, albus, parvus, lactescens, pileolo plano, umbilicato, subas lamellis densissimis, perangustis.

Coloris lateritii.

Fungus perniciosis, lateritio colore varians, succum acrem, & croceum fundens, pediculo breviori. — Majis & autumnis viger in Ericis.

Agar. deliciosus
 Scop. G. G. G.

2. Fungus esculentus, lateritio colore immutabili, succum acrem, & croceum fundens, pediculo breviori. — Assate in Ericis, fagineis & abiegn.

Rufi

- p. 141. Fungus pediculo, & superna pileoli parte atro-rufis, lamellis
 Subtufis, seu rufis coloris, succum lacteum, & aereum fundens. Præ.
 Ag. rufus Scop. & fungus infundibuliformis, lactescens, rufescentis coloris. L. p. 141.
 Agar. testaceus -- Scop. Fungus parvus, pediculo, & superna parte pileoli ferrugineis
 lamellis rufis, lacteum & dulcem succum fundens. majo. Sylvestr.
 p. 142. 4. Fungus parvus, lacteum, & dulcem succum fundens, ~~pileolo~~ pe-
 diculo, & superna pileoli parte rufescentis coloris, lamellis vero
 ejusdem sed paullo rufioris. Autumn.
 5. Fungus aeris, lactescens, parvus, infundibuliformis, pileolo
 parvo, saturate & obsolete rufescente, & quasi ferrugineo, lamel-
 lis rufis, pediculo superna pileoli parte concolore. Peruvino lattajuolo forte.
 6. Fungus aeris, lactescens, parvus, dilute rufescens, pileolo com-
 planato, & nonnihil umbilicato, circularibus zonulis saturate
 concoloribus distincto. -- Sepino Aniciato.

Aureo-fulvi.

an? Ag. oedematopus Scop. Fungus æstivus lactescens, ex aureo-fulvus, vel ex fulvo-aure-
 us, sericea, & perbrevis lanugine quasi infectus, lamellis angustis
 onibus, dilute concoloribus. -- Fungo lattajuolo d' estate dorato, elisco come
 raro. -- Aestivus, & rarus.

Ex atro-fulvi, vel ex aureo-ferruginei.

Fungus ex atro-rufus, vel ex aureo-ferrugineus, aqueo-lacteo &
 dulci succo turgens. -- Lattajuolo di latte inaquato, dolce. -- Autumn. p. Sylvas frag.

Rubro-ferruginei.

Fungus bulbosus, lactescens, aeris, rubro-ferrugineus. -- Sepino lattajuolo
 di radice grossa. -- Indisitoris aucupariis autumn.

Viridiores, albi, & spadiceo-grisei.

Fungus parvus, succo lacteo, & acri exuberans, superne e spadiceo-griseus,
 subtus cum fistuloso pediculo albus. -- Sepino lattajuolo di gambo uccoro.
 autumno cum superiori.

p. 142.

Albidi & Sublutei.

Agar. Scrobiculatus Scop. Fungus piperatus, lactescens crassus, pallidus, lamellis albidis, pediculo superna pileoli parte conicolore & Lichenis pulmonarii, arboris instar lacunato. — Peperino, o Peperone giallo, di gambo buchevattoloso. — Aug. in fagineis Sylvis.

Albi, & grisei

Fungus alpinus, aeris, lactescens, desuper egriseo-fuscus, inferne cum breviori pediculo albus. — Lattajuolo forte, all'ugiano, di abetina - in fags.

2. Fungus parvus, aeris, lactescens, desuper griseus, inferne cum pediculo albo. In Sylvis.

3. Fungus parvus, piperatus, lacteum succum fundens, pileolo griseo, Tab. 80. inammoso, papilla acuta, inferne cum pediculo albus. f. 1.

Peperino con il capello grigio fatto a guisa di Pappa. — ubi?

Albi & cinerei.

p. 143.

Fungus alpinus, piperatus, lactescens, & viscosus, pediculo, & superna pileoli parte cinerei coloris, inferne lamellis albis. — Peperino lattaj. vischioso, alpestre, di Abetina. — Augusto in fagin. & Abiegnis Sylvis

Albidi & obscuri.

Agar. Rusticanus Scop. 1554 Fungus parvus, succum lacteum, & aerem fundens, superne colore obscuriori, subus lamellis, & pediculo albis. — Lattajuolo forte, di capello oscuro.

2. Fungus parvus, aqueo-lacteum succum minus aerem fundens, pileolo subobscuro, infundibuli modo cavo, inferne ex albo-virescente, pediculo superna pileoli parte conicolore. — Autunno - Sylvaticus.

Dilute purpurei & albi.

Fungus aeris, lactescens, durioris substantiae, pediculo cum superna pileoli parte sordide, et dilute purpureis, & ad tactum vini rubri colore accedentibus, lamellis primam albis, deinde virescentibus. — Peperino duro col di sopra del capello di colore pavonazzo, che si accosta a quello del tartaro di vino rosso. — Autunno in Sylvis.

p. 143.

Tricolores, albi, fusi, & lateritii coloris.

Fungus lactescens, aeris, pileolo ampliore, centro cavo, & subfusco, reliqua parte conulis circularibus lateritii coloris nitidis, & saturis alternatim positis veluti fasciata, lamellis, & pediculo albis. — Augusto. Sylv.

VI. Non lactescentes, acri, vel alio fervido, ac peculiari sapore.

Unicolores, albi.

Fungus esculentus, aeris, albus, pileolo turbinato, ad oras angulato, & subtus repando. — In Sylvis, ericetis, atque arbutetis vere & autum. sed rarissime occurrit.

Lutei.

Fungus esculentus, aeris, pulchre croceus, pileolo turbinato, ad oras angulato, & subtus repando. — In Sylv. cum Superiori eod. temp. sed copiosior.

p. 144. 2. Fungus esculentus, aeris, colore vitellino, pileolo turbinato, oris ex-
Ag. Cantharellus, pansis, undulatis, ac pulchre laciniatis, lamellis, seu unavis costis crispis, & veluti ramosis.

Bicolores, albi, & spadicei.

Fungus pipervatus, non lactescens, pileolo admodum umbilicato, sordide spadiceo, lamellis albis, pediculo firmo, brevissimo, concolore. — Prateensis.

Albi & grisei.

Fungus exiguus, odore, & sapore Raphani, pileolo desuper albo, inferne griseo, pediculo superna pileoli parti concolore. — Fungo ramolacis minore. — Octobri, Sylvaticus.

Albi, & Lutei.

Fungus campestris, parvus, luteus, odore Allii, pediculo superna parte Tab. 78
concolore. — Fungo Aglio de campi, & Campagnuolo. In fimo Equino f. 5.
per agros fuso, Autum. Temp. viget, sed rarus.

Grisei & Nigricantes.

Fungus alpinus, odore, & sapore Allii, pileolo hemisphaerico, utraque parte sordide griseo, pediculo pro parte tenuiori, nigricante, fistuloso, & veluti sericeo. — In Sylvis fagis. T. 78. f. 4.

p. 144.

E cinereo-albicans, & spadicea.

Fungus novus, exilis, cinereo-albicans, pediculo spadiceo, odore Allii.

Tricolores, rufi, grisei, & medii inter utrumque coloris.

Fungus odore, & sapore Raphani, pileolo hyemina parte pulchre rufi, lamellis densis, griseis, pediculo medii coloris, cum cuticula laevi, veluti subhiolata. — Fungo Ramolaccio maggiore. Octobris & Novemb. in nem. freq.

p. 145. VI. Neque lactescentes, neque aures.

Unicolores, albi.

Fungus esculentus, totus albus, pileolo ampliore, pediculo brevi, Fungo biancone. — In Sylvis. autumnus.

2. Fungus esculentus totus albus, pileolo plano, pediculo brevior. — Fungo Torzolo. — Ubi antedictus, ac eod. temp. crescit.

3. Fungus esculentus, albus pileolo plano, viscidus, lamellis crispis. Fungo Magnajo. — Cum superioribus.

4. Fungus albus infundibulum imitans, pediculo tenuiori. — Autumn. in syl. h.

5. Fungus subalbidus, pediculo crassior, oris laevis, radice granulosa. —

6. Fungus albus, parvus, & habitior, pileolo umbilicato, ac in plures partes tanquam per elasticam vim ut plurimum se dividens, cute laevi. — Fungo bianco Niantese. — Octobris & Sylvas.

7. Fungus luteo albus, pileolo plano, pediculo longiore, cylindraceo, non fistuloso. — Autumnus in Sylvis.

8. Fungus esculentus, totus albus, farinam recentem molivam redolens. Megidone bianco, chespiri odore di farina di fresco macinata. — Toto autumnus in Ericetis & copiose provenit.

9. Fungus niveus per elegans, pileolo subrotundo cerebri instar crispato, pediculo brevior. — In trabibus aqua pluvi. diu madefactis — autumnus.

Ag. Magnajus
Scopol.
Et Torzolo ejusd.

p. 145.

10. Fungus esculentus parvus, & habitior, totus albus, viscidus. - ad ulm.
Octobri. - Fungo Geloso.

11. Fungus albus, esculentus, pileolo ampliori, fornicato, atque in medio paul-
isper umbilicato, cute laevi, veluti squamosa, pediculo tenuiori brevissimo.
Fungo Capellone, bianco. - Et state in Nivum & quare. (Cordicibus.)

12. Fungus totus albus, infundibulum imitans, pileolo parvo, pedi-
culo longiore. Autumno in Sylvis.

13. Fungus parvus, lamellatus, infundibuli forma, totus albus, pi-
leolo usque plurimum in varias lacinias se dividente - Oct. ubi sa.

14. Fungus parvus, totus albus, pileolo plano, ac umbilicato, pe-
diculo brevi. - In Sylvis.

Ag. Valens. Scop. 15. Fungus nemorosus, viscidus, lacteo candore fulgens. Fungo Valen-
te. - Autumn. in agro. in truncis - pit. diamet. 2. transvers. digitos.

Ag. niveus Scop. 16. Fungus nivei candoris simul, viscidus, lamellis parvis, vari-
-oribus, pediculo fistuloso. Ubi sa. - minor priora

17. Fungus esculentus, lamellatus, candidus pulcherrimo pileolo.
Octobri & nemora.

p. 146
18. Fungus parvus, albus, subous lamellis torosis. - Autumno.

19. Fungus parvus, albus, pileoli substantia adeo tenui, ut lamellae
ad superiorem superficiem transpareant. Octobri

20. Fungus parvus, coriaceus, viscidus, totus albus, lamellis rarioribus, seu
inter se longe distantibus. - Lumachino bianco. - In herbosis ambulaenris.

21. Fungus parvus, viscidus, totus albus, pediculo breviora - Vernus.
Lumachini bianchi di gambo corto.

22. Fungus fimetarius, hirsutus, subalbidus, pileolo conico, pediculo
coarsiore - In Equino fimo Vere & autumno post pluvias.

23. Fungus parvus, totus albus, pileolo in medio umbilicato. - In Ericetis.
Fungo vello di Scopeto, bianco.

pag. 146.

24. Fungus parvus, totus albus, gracilior, pileolo hemisphaerico, pediculo tenuiori, pro alto, radice tumida in mucronem longum producta. Fungo dilegine, barbato. — Maio per loca herbida, &c.

25. Fungus proterus, parvus, albidus, radicibus Graminis Dactyloideis, Tab. 74. Spicis villosis, autumnate tempore nascent. — Fungus bianco bianchiccio de' 8. 3. — prati, che nasce sopra le radici della Gramigna sanguinella delle spighe pelose. — In prati & praevis.

26. Fungus parvus totus albus, inter Muscos nascent, pileolo acuto, extensorii forma. — Autumno in nemoribus.

agor. angulatus 27. Fungus minimus candidus, pileolo chippei forma, & veluti angulato, T. 74. Gmel. p. 1471. Limbo superna parte repando. — Fungus bianco a foglia di Brocciere 8. 4. — che nasce sopra i pezzi di legni invecchiati.

28. Fungus minimus cere alba colore, pileolo plano, in medium fastigiato, pediculo fistuloso, Musco Polygoni folio innascens. — Autumno.

Ag. Trichopus
Scopoli.

29. Fungus minimus, candidus, pileolo hemisphaerico, pediculo altiori, T. 73. Capillaceo. — Autumno 8. 4.

30. Fungus minimus, candidus, pileolo galericulato, pediculo pro alto, T. 73. angustissimo, vix perforato. — Super Olivum caudicibus. — Octobr. 8. 5.

31. Fungus minimus, totus albus, infundibulum imitans, Musco innascens. — Severino picciolissimo, bianco, di ragnaja — Verno tempore crescit. 8. 6. T. 73.

32. Fungus minimus, candidus, infundibuli forma, totus albus, emortuis gramineis foliis innascens. — Severino minimo, che nasce sopra le foglie di gramigna mezza secca. — Per vestibiles agros, autumno.

33. Fungus minimus, candidus, pileolo hemisphaerico, ilignis foliis, T. 80. Semiputridis innascens. 8. 10.

34. Fungus minimus, albus pileolo hemisphaerico, in arborum caudicibus, T. 74. toto anno post pluvias oritur. 8. 7.

p. 147

35. Fungus minimus, proorsus albus, inter Muscos nascent. — Octobr. post diuturnas pluvias, & locis Muscoris prodit.

p. 147.

Leucophaei, grisei, adamantini, cinerei, murini

1. Fungus esculentus, saturo-cineus, vel murini domestici coloris, farinam recentem molitam odolens, pediculo crassiore. — Toto autumno in Ericetis &c. ut plurimum copiosus provenit — et in foro venditur.

2. Fungus adamantini coloris, pileolo ampliori, fornicato, pediculo brevi, tenuiore. — Fungo di colore diamantino, e carne bigio-perla — Septembri.

3. Fungus parvus, viscosus, pileolo griseo, semiorbiculato pediculo fistuloso, simul cum lamellis dilate concoloribus, & quasi leucophaeis.

4. Fungus parvus, intense griseus, superna pileoli parte lacera, veluti squamosa, pediculo in spiram modum intorto & filamentoso. — Stoppione col capello screpolato, e di gambo corto, e sfilacciato.

5. Fungus griseus, gracillimus, pileolo galeculato, pediculo lineam crasso, pro alto, fistuloso. — In silvis inter muscos. Autumno.

Aurei, lutei, crocei, pallidi, paleacei, straminei.

Ag. inanis Scop. sed lamelle sunt rariores. 1. Fungus esculentus, paleacei, seu straminei coloris, pileolo pulvinato, lamellis crebris, tenuissimis, perangustis — Autumno in silvis.

Agar. Crassus. Scop.

2. Fungus luteus, & ad prasinum nonnihil tendens, pileolo crasso.

A. Gjashiformis Allion.

3. Fungus aureus, infundibuli-forma — Revera nalesia dorata. Aut. in abiegnis silvis.

4. Fungus parvus, e luteo-aureis, molliori substantia, pileolo plano, lamellis rarioribus, pediculo longiore. — Grassello buono. — Novembri.

5. Fungus parvus, campestris, luteus, pileolo hemisphaerico, pediculo longiore. — Giallino cattivo di gambo lungo. — In agris vere & autunno.

6. Fungus parvus, lubricus, aureus, lamellis variis, amplioribus, pediculo crassiore. — Lumacone giallo, che sdruciuola di mano. Autumno.

7. Fungus parvus, luteo pallore decolor, pediculo duriore. — Fungo di colore di Camoscio, che tira al pagliaro.

Ag. filamentosus Scop.

8. Fungus ex luteo-nufescens, cute superna pileoli partis lacera, veluti squamosa. — In Castanearum silvis.

9. Fungus parvus, sordide, vel obsolete luteus, vel luteus obsolete virescens, capitulo hemisphaerico, pediculo in spiram modum intorto. — Autunno.

pag. 148.

10. *Fungus minimus, aureus, Virga aurea majoris, foliis glutinosis, & graecolenticibus, emortuis ramis innascens, pileolo hemisphaerico.*

Spadicei

Fungus parvus, totus spadiceus, pileolo urammoso, desuper quasi in sericea filamenta lacerato, atque in medietate veluti in papillam autem assurgente, pediculo tenuiori. — Canapino di buccia sfilacciata, e di gambo sottile. — majo & Sylvas.

Rufi.

Fungus esculentus, crispus, ex rufo albicans, vel ex albo rufescens, lamellis angustissimis, pediculo crassiore. — Soderello degli Ucellari.

2. *Fungus totus atro-rufescens, odoratus, pileolo ampliore, fornicato, tenuiori substantia pediculo brevi, angusto. — Octobr. — fungo di colore d'Ontano che inclina all'Isabella.*

3. *Fungus parvus, esculentus, odoratus, coriaceus, rufus, lamellis inter se longe distans. — Fungo color d'Isabella. — In herbis, pratis, ac arenas. v. p.*

4. *Fungus parvus, infundibuli forma, crispus, pediculo, & suprema pileoli parte rufis, inferne lamellis ex rufo-purpureascentibus. Tamburino Crespo — In montibus — Verno tempore ut supradictus.*

5. *Fungus exiguus, atro-rufescens, pileolo ampliore, tenui substantia. Fungo di colore ceciato pieno. — Autunno.*

6. *Fungus exiguus, totus rufescens, lamellis ad pileoli peripheriam non usque excurrentibus, pediculo brevi, radice bulbosa. — Autunno.*

7. *Fungus parvus, lamellatus, rufescens, florem Genista redolens. — Autum.*

8. *Fungus parvus, sordide rufescens, vel ex rufo-ferrugineus, cute laevi, pediculo lineam crasso, fistuloso. — Autunno.*

Fulvi, seu Mustellini

Fungus parvus, lamellatus, fulvus, pileolo concavo, & veluti sericeo, lamellis to-rosus. — Fungo del colore di foglia morta, colla parte di sopra del capello liscia come seta, e colle laminette muscolose. — Ottobre.

2. *Fungus parvus, fulvus, pileolo hemisphaerico, fornicato, desuper laevi, veluti subhirsuto, pediculo brevior. — Fungo del colore di foglia morta colla pelle del capello scamosciata. — Vase et autunno vige.*

pag. 148

2. *Fungus parvus, fulvus, pediculo tenuiore, pileolo quasi complanato.*
Fungherello di Scapero, del colore di foglia morta, o leonato. — In Ericis autumn.
149. 4. *Fungus parvus, fulvus, sive mustellinus, pileolo extenuati forma.*
Fungo spegnitojo, minore, di gambo lungo, del colore di foglia morta. 8. 11.
6. *Fungus parvus, Autumnali tempore, stercore bovino innascens, pileolo hemisphaerico, superne subfulvo, inferne vero saturo, pediculo tenuiori, fistuloso, superna pileoli parte concolore. — Funghetto del colore di foglia morta, che l'autunno nasce nel conio di Bue, ed Vacca. — In pascuis ubi jumenta de-
 -gunt.*
5. *Fungus campestris, minimus, et fulvo-ferrugineus, pileolo hemisphaerico, opsidarietinis innatus. — Fungo operino. — Tempore Autumnali variis rebus adnascens, & potissimum in opsidibus arietinis.*

Obscuri, Fuliginosi, Fasci.

- Fungus ex obscuro-fulvus, pileolo amplissimo, crasso, hemisphaerico.*
2. *Fungus esculentus, odoratus, parvus, acetabuli modo cavi, obscuros, & ad olivae conditae colorem nonnihil tendens. — Novembri & agro.*
3. *Fungus subobscurus, pileolo campanulato, ac desuper in sericea fila-
 -menta, veluti lacerato, pediculo pro alto. — Fungo lanagione, sericcio, con la
 parte di sopra del capello sfilacciata. — Nemorosus & autumnalis.*
4. *Fungus acetabuli modo cavi, fuliginosus, pediculo pro alto. —
 Fungherello di Colore effumicato — ubi supra crescit.*
5. *Fungus parvus, subobscurus, pileolo acetabuli modo cavo, ad ora
 undulato, & ubi vis sericeo nitore praedito. — Fungo scuro con capello liscio
 e lustrante come seta, fatto a ciotola. — In nemor. & herb. loc. var. erant.*
6. *Fungus parvus, subobscurus, pileolo mammoso, papilla acuta.*
7. *Fungus parvus, obscurus, aut castanei veteris coloris, pileolo he-
 -misphaerico. — Fungherello color di guspio di Marrone, o di Castagna
 vecchia, delle maniche di S. Piero in Grado — In Sylvis.*
8. *Fungus parvus, acetabuli modo cavi, colore subobscurus; Fungo
 Sughherello. (id est Luberellus a substantia corticis Luberis denominatus.) —
 In herbosis ambulantibus Octobri &c.*

pag. 149.

Violacei, purpurei, Janthini.

Agar. Violaceus L. *Fungus esulentus, bulbosus, dilute purpureus. — Grumoso pavonazzo. Tab. 74. f. 1.*

2. *Fungus parvus, dilute purpureus, pileolo sursum reflexo, & concavo, pediculo longiore, intorto. — Fungo colore di Piniqe, chatira al gridolino. Octobr.*

3. *Fungus pileolo, & pediculo dilutissime purpurei, & quasi rufescentis coloris, lamellis vero suave-purpureis. — Cum sequenti.*

p. 150. 4. *Fungus totus subpurpureus, per vetustatem ad carneum colorem vergens, pileolo extintorii forma. — Inter folia semiputrida. autumnno.*

5. *Fungus parvus, dilute purpureus, pileolo pulverinato, pediculo non fistuloso. Lamellis valde remissis, pediculo fistuloso, intorto. — Fungo vedovino, di gambo vuoto, & storto. — autumnno.*

6. *Fungus parvus, subpurpureus, pileolo pulverinato, pediculo non fistuloso. Vedovino di color di porpora dilavato, & di gambo pieno. — In Sylvis. autumn.*

7. *Fungus pileolo parvo, hemisphaerico, Superne nigro-purpureo, inferne vero valde dilute, & quasi purpureo, pediculo concolore, praesto, intorto, fistuloso. — Novembri sub Alcibus &c.*

8. *Fungus dilute violaceus, pileolo parvo, pediculo gracili, praesto, fistuloso. — Fungo chiodo, violetto. — In Sylvis. autumnno.*

9. *Fungus Janthinus, pileolo parvo, quasi semiorbiculato, pediculo tenui, partim glabro, partim subhirsuto. — Bulletoniino di colore fra la porpora, & il violetto col gambo mezzo peloso. — autumnno in Sylvis.*

Virides.

Fungus parvus, totus viridis, & ad aureum nonnihil tendens, ac limacino glutine oblitus, pileolo extintorii forma, pediculo fistuloso. — Fungo vedovino, cattivo, lunareo. — In herbis & hortorum ambulantibus. autumnno.

Coccinei.

Fungus alpinus, totus saturi-coccineus, seu kermesinus, pileolo hemisphaerico. — In Castanearum Sylvis viger.

pag. 150. Bicolores albidis, & leuophaei, grisei, cinerei, plumbei, giloi, murini.

1. Fungus parvus, leuophaeus, lamellis albidis, pediculo fistuloso, superna & pileoli parti concolore. — Autumno in nemoribus.

2. Fungus esculentus, farinam rusciter molitam suaviter redolens, pileolo superna parte griseo, inferne lamellis angustissimis, simulcum pediculo albis. — Prugnolo nostrale buono, cinerino. — In Vepetis & sentis locis, praesertim montosis Vera & autumno.

3. Fungus esculentus, pileolo superna egriseo subobscuro, inferne lamellis & pediculo albis. — Vera & autumno in Sylvis.

4. Fungus esculentus, desuper plerumque purpureus griseus, interdum vero in aliqua parte aeneo colore perfusus, inferne lamellis & pediculo albis. — Calceatropiola. — in Sylvis.

5. Fungus esculentus, pileolo ampliore, fornicato, tenui substantia, desuper ex plumbeo, & eijaneo albescente, inferne prius albo, deinde griseo, pediculo brevissimo, albo. Capelloniino. — Ibidem provenit.

ps. 151. 6. Fungus odoratus, parvus, infundibuli forma, desuper egriseo-spadi-
ceus, pediculo concolore, lamellis torosis, sordide albis. — In Sylvis. — Eprimatella.

7. Fungus esculentus, egriseo-rufescens, inferne lamellis, & pediculo al-
bis, in emortua Eriugii radice nasens. — Cicciolo, forte a carnis lota & 2.
colore, vulgo colore di Ciccia lavata. — Octobri.

8. Fungus esculentus, pileolo desuper griseo, inferne simulcum pediculo
albo. — Corniola laodiva. — In Sylvis.

9. Fungus esculentus, pileolo superna egriseo-plumbeo, & veluti
squamoso, lamellis simulcum breviori, & habitiori pediculo albis. — Autumn.

10. Fungus esculentus, pileolo desuper murini coloris, inferne lamellis,
& tenuiori pediculo, albis. — In Ericetis &c. provenit etiam in agro.

11. Fungus esculentus, pileolo desuper cinereo, aut murino, & in
filamenta quasi lacinato, inferne candido, & tenuissime lamellato, pedi-
culo plerumque pariter candido. — In arenosis. Verius.

12. Fungus esculentus, parvus, & habitior, pileolo desuper cinereo,
aut murini coloris, ac in filamenta veluti lacinato, inferne lamellis argen-
teis, pediculo plerumque concolore. — In majore Sylvas.

p. 151.

13. *Fungus pileolo plano, & griseo-subinereo, inferne albo, pediculo tenuiori, conicolore, cylindraceo.* — Novembri.

14. *Fungus pileolo plerumque in plures partes usque ad centrum se dividens, utrinque griseo- & pediceo, superne filamentoso, pediculo albo, in ima & summa parte tumido* — Octobri & Sylvis.

15. *Fungus pileolo amplo, fornicato, tenui substantia, superne leucophoro, lamellis angustissimis, albis, pediculo conicolore brevissimo.* — Ad dejecturam arborum truncis — autumno.

16. *Fungus pratensis, esculentus, parvus, pileolo in medium umbilicato, & ad oras undulato, griseo, inferne albo, & tenuissime lamellato, pediculo brevissimo. pariter griseo.* — Melingozzano de prati — Autumno.

17. *Fungus pileolo parvo, hemisphaerico, griseo, lamellis simulcum bulboso, & pro alto pediculo albis.* — Fungo budello. — Autumno viger.

18. *Fungus pileolo disuper griseo, lacunato, & veluti crispato, inferne albo, pediculo conicolore pro alto, & intorto.* — Fungo Crespigno.

19. *Fungus albus, maculis gilvis frequentissime conspersus.* Grigolino.

20. *Fungus minimus, pileolo umbilicato, subinereo, lamellis & pediculo albis.* — Imbutino minimo di Scopeto — Majo.

p. 152.

Albi & lutei.

Fungus pileolo parvo, superna parte aureo, inferna cum crassiore pediculo albo. — In fagineis Sylvis. Septembri.

2. *Fungus pileolo subluteo, pulvinato, crispato, & veluti pustulato, lamellis cum pediculo albis.* — In nemoribus Autumnali tempore.

3. *Fungus parvus, odoratus, pileolo ampliore, depurpureo luteo rufescente, subtus lamellis crebris, albis, pediculo conicolore.* — Majo p. 54.

4. *Fungus gatericulatus, lubricus, pileolo & pediculo luteis, lamellis albis;* — Spallino lunacoso, che s'ovucola di mano. — In agris & hortis.

5. *Fungus parvus, pileolo conico, viscido, & aureo, subtus lamellis, & crassiori pediculo albis.* — Octobri inter Muscos.

pag. 182.

6. Fungus parvus, pileolo conico, superna parte auro, lamellis, & pediculo tenuiore, albis. — autumno.

7. Fungus parvus, capitulo conico, superna parte auro desuper luteo & limacino glaucine admodum splendens, lamellis, & fistuloso pediculo albis. Luncachino di capo giallo, e lutto, e di gambo bianco. — In agris super semiputrida Tritici caulis fragmenta — autumno.

8. Fungus minimus, viscidus, pileolo hemisphaerico, superna parte & pediculo aureis, lamellis vero albis. — Inter Muscos autumno viget. Albi, & luteo-virides.

Fungus esculentus, pileolo pulvinato, desuper e luteo-virescente inferne lamellis & pediculo albis. — Reperitur nontantum cum duobus antecedentibus, sicut etiam in erictis, & sylvis. Vere & autumno.

Albi & virides.

Ag. virens
Scop.

Fungus esculentus, pileolo pulvinato, viridi, inferne cum pediculo albo. Fungo Verdore. — In nemoribus vere & autumno.

2. Fungus pileolo caudato, viscido, intense viridi, & quasi vernigine obliquo, inferne lamellis, & pediculo albis. — Luncachino verde inverniciato. — In herbosis, & muscosis locis — autumno.

3. Fungus parvus, pileolo pulvinato, virescente, lamellis, & pediculo albis. — Verdachino di bosco. — In sylvis Quercinis autumno.

Albi & spadicei.

Fungus ad superficiem terrae vix apparens, pileolo e spadiceo fulvo, forma fere extinetorii, lamellis, & pediculo albis. — Sub Pinetis autumno.

2. Fungus e spadiceo-flavescens, superna pileoli parte laevi, veluti hirsuta, pediculo albo, pulvisculo concolore asperso. — Canapino di capo sfilaciatto, e con il piede forforoso. — Sylvaticus & autumnalis.

p. 183. 3. Fungus e spadiceo fulvus, pileolo parvo, in medio umbilicato, ad peripheriam rugoso, & crispo, lamellis albis, pediculo pro albo, radice lamida inaequantum mucronem veluti producta. — Fungo barbato — & sylvas.

1. *Fungus esulentus, ex ingente, perveni, & plerumque complanata radice in singulos menses præcipue æstivos nascent, pileolo desuper ex spadiceo-rufa, lamellis, & pediculo albis. — In omnibus fere locis, ubi Solipponus 12. sed rarissime occurrit.*

Albi & rufi.

Fungus esulentus, farinam recentem molitam redolens, pileolo atro-rufescente, lamellis albis, pediculo superius pileoli parti concolore. — Autumn.

2. *Fungus esulentus, infundibuli forma, farinam recentem molitam admodum redolens, pileolo late rufescente, lamellis & pediculo albicantibus.*

3. *Fungus Alpinus, pileolo ampliore, tum supra, tum subtus colore ex rufo-griseo, pediculo albo, viscoso, ac prædure. — In fag. sylv.*

4. *Fungus vernus, parvus, farinam rec. molitam admodum redolens, pileolo desuper late rufescente, inferius albo, lamellis vix lineam latis, pediculo conspiciore, superius pileoli parti concolore. — Prignolo nostrale, colore & Isabella. — Vere & autumno in sylvis. — Rarus.*

5. *Fungus vernus, parvus, farinam rec. molitam admodum redolens, pileolo desuper rufo, & in centro fusciorufo, subtus lamellis crebris, duas lineas latis, & pediculo albis. — In sylvis verno tempore.*

6. *Fungus esulentus, odoratus, parvus, pileolo rufescente, & umbilicato, lamellis albis, pediculo duriore, longiore, ac fistuloso, & superius pileoli parti concolore. — Martis &c. in agnis, & inculis.*

Albi, & Fulvi.

Fungus, pileolo semiorbiculato, superne, & inferne fulvo, pediculo albo.

2. *Fungus, pileolo parvo, fulvo, subhirsuto, lamellis albis, pediculo longissimo, fistuloso, pariter fulvo, & subhirsuto, radice mucronata. — Autumn.*

3. *Fungus parvus, campestris, pileolo sursum reflexo, utraque parte atro-fulvo, pediculo albogriseo, radice bulbosa. — Inter Saxa majo.*

p. 154. 4. *Fungus pileolo parvo, pulvinato, fulvo, superficie laevi, lamellis albis, pediculo longo, concolore, radice bulbosa. — In sylvis. Autumno.*

p. 154

Albi & Ferruginei.

1. Fungus visculus, desuper ferrugineus, inferne albus, pediculo superna pileoli parti concolor. — Octobri & Sylvas.

2. Fungus ex rubro-ferrugineus, lamellis albis, pediculo crassiore, superna pileoli parti concolor. — Rossola cattiva. — In Sylvis humidioribus.

3. Fungus pileolo superna parte dilute ferrugineo, radiis concoloribus, & saturatioribus eleganter distincto, subtus lamellis, & pediculo albis. — Fungus.

4. Fungus pileolo hemisphaerico, parvo, ferrugineo, lamellis albis, pediculo longo, superna pileoli parti concolor. — In nemoribus Autumnum cum 2. antec.

Albi & Obscuri, aliisque similibus coloribus, videlicet fuscis,
Sive Fuliginosi.

1. Fungus magnus, esculentus, pileolo desuper obscuro & laevo, ac per elegantem papilla in medio ornato lamellis albis, pediculo superna pileoli parti concolor, radice bulbosa. — Autumnum.

2. Fungus esculentus, pileolo desuper subobscurus, inferne albo, pediculo crassissimo, pyriformi, concolor. — Autumn. in lenticis &c.

3. Fungus esculentus, pileolo ampliore, ad oras undulato, desuper obscuro, inferne albo, pediculo brevi, concolor, radice rostrata, peracuta. In Sylvis.

4. Fungus esculentus, odoratus, superne subobscurus, & veluti verrugine oblitus, inferne lamellis, & pediculo albis. — In Castanetis & Ericetis.

5. Fungus esculentus, pileolo squama parte obscuro, pro parte cum breviori pediculo albo. — Prigerella. — Octobri.

6. Fungus Alpinus, esculentus, virens, parvus, & habitior, desuper 7. 74. 1. obscurus, inferne, & pediculo albus. — Fungo Marzuolo, o Dormiente. 8. 9. 1. Martio mense. Sub nive latet, ac viget.

7. Fungus esculentus, pileolo ex obscuro nigricante, lamellis & pediculo albis.

8. Fungus esculentus, pileolo fornicato (anulo fugacissimo, tripite fistuloso) tenuioris substantiae, superne obscuro, inferne lamellis albis, pediculo longo, cylindrico, non fistuloso, concolor. — Fungo Appassionato. — Aprilis.

9. Fungus pileolo fornicato, vertice tantum fusco, reliqua parte albo, lamellis concoloribus, pediculo utroque colore pulchre variegato. — Fungo Serpentino.

10. Fungus pileolo obscuro, extensorii forma, cute lacera, & veluti filamentosa, subtus lamellis, & cylindrico pediculo albis. — Autumnum.

Ag. cristis
Scopol.

11. Fungus sterquilinus, pileolo desuper ex obscuro-griseo, & in superficiei insquamis veluti lacerato, lamellis albis, pediculo concolore pro-
-albo, fistuloso. — In tumulis firmi Equini. Vera.

12. Fungus parvus, pileolo obscuro, ad ferrugineum nonnihil tendente, lamellis albis, pediculo graciliore, superna pileoli parti concolore. — ff. Sylv.

13. Fungus parvus, pileolo pulvinato, obscuro, maculis concoloribus, & saturationibus notato, subtus lamellis, & pediculo albis. — ff. nemora.

14. Fungus pileolo semiorbiculato, parvo, albo, lamellis varis, & longo, prostrato, & lineam crasso pediculo albis. — In Sylvosis locis super dejectis, & putridis lignis frequens.

Albi & nigri.

Fungus hirsutus, parvus, candidus, tenuissimus, ac facile in aquam solu-
-bilis, pileolo in exutum conum fastigiato, lamellis nigricantibus. — Tab. 74. f. 3.
- Pisciacane peloso. — ff. Sylvas. Autumno.

2. Fungus viscidus, pileolo cucullato, superne, & inferne nigro, pediculo albo, fistuloso. — Pisciacane nero. — In ruderatis - Veris Tempore.

Albi & carnei, vel rubri, vel purpurei, aut carulei.

Ag. rufula Scop.
Var. 3.

Fungus esculentus, pileolo superne rubro, inferne primum albo, deinde obsolete luteo, pediculo longiore, & crassiore, semper albo. — Rosola buona, di gambo lungo. — In Ericetis & Castanetis primovare.

2. Fungus nemorosus, tenuissimus, pileolo ampliore, tenuis substantia, su-
-perne albo, inferne suave rubente, pediculo fistuloso, perangusto, & super ad pilei parti concolore. — Pisciacane di bosco, dilegittissimo.

Ag. rufula Scop.
Var. 2.

3. Fungus esculentus, pileolo pulvinato, desuper rubro, subtus lamellis, & breviori pediculo albis — Rosola ordinaria. — Autumno in Sylvis ubique.

4. Fungus parvus, pileolo desuper Amaranthi saturationis colore, in-
-ferne lamellis, & breviori pediculo albis — Rosola minore & Autumno

5. Fungus esculentus, infundibulum imitans, pileolo viscido, ad oras undu-
-lato, saturate rubro, ad laevam colorem accedente, inferna vero parte, & pedicu-
-lo albis. — Lardajolo. — Autumno

p. 155.

Ag. rufula
var. 2.

idem.

6. Fungus esulentus, magnus, supreme purpureus, inferne lamellis
raris, & pediculo brevissimo, crasso, ac firmo albis. — Rosula maggiore.

7. Fungus esulentus, pileolo supra parte saturo-purpureo, prona vero
& pediculo albis.

8. Fungus esulentus, pileolo desuper dilute purpureo, vinoso, & luteo
albo vario, lamellis, & brevioribus pediculo albis. — Rosula mezzana. in sylv.

9. Fungus esulentus, albus, & subpurpureus varius, lamellis prostratis
albis.

p. 156 10. Fungus in cœnosis nascent, pediculo, & superna pileoli parte purpu-
reo, & albo colore variegatis, lamellis albis. — Fungus brizzato. — in ulig.
-osis & cœnosis locis. — æstivum tempore.

11. Fungus esulentus, pileolo desuper dilute purpureo, inferne lamellis, &
pediculo albis. — Præensis.

12. Fungus esulentus, pileolo plano, carneo, vel roseo, subtus albo,
pediculo crassiore, fistuloso, concolore, externe rugoso. — ubi 5.

13. Fungus parvus, pileolo inæquoso, supra parte ex albo-subvino
dilutissimo colore, prona vero saturo, pediculo candido, vix fistuloso. Autumn.

14. Fungus pileolo & pediculo cœruleis, lamellis albis. — Vedovino mag-
giore — Autumno.

15. Fungus parvus, pileolo hemisphærico, dilute cœruleo, lamellis albis,
pediculo superna pileoli parti concolore. — Vedovino minore, Turchino.

16. Fungus parvus, pileolo inæquum conum fastigiato, albo, purpureis
maculis tigrinis ad instar notato, lamellis pariter purpureis, pediculo su-
perna pileoli parti concolore. — Brizzato de Vasi. — In variis vicibus bre-
vioribus, non raro reperitur.

Leucophæi & rufescentes.

Fungus esulentus, parvus, pileolo sarsum reflexo, leucophæo, lamel-
lis rufescentibus, pediculo superna pileoli parti quasi concolore. — Severino.
In sylvis & ericetis.

Leucophæi & fuscis.

Fungus fimetarius, pileolo extensoris forma, leucophæo, subtus lamellis fuscis,
pediculo præalto tenuiore, fistuloso, & superna pileoli parti concolore. — Piscicane
Dilegine. — In sylvis & agris toto anno post pluvias exit.

Griseo-fusci, & carnes.

1. Fungus parvus, pileolo & griseo-fusco, subrusticulis carnis, pediculo summa pileoli parti dilute concolore, fistuloso.

2. Fungus parvus, pileolo pulvinato, utraque parte subfusca, vel ex griseo-fusco, pediculo firmo, ex albo-carneo. —

Leucophori, aut Grisei, aut Cervini, & Obscuri, vel Nigricantes.

Fungus stercorarius, pileolo leviter fastigiato, nitido, & griseo-cervino, inferne T. 73. obscuro, pediculo crassiore, non fistuloso, superna pileoli parti concolore. — 8. 1.

Autumno in fimo Equini aggestis.

Ag. Stercorarius Scop. 2. Fungus in fimo equino natus, desuper cervini diluti coloris, subrus alius lamellatus, & fuscus, pediculo tenui, fistuloso, ac superna pilei parti concolore.

In fimo equini gravis, Vere & Autumno.

p. 157. 3. Fungus parvus pileolo ^{sub}obscurus, & veluti filamentoso, lamellis, & pediculo griseis. — Vere in Sylvis, Castanetis, &c.

4. Fungus parvus, infundibuliformis, obscurus, lamellis griseis, pediculo fovee concolore. Octobri. per nemora nascent. non differt a T. 14. p. 145.

5. Fungus pileolo leviter fastigiato, superne obscuro, inferne griseo, pediculo tenuiori longo, superna pileoli parti concolore. — Autumno.

6. Fungus parvus, Eriophorus, pileolo campaniformi, superna parte cervini coloris, & in sericea filamenta lacerato, inferne lamellis concoloribus, pediculo albicante. — Fungo lanifero. — Octobri.

7. Fungus finetarius pileolo extractorii forma, leucophoro, lamellis nigris, pediculo tenuiori, pro alto, fistuloso, & superna pileoli parti concolore. — Pisciacane, paguetois, diligine. — In Sylvis, & agnis super bubulo fimo. Vere & autumno.

8. Fungus finetarius, pileolo ex griseo-rufescente, rugoso, lamellis nigricantibus, pediculo pro alto, tenuiori, ac fistuloso, & superna pileoli parti concolore. — Octobri in agnis.

9. Fungus parvus, stercorarius, pileolo desuper griseo, cuneuticula laeva quodammodo squamosa, inferne nigricante, pediculo superna pileoli parti saturatioris coloris. — In fimo Equino cepata fermentatione, haud prorsus evaporata.

10. Fungus finetarius, tenebrinus, pileolo galericulato, cinereo, subrus lamellis nigricantibus, pediculo altiori, per angusto, pariter griseo. Pisciacane diligine &c. In tumulis fimo Equini non raro oritur.

Spadicei & grisei.

pag. 187.

Fungus parvus, pileolo hemisphaerico, & spadiceo-griseo, filamentoso, lamellis proceris griseis, pediculo supernae pileoli parti concolore. — Octobri.

Spadicei & olivacei coloris.

Fungus pileolo in plures partes, usque ad centrum fere diviso, desuper spadiceo, & filamentoso, inferne lamellis olivaceis, pediculo pileoli supernae parti concolore. — Fungus Strantherae. — Octob. p. agrorum sulcos humidiores.

Lutei & murini, aut cinerei.

Fungus obsolete luteus, pileolo hemisphaerico, parvo, lamellis murini coloris, pediculo proceris, tenuiori, fistuloso. — Fungus chiodo. — In nem. autumnus.

2. Fungus pileolo parvo, in pyramidem quadrilateram veluti asurgente & simul cum longo, & fistuloso, & intorto pediculo aureo, lamellis cinereis, Geretta di Porta. — In hortis &c. autumnus.

p. 158.

Rufi, & subpurpurei.

Fungus esculentus, ex rubro-subpurpureus, inferne fulvus, pediculo crasso, pyriformi, & supernae pileoli parti concolore. — Fungus Zucchettino. — In nemora. Octobri.

2. Fungus parvus, pileolo rufo, ac subhiolato, lamellis dilute purpureis, pediculo intorto, fistuloso, & pileoli supernae parti concolore. — Pattonino di gambo storto. — Novembri p. ambulacra.

3. Fungus pratensis, minor, superna parte, & bulboso pediculo fulvis, lamellis subpurpureis. — Pattonino minore. — In herbis ambulacris.

Fulvi & lutei

Fungus pileolo desuper laevi, & veluti filamentoso, fulvi, pallescentisque 7. 74. coloris, substantia, & lamellis buxidis, pediculo fistuloso, supernae pileoli parti concolore. — Octobri. in Sylvis.

2. Fungus Alno adnascens, pileolo amplo, clipeato, tenuiori substantia, desuper ex fulvo lutescente, inferne lamellis, & pediculo breviori, obsolete luteis. — Fungus Giallone, di Ontano — ubi supra.

Fulvi, & violacei, vel dilute purpurei.

Fungus parvus, pediculo, & capitulo fulvis, lamellis dilute purpureis. In nem.

2. Fungus pileolo parvo, semiorbiculari, superne, & inferne fulvo, pediculo dilute violaceo, crasso, ac in acumen radicem versus desinente. — Nov. p. nem.

p. 158.

Albi & Fuscii

Fungus pileolo plerumque in plures partes usque ad centrum se dividente, superna parte, & praetero pediculo fulvis, inferne lamellis fuscis, radice bulbosa.

2. *Fungus fimetarius, alius radicans, pileolo galericulato, simul cum pediculo fulvo, lamellis subfuscis. — In torrici gluma semiputr. nasens.*

Fusci, vel obscuri, & purpurei.

Fungus pileolo hemisphaerico, superna parte, & pediculo fuscis, lamellis sordide, & dilute purpureis. — In nemoribus.

2. *Fungus pileolo crispo, sursum reflexo, infundibulum imitante, superna parte, & pediculo obscuris, inferna vero lamellis dilute purpureis. — In nemoribus. novembri.*

Obscuri & Carnei.

Fungus parvus, pileolo foveolato, obscuro, in medio umbilicato, & ubi vis inscissas, & tenuissimas squamas quasi lacinato, lamellis carneis, pediculo dilute concolore, fistuloso. — Per Sylvas Castaneas, & Ericetas. Mayo.

Obscuri & Nigri.

p. 159.

Fungus fimetarius, pileolo desuper obscuro, cute lacera, & quasi filamentosa, lamellis nigricantibus, pediculo fistuloso, superna pileoli parti concolore. — In arenosis circa fossarum Aggeris. Mayo.

Obscuri, & lutei, vel Auvei.

Fungus pileolo hemisphaerico, obsolete luteo, & ad vitellinum tendente lamellis obscuris, pediculo praetero, superna pileoli parti concolore. — Autumno.

2. *Fungus campestris, aureus, pileolo hemisphaerico, lamellis obscuris, pediculo superna pileoli parti concolore, radice bulbosa. — In stercoretis agris. Autumno.*

3. *Fungus totus luteus, pileolo ampliore, desuper maculis obscuris ubi vis radiata. — Octobri.*

4. *Fungus pileolo, & pediculo luteis, punctis subobscuris craberrime notatis, lamellis vero omnino subobscuris. — In Ericetis autumno.*

Coccinei, & aurantii coloris.

1. Fungus coccineus, inferne aurantii coloris. —
 2. Fungus parvus, pileolo hemisphaerico, desuper coccineo, inferne lamellis
 auris, pediculo summa parte plerumque coccinea, ima vero aurea. Oct.

Rubri, & lutei.

- Fungus pileolo hemisphaerico, croceo, inferne lamellis, & pediculo rubris.
 In nemoribus. autumnus.

Tricolores, albi, grisei, & spadicei.

- Fungus pileolo ampliore, extensorii forma, oris lacris, superne spadiceo, & splendente inferne griseo, pediculo crassiore, cylindraceo, albo.
 #. nem. octobri.

Albi, grisei, & lutei.

- Fungus pileolo desuper dilute luteo, cuticula lacera, & quasi in
 sericea filamenta abscissa, subrus lamellis griseo-pallidis, pediculo al-
 bo, polline ejusdem coloris conpresso. — Fungo Canapino, colore
 di Camoscio, & come di paglia. — Septembri & Sylvas.

2. Fungus parvus, superne exluteo-refescens, inferne griseus, pediculo
 albo, nitido, fistuloso. — Primavera in Nyctetis & arenosis.

p. 160.

Albi, grisei, & carnei, vel dilute purpurei.

- Fungus esculentus, farinam recentem molitam redolens, pileolo desuper
 cinereo, inferne carneo, pediculo longiore, & crassiore, albo. — Grumato grigio.
 Octobri.

2. Fungus parvus, superne e griseo-refescens, inferne purpureus,
 pediculo albo, tenui, cylindrico, fistuloso. — u. s. a.

3. Fungus esculentus, superne griseus, inferne suave rubens, pedicu-
 lo albo, tenui. — m. a. j. o.

4. Fungus esculentus, farinam recentem molitam redolens, pileolo
 desuper griseo-argenteo, inferne lamellis rarioribus, carneis, pediculo
 albo. — Inguuolo bastardo. — Majo.

5. fungus pileolo desuper e griseo rufescente, vel ex rufo griseo, inferne subpurpureo, pediculo cylindrico, albo, fistuloso. — Octobri.

6. Fungus parvus, subcinereus, lamellis purpureis, pediculo cylindrico, fistuloso, superne pileoli parti concolor. — In frum Equino, post pluvias.

7. Fungus superne pileoli parte ex albo grisea, inferne lamellis purpureis, pediculo albido. — Reverino — In eructis vere & autumno.

Albi, grisei, & Rufi.

Fungus esculentus, farinam recentem redolens, pileolo desuper griseo, subtus lamellis primun carneo-rufis, postea fulvis, pediculo albo. — In sylvis.

2. Fungus parvus, gracilis, pileolo ampliore, griseo, lamellis subrufis, pediculo tenui, cylindrico, albicante, fistuloso. — In sylvis.

3. Fungus parvus, pileolo cucullato, superne e griseo rufescente, lamellis ex aureso-fulvis, pediculo prateni, duro, albo carneo, & tenuissime fistuloso. — Primovere in sylvis.

4. Fungus elegans, pileolo galeriulato, superne rugoso, & ex rufo fulvo, inferne saturo griseo, & tenuissime lamellato, pediculo radicein vestas crassescente, albo, fistuloso, crispo, & serici modo lucente. — Autumno in arvis Carbonariis.

5. Fungus minimus, pileolo acetabuli forma, centro rufo, reliqua parte albo, lamellis pariter albis, pediculo leucophæo, pulvisculo farinaceo referto. — Imburino di legni marci — Septembri super ligna putrida.

Albi, grisei, & Obscuri, vel nigri.

Fungus infundibuli forma, desuper obscurus, subtus lamellis albis, pediculo griseo — Pratensis &c.

2. Fungus pileolo pulvinato, desuper e griseo-rufescente, inferne subobscurus, pediculo meatro, sesquilineam crasso, fistuloso, & candido. — Octob.

p. 161 3. Fungus pileolo campanulato, superne ex griseo-rufo, subtus lamellis obscuris, vel nigricantibus, pediculo gracili, albo, fistuloso — Sylvaticus.

Albi, Fulvi, & Spadicei.

1. Fungus parvus, pileolo conico, crassiori substantia, Spadiceo, & stuposo, inferne lamellis fulvis, pediculo albo. — Fungo lanapino. — Octobri p. Sylvas & agros recentem aratos.

Albi, Fulvi, & rufi.

1. Fungus parvus, pileolo desuper rufescente, inferne lamellis dentatis, fulvis, pediculo cylindrico, albo, tenuissime fistuloso. — Autumno ad Populos.

2. Fungus parvus, pileolo ex rufo albo, lamellis fulvis, pediculo pro-
-sus albo. — In sylvis — Autumno.

3. Fungus parvus, pileolo subhirsuto, & veluti araneosa lanugine infecto, colore subrufo, lamellis ex fulvo auris, pediculo cylindrico, albo. — Autum. p. prae.

Albi, rufospadicei & cervini.

Fungus odoratus, coriaceus, Superne rufospadiceus & subhirsutus, inferne primam albus, deinde rufescens, pediculo duro, cervini coloris. — Ad quercus. Mayo.

Albi, Fulvi, & obscuri, vel nigri.

1. Fungus pileolo catinetoni forma, fulvo, maculis obscuris notato, lamellis albis, pediculo cylindrico, fistuloso, tenuissimo, conicolore. — Pisciacane perzato. In fimi Equini aggestis. Errata.

2. Fungus pileolo fornicato, albo, in medio macula nigricante insignito, lamellis fulvis, pediculo brevi, Superne pileoli parti conicolore. In aggestis.

3. Fungus pileolo radiato, seu in tenuissimas partes tanquam radios us-
-que ad centrum se dividente, fulvo, inferne lamellis obscuris, pediculo Crassi-
-ore, albo, fistuloso, cylindrico. — Pisciacane scapigliato. — In fimi Equini tumali.

4. Fungus esculentus, fulvus, & veluti filamentosus, lamellis albis, pedi-
-culo pro alto, obscuro, radice tumida in mucronem longum producta. Autum.

5. Fungus pileolo superna parte fulvo, & filamentoso, ima albo, pediculo
pro alto, intorto, coriaceo, & subobscuris, radice tumida, in mucronem lon-
-gum producta. — nemora autumno.

6. Fungus pileolo amplo, obtuse fastigiato, atro-fulvo, lamellis obscu-
-ris, pediculo longiore, albo.

7. Fungus finetarius, pileolo conico, in superficie lacero, & veluti hirsuto, subfulvo, lamellis nigricantibus, pediculo albo, fistuloso. — Pisciacane Peloso.

In fimo Equino.

p. 161.

8. Fungus parvus, albus, pileoli vertice nigro, reliqua parte circularibus
Zonulis fulvis, inter se distinctis veluti interrupta, pediculo cylindrico, fistuloso.
— Girasole, idest Solissequus — Majo in herbis, & ambulantibus hortorum,
atque agrorum viget.

p. 162.

9. Fungus parvus, pileolo fornicato, albo, maculis fulvis, minutissime
consperso, inferne nigricante, pediculo prorsus albo. — In Quercuum Cavernis.

Albi, rufi, & ferruginei

Fungus pileolo fornicato, tenuioris substantia, ferruginea, aut torrefacta
macula in medio insignita, in reliqua parte ex griseo-rufescente, & in pulcher-
rimas, & quasi reticulatas rimas lacerato, lamellis tenuissimis albis, pediculo
concolore, radice tumida. — Per prata — Octobri.

Albi, rufi, & obscuri, vel nigricantes.

Fungus minimus, pileolo hemisphaerico, superne rufescente, inferne albo
& rarissime lamellato, pediculo nigricante, tenuissimo instar fili chalybis; De-
cembris mense, super delapsa, & demiputrida querna folia per nemora nascentis.

2. Fungus omnium minimus, super arcescentem junceam foliis articulo-Tab. 80.
-sis nascentis, pileolo hemisphaerico, ex rufo fulvo, lamellis albidis, pediculo f. 9.
Semiunciali, capillaceo, fusco; — In aliginosis nemoribus.

Albi, lutei, aut pallidi & obscuri.

Fungus pileolo eximiorum forma, apice fusco, reliqua parte pallido, &
guttis fuscis notato, lamellis, & longiore pediculo albis — Autumnus.

3. Fungus esculentus, pileolo desuper luteo, & obscure tineto, nunc
commixti, nunc distincti coloris, lamellis, & pediculo albis — Cognata giallerella.

2. Fungus esculentus, pileolo pulvinato, desuper lutei & obscuri coloris in-
ter se distincti, densissime variegato, inferne lamellis, & pediculo albis. —

4. Fungus parvus, pileolo pulvinato luteo, & obscuro colore vario, la-
-mellis, & crassiore pediculo albis. — Tigratino di Tre Coloni. — In Ericetis.

Albi, lutei, & nigri.

Fungus pileolo hemisphaerico, sordide auresco, pediculo aliori, albo, lamellis
concoloribus, ad oras punctis nigris notatis. — In Castanearum sylvis rarus.

2. Fungus esculentus, pileolo amplo, pulvinato, sordide luteo, lamellis al-
-bis, ac per oras nigris punctis notatis, pediculo brevi, crasso, & veluti bulboso.

p. 163.

3. *Fungus pileolo conico, sordide luteo, lamellis nigricantibus, pediculo pro-*
-alto, albo, fistuloso. - Piscicane giallo. - In fimo bubulo. - Vere & autumno.

Albi, pallidi, & crocei.

Fungus parvus, perniciosus, colore varians, pileolo conico, per acuto, nunc croceus,
nunc pallidus, interdum utriusque mixto, subrus albo, pediculo fistuloso, su-
-perna pileoli parti conicolore. - In ambularis inter gramina. - Autumno.

Albi, fusci, & purpurei.

Fungus esculentus, parvus, pileolo extinetorii forma, vertice fusco, reliqua
parte albo, lamellis tenuissimis, & densissimis, concoloribus, pediculo purpureo-
-caeruleo, radice bulbosa. - Autumno.

2. *Fungus pileolo ampliori, extinetorii forma, superficie inequali, &*
fusca, lamellis purpureis, pediculo albo, lineis subfuscis, veluti reticulato.
- Dormentone. - In hemoribus.

3. *Fungus parvus, pileolo desuper fusco nigro, lamellis albis, pediculo cy-*
-lindrico, tenuiori, dilute violaceo. - Vedovino di Trecedoni.

Albi, Leucophaei, & spadicei.

Fungus pileolo amplo, ex spadiceo flavescens, cum limbo semper subrus
repando, lamellis albis, pediculo brevi, leucophaeo. - Autumno in Sylvis.

Albi, murici, & obscuri.

Fungus parvus, pileolo murino, semiorbiculari, centro in papillam acutam vehi-
-ti exprorecto, subrus lamellis crebris, albis, pediculo obscuro, radice bulbosa. - Octobr.

Albi, carnei, & obscuri.

Fungus parvus, pileolo complanato, obscuro, ac tenuissime corrugato, infer-
-ne primum albo, deinde dilute rufescente, & ad carneum tendente, pediculo
cylindrico, fistuloso, plerumque albo-pallido. - Maio & Sylvas.

2. *Fungus parvus, pileolo fornicato, & griseo subobscurum, vertice nonni-*
-hil umbilicato, lamellis carneis, pediculo cylindrico, albo, tenuiori, vix fis-
-tuloso. - In Sylvis.

Pallidi, Lutei, & Cocinei.

Fungus parvus, pileolo conico, aureo, & cocineo vario, lamellis pal-
-lidis, pediculo striato, atque intorto, fistuloso, & superna pileoli parti
conicolore. - Autumno.

p. 164.

Pallidi, lividi, & fusi.

Fungus parvus, pileolo hemisphaerico, vertice fusco, reliqua parte, & pro parte pediculo pallidis, lamellis lividis. — *Spallierello*. — ad ficus. autumnus.

Lutei, cinnabarini, & nigri.

Fungus parvus, pileolo conico, partem croceo, partem vivido, cinnabaris rubore resurgens, inferne lamellis nigris, pediculo tumidiore, fistuloso, toto luteo.

Grisei, purpureo-caerulei, & nigri.

Fungus parvus, pileolo fastigiato, desuper nigro, subus griseo, pediculo tenuiore, ex purpureo caeruleo. — *S. Silva* autumnus.

Grisei, rubro-ferruginei, & obscuri.

Fungus pileolo cucullato, superna parte, & cylindrico pediculo in subobscuras, & rubro-ferrugineas lineas distinctis, atque laceratis, lamellis griseis. — *Majo*.

Cervini, carnei, & obscuro-fulvi.

Fungus parvus, pileolo fornicato, desuper ex obscuro-fulvo, & vitido, lamellis alioribus, cervini coloris, cito in atramento solubilibus, pediculo cylindrico, tenuiore, sordide, & dilute carneo. — In fictilibus recentibus fimo equino stercoratis.

Cinerei, dilute-purpurei, & obscuri.

Fungus parvus, pileolo cucullato, obuso, & umbilicato, atque in seneca filamenta lacerato, obscuro, lamellis dilute purpureis, pediculo tenuiori, cylindrico, cinereo. — Per ambulaia — *Verno tempore*.

Rufi, obscuri, & nigri.

Fungus parvus, elegantissimus, pileolo umbilicato, ac trilobato, obscuro, T. 79. lamellis varioribus, torosis, & rufescentibus, pediculo coriaceo, nigro, fistuloso. — Super putridis, & humi projectis arborum truncis.

Fulvi, purpurei, & nigri.

Fungus pileolo ex fulvo-ferrugineo, & usque ad centrum in plures partes plerumque se dividente, lamellis nigricantibus, pediculo tenuiori, cylindrico, purpureo-violaceo diluto, fistuloso. — In nemoribus.

Albi, lutei, & medii inter utrumque coloris, scilicet albo-lutei.

p. 165.

Fungus alpinus, parvus, pileolo ex aureo-vitellino, subus albo, densissime, & tenuissime lamellato, pediculo quasi medii coloris. — *Autumno*.

p. 165.

Ex rubro-ferruginei, albi, & medii coloris.

1. Fungus pileolo desuper ex rubroferrugineo, subius lamellis albis, pediculo medii coloris — In Sylvis — autumno.

2. Fungus infundibuliformis, desuper rufescens, inferne albus, & tenuissime lamellatus, pediculo medii coloris. — Autumno in Pratis &c.

3. Fungus parvus, odoratus, infundibuliformis imitans, pileolo desuper rufo, inferne albo, pediculo medii coloris — In nemoribus autumno.

Grisei, Lutei, & medii coloris.

Fungus parvus, Autumnali tempore radicibus Allii adnascens, pileolo plano, griseo, lamellis luteis, pediculo medii quasi coloris. — Oxarino —

2. Fungus parvus, pileolo hemisphaerico, desuper ochroleuco, & limacino T. 74. glutine infecto, subius griseo, pediculo tenuiori, fistuloso, medii quasi coloris, F. 11. radice bulbosa. — Limacino pagliato di radice grossa. — In herbosis — post pluvias.

Grisei, obscuri & Medii coloris.

Fungus parvus, infundibuliformis, desuper obscurus, inferne griseus, pediculo medii coloris. — Variat aliquando totus albus, ideoque non differt a n. 14. pag. 144. — Octobri & nemora.

Quadricolores albi, suave-rubentes, obscuri & Sulphurei.

Fungus pileolo galeculato, cute lacera, & quasi in sericea filamenta rissa, summa pileoli parte alba, media suave-rubescens, reliqua vero sub-obscura, lamellis crebris, sulphureis, pediculo albo, splendente, & veluti pustulato. — Autumno.

Albi, grisei, pallidi, & Rubri.

Fungus parvus, pileolo hemisphaerico, sordide lutescente, inferne griseo, pediculo albo, maculis rubris notato. — In nemoribus autumno.

Albi, dilute Coerulei, fulvi, & nigri.

Fungus atramentarius, pileolo caeculato, apice fulvo, reliqua parte dilute coeruleo, lamellis nigris, pediculo albo, fistuloso. — In stercore Canino — Mayo.

Albi, cinerei, dilute purpurei, & atrii.

Fungus pileolo amplo, extintorii forma, vertice atro, reliqua parte cinereo, inferne lamellis, primu dilute purpureis, deinde nigris, pediculo fistuloso, albo, cylindrico. — In vineis, aliisque locis steroratis. Autumno.

Albi, dilute purpurei, subfusi, & atrii.

Fungus nanus, pileolo amplo, extintorii forma, vertice atro, reliqua parte subfusco, inferne lamellis dilute purpureis, pediculo albo, ad radicem tumido. Capellone Piscicane. — Post diuturnas pluvias. Vere & autumno exit.

V. Pileolo desuper plerumque undique striato.

Unicolores, Albi.

Fungus Sterquilinius, gracillimus, totus albus, pileolo utrinque, & undique striato, pediculo altiori, tenui, fistuloso. — In fimo Equino - Octobri.

2. Fungus gracillimus, Androsacen, vel acetabulum marinum simulans, T. 79. primu totus albus, & farinallivis respersus, postea capitulo utraque parte f. 6. griseo, ac tandem lamellis ob vetustatem nigricantibus, pediculo fistuloso semper albo, radice scellata. — Majo & nemora.

Ag. umbelliferus L. 3. Fungus minimus, totus albus, pileolo hemisphaerico, utrinque striato, T. 80. lamellis rarioribus — Autumno variis in locis. f. 11.

Grisei, cinerei, Murini.

Fungus parvus, campestris, cinereus, pileolo galericulato, striato, pediculo in T. 79. superficie laevi. — Autumno in agris vulgo Stobbie. Fungo Stoppasiao minore. f. 8.

2. Fungus minimus, acaulos ferre, griseus, pileolo fornicato, utrinque striato. T. 74. f. 8. — In caudicibus arborum post pluvias.

3. Fungus perpusillus, murini coloris, pediculo oblongo, pileolo tenui, utrinque striato, seu flabelli in modum plicatili.

Rufi.

Fungus ex rufo-fuscus, pileolo hemisphaerico, umbilicato, ac striato, subtus parum lamellato, pediculo pro alto, fistuloso, radice in tenuem & longum mucronem producta. — Fungo barbuto in sylvis.

2. Fungus parvus, totus rufescens, tenerimus, pileolo campanulato, utrinque & undique striato, pediculo tenuiori, fistuloso. — Majo.

p. 167.

3. Fungus parvus totus atro-rufescens, pileolo desuper undique, & leviter striato, subtus rare lamellato, pediculo paratenui, fistuloso. — Post diut. plu. in Sylv. T. 78. f. 8.

Fulvi, seu Leonini coloris.

Fungus minimus fulvus, acaulos ferre, pileolo fornicato, & striato, necnon spise lamellato, pediculo comulore veferto. — Ad laud. arbor. post diut. plu. aut.

Purpurei

Fungus fimetarius, minimus, subpurpureus, pileolo rare & utrinque striato, pediculo perangusto, fistuloso. — Funghietto di Lonicio, col capo rigato, tutto di colore violetto. — autumno Super fimi equini tumulos.

Bicolores albi, & Cinerei.

Fungus minimus, fimetarius, pileolo utrinque, & undique striato cinereo, aut murino, pediculo lanuginoso, & fistuloso, albo. — In primum fine. Vere. T. 78. f. 9.

2. Fungus minimus, tres, vel quatuor lineas altus, pileolo orbiculato, plano, utraque parte subcinereo, desuper in medio nonnihil umbilicato, reliqua parte striato, pediculo albo, fistuloso, infra & supra tumido. T. 79. f. 9.

Hic fungus fugacissimus, vitam scilicet unico die finiens — Pluvia tempestare in vasis arena, fimo vacuo, & quisquiliis permixtis.

Albi & Rufi.

Fungus minimus bulbosus, tres, vel 4 lineas altus, pileolo galeularo, desuper undique, quasi striato, & rufo-albicante, inferne lamellis & fistuloso pediculo albis. — Varro tempore ubi procedens. T. 79. f. 10.

Albi & Lutei.

Fungus minimus, pileolo hemisphaerico, utrinque, & undique striato, super na parte luteo, prona vero & fistuloso pediculo albis. — Inter Muscos. — Gallianor. T. 75. f. 7.

Lutei & Nigri.

Fungus sesquialinus, gracillimus, pileolo desuper luteo & a vertice ad tertiam fere partem neri, reliqua vero striato, subtus lamellis nigris, pediculo aliori, sesquilineam crasso, fistuloso, & superna pileoli parti concolore. — Piscicane dilegine, rigato, giallo, & nero. — In fimi equini aggestis — autumno, sed omnino varissimus.

p. 168.

Albi, & obscuri, vel fusi.

Fungus campanulatus, pileolo obscuro, vertice lavi, reliqua parte kniato, subus lamellis, & fistuloso, ac cylindrico pediculo albis. — Rigatino di bosco.

2. Fungus pileolo ex obscuro griseo, vertice laevi, reliqua parte striato, lamellis albis, pediculo cylindrico, fistuloso, superna pileoli parti concolore. - Majo.

3. Fungus parvus, pileolo hemisphaerico, utrinque & undique striato, ac albo, vertice vero, & capillareo pediculo nigro. - In Sylvis. Octobri.

4. Fungus capitulo utrinque & undique striato ac albo, Presbiterorum pileolo aliquatenus simili, pediculo capillareo nigricante. - Gerretia di Prete.

5. Fungus pileolo candidante, lamellis parvis (concoloribus) pediculo fusco splendente. Bot. Paris. 69. n. 58. Tab. II. f. 21. 22. 23.

Grisei & obscuri, vel Nigri.

Fungus pileolo campanulato, desuper obscuro, in vertice laevi, reliqua parte sulcato, costis nitidis, sulcis vero transverse striatis, lamellis griseis, pediculo cylindrico, magis cavo, & superna pileoli parti concolore. - Hortensis.

2. Fungus fimetarius, minimus, griseus, pileolo cucullato, ubique striato, t. 74. lamellis nigricantibus, pediculo superna pileoli parti concolore. - In fimo Equi. f. 6.

Rufi & Fulvi.

Fungus minimus, gracillimus, Musco Polygoni folio innascens, pileolo Tab. 80. galericulato, undique & leviter striato, fulvo, inferne rufo-griseo, pediculo f. 8. angustissimo, fistuloso, & superna pileoli parti concolore. Majo post pluvias.

Virides & Carnei.

Fungus parvus, elegans, cantharidum colorem, splendorem, & odorem emulans, pileolo cum vertice laevi, reliqua parte pulchre striato, lamellis carneis, pediculo cylindrico, fistuloso. - Majo in Castaneis.

Tricolores, albi, grisei vel cinerei, & Fusci vel nigri.

Fungus pileolo ampliore, hemisphaerico, desuper pulchre, & undique fusco striato, griseo, inferne lamellis nigricantibus, pediculo cylindrico, albo, & fistuloso. - In fossarum Aggeribus.

2. Fungus gracillimus, pileolo ampliori, cucullato, cinereo, & a fusco vertice ad tertiam fere longitudinis partem laevi, reliqua vero striato, lamellis pariter cinereis, pediculo albo, pro alto, fistuloso, & sesquilineam crasso. - Fungo gentile. - Inter herbas humectis Locis.

p. 169.

3. Fungus pileolo galericulato, ab imo ad summum striato, griseo, & lanuginoso, lamellis concoloribus, circa margines nigricantibus, pediculo cylindrico, albo, praefixo, fistuloso. — Autumno in fimo Equini aggestis.
4. Fungus pileolo parvo, conico, argutissime & undique striato, griseo, subtus lamellis nigris, pediculo aliori, albo lineam, vel sesquilineam crasso.
5. Fungus parvus, gracillimus, pileolo griseo, complanato, centro nonnihil umbilicato, & laevi, reliqua parte undique striato, lamellis nigricantibus, pediculo albo, lineam crasso, fistuloso. — Rigatino di Concio. Vere & autumno non solum in agris, sed etiam in sylvis super Equino fimo.
6. Fungus fimetarius, pileolo tenuis, substantia cinereo, centro nonnihil umbilicato, & laevi, reliqua parte striato, lamellis concoloribus, circa margines nigricantibus, pediculo lineam crasso, albo, fistuloso. — In hortis. majore.
7. Fungus minimus, terrestris, tenerimus, pileolo complanato, & umbilicato, proorsus striato, & cinereo-rufescente, inferne fusco, pediculo tenuissimo, albo, fistuloso. — Vere in fictilibus dum decoratis saepe legitur.
8. Fungus minor, tenerimus, farina respersus, pileolo superne cinereo, lamellis subtus tenuissimis, creberrimis, nigris (pediculo albo) Ray. Synops. &c.

Tricolores albi, fulvi, & medii inter utrumque coloris.

1. Fungus pileolo desuper fulvo-spadoceo, centro umbilicato & laevi, reliqua parte rugoso ac veluti striato, inferne lamellis albis, pediculo praefixo, medii quasi coloris, radice tumida, in mucronem longius producta. — In hortis.
2. Fungus pileolo plano, fulvo, undique rugoso, & veluti striato, & inter peripheriam & centrum circulari, saturationi, & concolori macula notato, lamellis albis, pediculo medii coloris, radice olivae forma, in acutum & longum mucronem producta. — & nemora autumno.

Obscuri, fusi & medii inter utrumque coloris.

- Fungus parvus, pileolo fornicato, desuper obscuro, & magis ad omes, quam ad Tab. 74. reliquas partes pulchre striato, inferne lamellis fusco-griseis, pediculo lineam crasso, medii coloris & argutissime perforato. — In sylvis. — majore.

V. Omnia ut in ordine antecedenti, sed pileolo a dimidia fere longitudine usque ad peripheriam, vel circa ipsam duntaxat striato.

Albi.

- Fungus totus albus, pileolo extensorii forma, verrice peracuto, & ad omes nonnihil striato, pediculo longo, cylindrico, fistuloso, sesquilineam crasso. — In sylvis.

2. Fungus gracilis, totus albus, pileolo hemisphaerico, ad oras striato, pediculo altiori, fistuloso, sesquilineam crasso. — In fimo Equino, vel bubulo. Tab. 78. f. 6.
 3. Fungus parvus, gracillimus, totus albus, pediculo conico, & media sui parte usque ad oras striato, pediculo biunciali, prosterui. — Dillen.

Grisei, aut Marini.

Fungus, sive Amanita, pileolo plano, orbiculari, oris nonnihil striatis D. Dillenii. Ex libro ejusdem decripto, ut etiam sequens.

2. Fungus, sive Amanita, parva, utrinque striata, pileolo coniformi, murini coloris Dill. Cat. Giss. 182.

Lutei.

Fungus luteus, pileolo hemisphaerico, & a medio ad peripheriam striato, pediculo altiori, fistuloso, sesquilineam crasso — Giallino rigato. Inter semiputrida folia post diuturnas pluvias Vere & autumno oritur.

2. Fungus parvus, flavo-fuscus, pileolo galeinulato, a medio ad peripheriam striato. — Amanita parva, striata, flavofusci ubivis coloris Dill. Cat. 182.

Fulvi.

Fungus parvus, fulvus, pileolo in obtusum conum fastigiato, & a media sui parte usque ad oras subtilissime striato, pediculo altiori, lineam crasso, & fistuloso — Fungus vello d'legine, colore di foglia morta, col capello a foglia di Campana.

Albi & Spadicei

Fungus viscidus, pileolo amplo, fornicato, spadiceo, & a medio ad peripheriam striato, castis ab origine ad tertiam fere longitudinis partem levibus, reliqua parte Margaritarum lineis in modum nodosis, lamellis, & pediculo albis. — Lunaeone rigato. — Autumno.

Obscuri & nigri.

Fungus minimus, Nigris foliis semiputridis innascens, pileolo semi-orbiculari, & a media sui parte usque ad oras striato, superne, & inferne obscuro, pediculo capillaceo, nigro.

IV. Pediculo anulato, anulo permanente, & adherente.

V. Pileolo desuper non striato.

Unicolores Albi.

Fungus bulbosus, campestris, esculentus, totus albus, pediculo palmarum, non fistuloso, anulo perangusto cincto. —

p. 171. 1. Fungus fimetarius, totus albus, pileolo fornicato, squamoso, pediculo cylindrico, obeso, cuius cutis in cinnamatas, & acutas squamas soluta. — fungo Pellucione ricciato maggiore. — In feni Equi canalis per agros.

2. Fungus pratensis, totus albus, pileolo & pediculo inmultifidas, & cinnamatas squamas pulchras soluta. — fungo Pellucione ricciato minore.

3. Fungus totus candidus, pileolo ampliore, glutine limacino infecto, pediculo tenuiori, cylindrico, anulo striationi cincto. — In fag. Sylvis.

4. Fungus bulbosus, nemorosus, esculentus, albus, pileolo fornicato, pediculo cylindrico, crasso. — Autumno.

5. Fungus esculentus nemorosus, albus, pediculo longo, crasso, radice tumida. — Praxolo di ragnaja tutto bianco, buono, e di gambo lungo.

6. Fungus esculentus, pratensis, totus albus, pediculo brevi, obeso.

7. Fungus esculentus, totus albus, & splendens, pileolo pulvinato, parvo, pediculo aliori, cylindrico, anulo peramplo cincto. — Ad sepes.

8. Fungus totus candidus, pileolo fornicato, pediculo tenui, anulo striationi cincto, radice crassa & pyriformi. — Bubbolina bianca, buona.

9. Fungus minimus, albus, pileolo leviter fastigiato, pediculo cylindrico, tenuiori, anulato, fistuloso. — In Sylvis — Autumno.

Tab. 78
f. 7.

Lutei vel Crocei

Ag. Fitericus
Scop. pol.

1. Fungus esculentus, odoratus, pileolo fornicato, pediculo longo cylindrico, anulato. — Lecino giallo. (Strip. solis. Splend. curricula filam. Pil. aur. Caro etiam flav.)

2. Fungus parvus, totus luteus, pileolo pulvinato cum oris subres repandis, pediculo tenui, cylindrico, anulo perangusto ornato. — Giallini di gambo corto.

3. Fungus parvus, croceus, pileolo pulvinato, pediculo longo, angusto, cylindrico, & anulato. — In Ericetis & Sylvis ceduis. — Autum.

Fungus esculentus, bulbosus, subpurpureus, pileolo complanato, & in superficie laevo, pediculo brevi, annulato. — Bubboletta buona, colore di Agata, o di Principe, striato. — & venosa.

Bicolori albi, & grisei vel cinerei, aut Cervini.

Fungus esculentus, bulbosus, pileolo lato, nonnihil fornicato, saturo-griseo, vertice papillato, lamellis, & palmaris ac annulato pediculo albis.

2. Fungus campestris, bulbosus, pileolo fornicato, desuper cinini coloris, & in vertice quasi fastigiato, subtus lamellis albis, pediculo concolore, annulato, & vix fistuloso, radice bulbosa. — In sylvarum locis.

3. Fungus bulbosus, esculentus, pileolo fornicato, desuper griseo-saturo, cute laeva, centro papillato, lamellis albis, pediculo longo concolore, anulo subtecto cincto. — In capretis & senecosis locis autumno abest.

4. Fungus esculentus, parvus, pileolo griseo, fornicato, atque in medio fastigiato, lamellis albis, pediculo pariter albo, fistuloso & annulato.

5. Fungus esculentus, pileolo fornicato, griseo-plumbeo, lamellis albis, pediculo concolore, quasi cylindrico, anulo perangusto cincto. — In herbosis. Mayo.

6. Fungus esculentus, pileolo fornicato, desuper cinini coloris, cute laeva, lamellis albis, pediculo concolore, anulo perangusto cincto, radice quasi bulbosa. — In agris.

7. Fungus esculentus, parvus, pileolo pulvinate, albo, & limbo glutine infecto, lamellis murinis, pediculo pariter albo, gemmo, & perangusto anulo cincto. — Frangole bianco. — In agris. Vere.

Albi & lutei.

Fungus campestris, astivus, pileolo complanato, albo, lamellis luteis, pediculo longo, cylindrico, superius pileoli parti concolore, & anulo perangusto cincto.

2. Fungus parvus, pileolo ochroleuco, lamellis albis, pediculo tumido, superius pileoli parti concolore, & annulato. — Fungherello colore di lamorio, o di terra gialla. — In Apicis.

Albi & Rufi.

Fungus esculentus, bulbosus, pileolo amplo, fornicato, ex rufo-fulvo, cute valde laeva, & in filamenta veluti dissecta, lamellis, & annulato pediculo albis. — In sylvis.

2. Fungus bulbosus, esculentus, pileolo desuper rufescente, & in media protuberante, inferius albo, pediculo longo, concolore, anulo angusto cincto.

3. Fungus bulbosus, esculentus, pileolo ex rufo-fulvo, cute nonnihil laeva, centro papillato, lamellis, & annulato, ac longo pediculo albis. — In sylvis. — Bubola buona.

173.

4. *Fungus esculentus*, pileolo fornicato, desuper ex rufo-fulvescente, inferne albo, pediculo cylindrico, pro alto, crasso, concolore, & ample anulato. — Autumno.
5. *Fungus esculentus*, odoratus, pileolo superne rufescente, inferne albo, pediculo longo, concolore, anulato. — Ad ficus. autumno.
6. *Fungus bulbosus*, esculentus, pileolo rufo-ferrugineo, vel atro-rufescente, cute lacera, & veluti squamosa, lamellis albis, pediculo fistuloso, concolore, anulo per angusto radicem versus cineto. — Octobri.
7. *Fungus bulbosus*, esculentus, pileolo rufo-ferrugineo, vel atro-rufescente parvis, pileolo desuper ex albo-rufescente, inferne prorsus albo, pediculo concolore, fistuloso, & anulato. — In Enietis.
8. *Fungus bulbosus*, esculentus, pileolo rufo-spadiceo, vel rufo-griseo, lamellis albis, pediculo superne pileoli parti concolore, & vix anulato.
9. *Fungus esculentus*, pileolo plano, rufo-fusco, inferne albo, pediculo cylindrico, concolore, anulato. — Autumno.
10. *Fungus esculentus*, parvus, pileolo extensori forma, patulo, rufescente, lamellis unacum cylindrico, ac anulato pediculo albis. — Vere in senticosis &.

Albi & Fulvi.

Fungus pileolo, & pediculo albis, ac maculis fulvis paucissimis infectis, lamellis prorsus fulvis. — Ad sepes, & in sylvis. autumno.

Albi & Obscuri, vel Fuliginosi.

Fungus bulbosus, esculentus, maximus, pileolo fornicato, subobscuro & lacero, centro papillato, lamellis albis, pediculo pro alto, fistuloso, & superne pileoli parti concolore, anulo firmo cineto. — Octobri in Sylvis. In Italia editur.

2. *Fungus esculentus bulbosus*, pileolo insigniter echinato, ex obscuro-ferrugineo, inferne lamellis subtilissimis, & densissimis, albis, pediculo superne pileoli parti veluti concolore, & anulo ampliore cineto. Viget ubi & quando s.

3. *Fungus esculentus*, pileolo ex obscuro fulvo-purpureo, inferne lamellis albis, pediculo ventrioso, superne pileoli parti concolore, anulo per-ample cineto, radice veluti vorticata. — Collarone, o Sottana di bosco.

4. *Fungus bulbosus*, esculentus, parvus, pileolo ex obscuro-ferrugineo-rufescente, inferne lamellis tenuissimis, albis, pediculo anulato, & superne pileoli parti colore nonnihil infecto. — Octobri.

174.

5. *Fungus esculentus*, parvus, totus albus, pileolo fastigiato, maculis subobscuris notato. — Rubbolina buona, odorifera, brizzolata. — In agrorum fossis, atque aggeribus. autumno.

p. 174 6. Fungus parvus, pileolo albo, & quasi fuligine infecto, atque scrobiculis
~~levis nate~~ seu lacunulis parvisque excavato, lamellis, & anulato pediculo
 prorsus albis. — In agris, arundinetis, & stagnosis locis — Estate.

7. Fungus Finetarius, pileolo obtuse coniformi, fuliginoso, lamellis al-
 bis, pediculo conicolore, proalto, cylindrico, fistuloso, duas lineas crasso, ad
 radicem versus anulato. — Autumno.

Albi & Rubri.

Fungus pediculo concolori & pileolo suave-rubentibus, lamellis albis.

Albi & Purpurei.

Ag. pratensis
 Scop.

Fungus esculentus, magnus, albus, pileolo fornicato, lamellis subrubentibus,
 pediculo longiore, & crassiore ample anulato. — Pratajolo maggiore bianco, buono.

idem.

2. Fungus esculentus, major, pileolo lato, pulvinato, superna parte candido,
 inferne lamellis purpurascens, pediculo brevi, superna pileoli parti conicolore,
 & duplici anulo cineto. — Pratajolo maggiore di gambo cotto, bianco, e con doppio
 anello. — In Italia editur.

3. Fungus esculentus, albus, pileolo insuperficie nonnihil lacero, ad oras
 angulato, & limbo membranaceo cineto, lamellis dilatesime purpureis, pe-
 diculo longiore plerumque rimoso, pariter albo, radice bulbosa.

4. Fungus esculentus albus, pileolo angulato, desuper nonnihil lacero,
 ad oras limbo membranaceo cineto, lamellis ex albo subpurpureis, pediculo
 longiore, plerumque rimoso, radice tenuiori. — Ad sepes & in majo-

5. Fungus esculentus, pileolo desuper albo, & in superficie lacero, sub-
 tus subpurpureo, pediculo superna pileoli parti conicolore, anulo parvo
 cineto, radice candida, reticulata, terro alba immixta. — Pratajolo di rad. profon-
 da, e reticolata.

6. Fungus esculentus, hortensis, parvus, pileolo desuper albo, & lacero, T. 78.
 inferne subrubente, pediculo superna pileoli parti conicolore, anulo tenuiore
 cineto, radice candida, repente. — Pratajolo di radice serpeggiante F. 3.

7. Fungus esculentus, pratensis, pileolo fornicato, desuper levi, & candido, in-
 ferne subpurpureo, pediculo brevior, ample anulato, & superna pileoli parti
 conicolore. — Pratajolo bianco.

Ag. campestris
 L.

8. Fungus campestris, albus superne, inferne rubens. — In pratibus.

p. 178.

9. Fungus esculentus, pileolo fornicato, desuper albo, & lavi, inferne vero subpurpureo, pediculo superne pileoli parti concolore, anulo peramplo cineto. Pratajolo Turino. In pratibus.

10. Fungus parvus, nitide albus, lamellis carneis, aut roseis, pediculo anulato, superne pileoli parti concolore.

Albo-Purpurei, & prorsus Purpurei

Fungus esculentus, desuper ex albo purpurascens, & veluti subhirsutus, subtus sordide purpureus, pediculo brevissimo, superne pileoli parti concolore, & anulo perangusto cineto. — Pratajolo Salvatico rosso. — Ausum.

Pallidi, & lividi, vel Grisei.

Fungus campestris, esculentus, desuper palacei coloris, lamellis livido-nigris, pediculo ample anulato, & superne pileoli parti concolore. — C. f. sp. 1.

2. Fungus vernus, pileolo superna parte albo-sulphureo, seu ochroleuco, inferius lamellis griseis, pediculo albo, ample anulato, radice bulbosa. — Ad fossas & locos aggerosos, necnon in sylvis, pratibus, &c. crep.

Grisei, Nigri, vel Obscuri.

Fungus bulbosus, esculentus, pileolo fornicato, desuper obscuro, inferne griseo, pediculo anulato, superne pileoli parti concolore, quasi.

2. Fungus bulbosus, serotinus, pileolo obuse coniformi, nitido, & griseo, inferne nigricante pediculo tenuissime fistuloso, & superne pileoli parti concolore. — Per feni equini granulos.

Tricolores albi, Grisei, vel cervini, & Purpurei, aut Subpurpurei

Fungus bulbosus, esculentus, superna lamina, aut cervini coloris, cute latera, & veluti filamentosa, lamellis albis, pediculo pro albo, anulato, subpurpureo. — Bubbola Salvatica.

2. Fungus esculentus, pileolo hemisphaerico, griseo-cervino, inferne lamellis dilute purpureis, pediculo longo, cylindrico, albo, anulo perangusto cineto. — Pratajolo Salvatico di gambo lungo, ed anello stretto. In sylvis & ad sep.

3. Fungus perniciosus, superna griseus, & leucophorus, inferne dilute purpureus, pediculo albo, brevior, anulato. — Pratajolo d. Turino minore. in hortis.

1. *Fungus esculentus, superna parte e griseo-albus, inferna subnubens, pediculo proorsus albo, radice repente. — In arundinetis & ad sepes.*

p. 176. 5. *Fungus minimus, esculentus, pileolo e griseo subobscuro, cute lacera lamellis albis, pediculo cylindrico, anulato, subpurpureo. — In Sylvis.*

Albi, Grisei, & Flavi.

T. 78.
f. 6.

Fungus vernus, pileolo sulphureo, & ad paleaceum colorem tendente, lamellis griseis, pediculo albo, ample anulato, radice bulbosa. — In prat. hort. &c.

2. *Fungus esculentus, parvus, pileolo hemisphaerico, desuper pallide luteo, subtus dilute purpureo, pediculo albo, cylindrico, gemino, & perangusto anulo cincto. — In agris post satum & enatum corticem.*

Albi, rufi, & Flavi.

Fungus esculentus, odoratus, superna rufescens, inferne pallidus, pediculo albo, longo, cylindrico, & anulato. Ad sepes in Sambuci vimis nascitur.

Albi, purpurei & Fulvi, vel fulvo-subobscuri.

Fungus esculentus, pileolo desuper ex fulvo-subobscuro, cute lacera, inferne dilute purpureo, pediculo longo, albo, anulato, ac radicem versus crassescente. — Prata solo Salvatico. Per fimi Equini tumulos.

2. *Fungus esculentus, parvus, acaulis ferme, pileolo fornicato, intense fulvo, superficie in ampliores squamas veluti scissa, lamellis carnis, vel suave-rubentibus, pediculo brevissimo, albo, anulato.*

Albi, rufi, & Medii inter utrumque Coloris.

Fungus esculentus, e griseo-rufescens, inferne albus, pediculo longo, cylindrico, medii coloris, anulo perangusto cincto. — Autumno.

2. *Fungus parvus, esculentus, pileolo atro-rufescente, patulo, ac in medio protuberante, subtus albo, pediculo cylindrico, medii coloris, & anulo perangusto cincto.*

3. *Fungus minimus, pileolo in medio papillato, undique atro-rufescente, cute lacera, veluti squamosa, lamellis albis, pediculo vix fistuloso, & anulato, medii coloris.*

Tab. 78.
f. 8.

Albi, fulvi, & Fuscii.

Fungus bulbosus, esculentus, pileolo extensorii forma, vertice fusco, reliqua parte fulva, & veluti squamosa, lamellis albis, pediculo anulato, & superna pileoli parti conicolore. — Bubbola buona, Scagliosa.

Albi, Ferruginei, & Fuscii.

Fungus bulbosus, parvus, pileolo extensori forma, ferrugineo, & maculis fuscis minutissimis undique infecto, lamellis albis, pediculo anulato, superna pileoli parti conicolore. — *Bubalina Calliva*.

Flavi, rufi, & Obscuri.

Fungus esulentus, pileolo in medio veluti hirsuto, & flavescente, reliqua parte ex atro rufescente, inferne colore non dissimili, sed valde dilato, pediculo crassiore, obscuro, inter pileolum, & protenue anulum striato.

Quadricolores obsoleti, ferrugini, subpurpurei, & Fuscii.

Fungus bulbosus, esulentus, pileolo complanato, limbo ferrugineo, reliqua parte obsolete luteo, & maculis pariter insignitis ferrugineis, subus lamellis dilute purpureis, pediculo anulato, fusco — *Bubola Buona di quattro colori*.

IV. Pediculo anulato, anulo durabili, & eidem pediculo non adhaerenti.

Unicolores, albi

Fungus collinus, candidus, duplici pileolo. — *Michel non vidit*.

Bicolores albi, & obscuri, vel Fuscii.

Fungus pileolo lato, longissimo pediculo variegato.

2. Fungus quercinus, dipsaioides (pileolo conico — Fungus bulbosus, fuscus, duplici pileolo. C.B. Pin. 371. Inst. R.H. 557. — Per agros.

3. Fungus bulbosus, esulentus, maximus, pileolo inanimoso, obscuro, & in filamenta quasi lacerto, vertice papillato, subus lamellis albis, pediculo cubitali, fistuloso, superna pileoli parti conicolore, & pariter lacero, corolla amplissima, soluta cineto. — *Bubola maggiore coll'anello non fissato, alquanto.* Tab. 81. f. 1.

4. Fungus bulbosus, esulentus, medius, pileo fornicato, obscuro, & in superficie lacero, lamellis albis, pediculo palinari, superna pileoli parti ferme conicolore, & pariter lacero. — *Bubola mezzana d. mazza da Tamburro*.

5. Fungus bulbosus, esulentus, medius, pileolo desuper obscuro, subus lamellis albis, pediculo palinari, facto, superna pileoli parti conicolore, anulo perangusto soluto cineto — Autumno in Ericetis, Capris Sylvis, &c.

IV. *Pediculo anulato, anulo non permanenti, seu fugaci, qui ut plerimum dum pileolus dehiscit, in aranearium telum vel in membranacea frustula, modo ad pediculum, modo ad pilei circumferentiam solvitur atque disperditur.*

Unicolores albi.

1. *Fungus major, albus, villosus, & quasi quadrilaterus dum e terra erumpit, ovum gallinaceum referens, postea aditus in oblongam notam producit, & in atramentum resolvitur, pediculo fistuloso, candido, ac anulo fugaci cineto, radice rostrata. — Vere & autumno in arenosis, in ripis, inter iuncos &c.*

2. *Fungus minor villosus, & ex albo-rufescens, dum nascitur ovum gallinaceum referens, postea in notam oblongam producit, & in atramentum resolvitur, pediculo fistuloso, candido, anulo fugaci cineto, radice rostrata. In pascuis.*

3. *Fungus totus albus, pileolo fornicato, pediculo crassiore, quasi cylindrico, anulo fugaci cineto. — Pluribus in locis autumno oritur.*

4. *Fungus parvus, totus albus, pileolo mammoso, pediculo cylindrico, in spiram modum plerumque intorto, anulo fugaci cineto. — Autumnalis.*

Grisei.

Fungus esculentus, griseus, pileolo pulvinato, & in medio nonnihil excavato, pediculo crasso, cylindrico, ac anulo fugaci cineto. — Autumno.

Xanthini.

Fungus bulbosus, xanthinus, pediculo longo, crassiori, anulo fugaci cineto. fungo vedovo, capelluto.

Fulvi.

Fungus parvus totus fulvus, pileolo fornicato, pediculo gracili, cylindrico, anulo fugaci cineto. — In herbosis ambulatoris. Tab. 78. f. 4.

2. *Fungus fulvus, pileolo expanso, ac leviter fastigiato, pediculo altiori cylindrico, anulo fugaci cineto.*

Obsolete lutei.

Fungus odore, & sapore raphanum simulans, obsolete luteus, & ad olivae conditae colorem accedens, pileolo pulvinato, in superficie laevi, pediculo anulo fugaci cineto, ac radicem versus crassiente.

pag. 179.

2. Fungus odore, & sapore Raphanum simulans, obsolete luteus, & ad fulvum colorem tendens, pileolo leviter fastigiato, & quasi subhiolato, pediculo longo, cylindrico, anulo fugali cineto. — Fungo Ramolaccio giallo &c. Autumn. Tab. 75 fig. 2.

Bicolores albi & grisei.

Fungus pileolo pulvinato, crassioris substantiae, superne albo, inferne griseo, pediculo cylindrico, fistuloso, pariter albo, anulo fugaci cineto, radice plerumque bulbosa. — Primovese.

Albi & Fulvi.

Fungus pileolo fornicato, Superne, & inferne ex rufo-fulvo, pediculo albicante cylindrico, anulo fugaci cineto. — In Sylvis.

2. Fungus pileolo pulvinato, ex rufo-fulvo, lamellis albis, pediculo Superne pileoli parti concolore, & anulo fugaci cineto, ac radicem versus coarcescente. — usi.

3. Fungus esculentus, albus, lamellis duntaxat fulvis, pediculo crasso quasi cylindrico, anulo non permanenti cineto. — Octobr.

4. Fungus pileolo fulvo, & limacino glutine, admodum infecto, lamellis primum dilute purpureis, postea Superne pileoli parti concoloribus, pediculo cylindrico, anulo fugaci cineto, albo, cujus cutis in plures circulares Zonulas pulchre, & constanter se dividit. — Autumnus in Sylvis passim.

5. Fungus parvus, superne ex fulvo-spadiaceus, inferne atro-fulvus, pediculo cylindrico, albo & veluti sericeo, ac anulo non permanenti cineto. — In horis.

Albi, & Castanei.

Fungus pileolo pulvinato, castanei coloris, inferne lamellis albis, pediculo tumido, Superne pileoli parti concolore, ac anulo fugaci ornato. —

p. 180.

Albi, & obscuro-subpurpurei.

Fungus parvus, ex obscuro-subpurpureus, pileolo hemisphaerico parvo, lamellis albis, pediculo cylindrico, pariter albo, ac anulo fugaci cineto. In nemoribus.

Albi & Nigri.

Fungus atramentarius, vel potius in atramentum solubilis, pileolo cucullato, primum albo, post lacerationem cutis una cum lamellis nigro, pediculo cylindrico, fistuloso, candido, anulo non permanenti ornato. — Pisciarane Maggiore Bianco, enero. — In fimo Equino.

Lutei, & Fulvi.

Fungus esculentus, pileolo desuper paleacei coloris, dilute luteus, pileolo for-
-nicato, subus ex obscuro nigricante, pediculo cylindrico, superna pileoli parti
concolore, & anulo fugaci instructo, radice bulbosa. — Super equinum finium adhuc
a fermentatione calefactum.

Fungus esculentus, pileolo desuper paleacei coloris, lamellis entro-fulvis, pe-
-diculo superna pilei parti concolore, anulo fugaci munito, radice fovee bulbosa.
Premiato giallo.

2. *Fungus* pileolo fornicato, superne luteo, subus lamellis fulvis, pediculo
fistuloso, turgido, superna pileoli parti concolore, & anulo non permanenti or-
-nato. — Autumnali tempore.

Lutei & obscuri.

Fungus stercorarius, viscidus, dilute luteus, pileolo fornicato, subus ex obscuro
-nigricante, pediculo cylindrico, superna pileoli parti concolore, & anulo fugaci
instructo, radice bulbosa. — Super finium equinum adhuc a fermentatione calefactum.

Tricolores albi, Leucophæi, & obscuri.

Fungus parvus, odore gravi, pileolo desuper obscuro, inferne albo, pediculo
cylindrico, leucophæo, anulo non durabili praedito.

Albicanter, Ochroleuci, & rufo-pallidi.

Fungus viscidus, pileolo fornicato, desuper rufo-pallido, lamellis ochroleu-
-cis, pediculo longo, cylindrico, albicante, ac anulo momentaneo cincto. —
Autumno in Sylvosis.

Albi, rufi, & Rubentes.

Fungus bulbosus, pileolo hemisphaerico, crassioris substantia, superne ru-
-fescente, inferne subrubente, pediculo albicante, anulo fugaci ornato;
Octobri.

Albi, aurei, & Violacei.

Fungus viscidus, pileolo fornicato, desuper ex aureo-pallido, subus
dilute violaceo, pediculo albo, anulo non permanenti cincto, ac radicem
versus crassescente. — In Sylvosis.

Albi, Rosei, vel Suave-rubentes, & nigricantes.

Fungus in arenosis nascent, pileolo conico sex uncias longo, ex albo-roseo, vel suave rubente, lamellis nigricantibus, pediculo fragili, cylindrico, fistuloso & candido, ac anulo non durabili ornato. — Pisciacane de venisio detto abrinente Guglia.

Albi, obscuri, & nigri.

Fungus bulbosus, pileolo complanato, obscuro, oris sursum reflexis, lamellis nigricantibus, pediculo candido, palmari, fistuloso, anulo non durabili instructo. — Super Equini fini Tumulos. autumno.

Albo-purpurei, spadiceo-pallidi, & fulvi.

Fungus viscidus, pileolo fornicato, desuper spadiceo-pallido, ad peripheriam rugoso, lamellis fulvis, pediculo cylindrico ex albo-purpurascente, anulo fugaci aucto. — autumno.

Fulvi, Violacei & Livido-fusci.

Fungus bulbosus, pileolo complanato, livido-fusco, ad oras dilute violaceo, lamellis fulvis, pediculo superna limbi pilei parti concolore, anulo non durabili ornato. — Ad Sepes.

IV. Pediculo anulato, anulo ut supra.

V. Pileolo desuper ubivis striato.

Bicolores albo-grisei & nigricantes.

Fungus scerquilinus ex albo griseus, pileolo striato, ac in superficie Tab. 80. laevo, vertice nigricante, pediculo cylindrico, albo-griseo, anulo fugaci munito. f. 3. Super fini Equini Tumulos.

III. Volva seu involucreo amplo, & valde apparente erumpentes, ad radicem diu permanente.

IV. Pediculo non anulato.

V. Pileolo desuper non striato.

Unicolores Luteo-pallidi.

Fungus parvus, & volva erumpens, pallide luteus, pileolo pulvinato, pediculo brevissimo cylindrico. —

Damae coloris.

Fungus minimus, & volva erumpens, Damae fusci coloris, & Serici instar lucens, pileolo leviter fastigiato, pediculo cylindrico. — Autumno in nemoribus.

Bicolores, albi, & carnei.

Fungus magnus, esculentus, e volva erumpens, pileolo villosus, albo, lamellis Tab. 76. carneis, pediculo cylindrico, glabro, pariter albo. — Super verustas & semimortuas fig. 1. arbores — astate.

2. *Fungus parvus, e volva erumpens, pileolo fornicato, albo, & sericeo, lamellis carneis, pediculo cylindrico, fistuloso, superna pileoli parti concolore. Per herbosa ambularia, atque foparum aggeres. Autumno —*

3. *Fungus minimus, odoratus, e volva erumpens, pileolo albo, & veluti sericeo, inferne carneis, pediculo cylindrico, fistuloso, & superna pileoli parti concolore — Vere & autumno.*

Albi & Grisei.

Fungus e volva erumpens, pileolo supina parte e griseo subobscuro, pro-na vero primum albo, postea dilute purpureo, pediculo non fistuloso, semper albo, radice bulbosa. — Autumno & proata &c.

Albi & Lutei.

Fungus esculentus e volva erumpens, pileolo fornicato, supina parte luteo, inferne albo, pediculo longo, cylindrico, pariter albo. — In sylvis.

Albi & Virides.

Fungus e volva erumpens, pileolo superna parte viridi, & splendente, lamellis, & cylindrico pediculo albis. — Sylvaticus — ad Flices.

Albi & Obscuri.

Fungus parvus, e volva erumpens, pileolo desuper ex obscuro nigricante cutellacera, & veluti squamosa, inferne albo, pediculo cylindrico, superna pileoli parti concolore. — In Viridariis.

Grisei & Fusci.

Fungus griseus, e volva erumpens, pileolo fornicato, centro fusco, pediculo cylindrico tenuiore, in superficie lacero, & veluti squamoso. — Astate in clausura Chartusie Vallis Pisis, sed raro.

Tricolores albi, murini, & rufescentes.

Fungus esculentus, e volva erumpens, odore, & sapore Raphani, griseus, inferne rufescens, pediculo albo, longo, radice bulbosa. Loppajola. — Ad Tritici palearium inter efumas, & paleas semiputridas, tempore autumnali.

Albi, grisei-argentei, & carnei.

1. Fungus esculentus, e volva erumpens, pileolo desuper griseo-argenteo splendente, subus carneo, pediculo longo, albo, radice bulbosa. — Autumno per fimi Equini tumulos.

Albi, rufi, & murici.

1. Fungus e volva erumpens, pileolo leviter fastigiato, desuper murici coloris, inferne ex albo-rufescente, pediculo albo, cylindrico. — Juxta paleas.

V. Omnia ut in antecedenti divisione, sed pileolo a medio ad peripheriam, vel in ipsa peripheria tantum striato.

Unicolores, albi.

1. Fungus esculentus, e volva erumpens, major, totus albus, pileolo obtuse fastigiato, & ad peripheriam striato, pediculo cylindrico, fistuloso.

2. Fungus e volva erumpens, totus albus, pileolo fornicato, ad oras striato, pediculo cylindrico. — In campestribus. Autumno inter triticum.

Bicolores, albi, & aurei.

Fungus esculentus, e volva erumpens, pileolo desuper ex aureo-pallido, & a medio, ad oras striato, lamellis, & pediculo albis. — In Ericetis &c.

Albi & Grisei.

1. Fungus esculentus, e volva erumpens, pileolo fornicato, ad oras nonnihil striato, griseo-rufescente, inferne albo, pediculo cylindrico conicolore, & in superficie pulchre lacerato. — In Sylvis, necnon in Castaneis. Aestate.

2. Fungus e volva erumpens, pileolo Superne griseo, ad oras striato, inferne albo, pediculo cylindrico, conicolore, angustissime fistuloso. — Mayo & Octobri.

Albi & Rufi.

1. Fungus parvus, e volva erumpens, pileolo raso, ad oras striato, inferne albo, pediculo cylindrico, pariter albo, ac parum fistuloso. — Tab. 76. f. 2.

Albi & Fulvi.

#. 184 1. Fungus e volva erumpens, pileolo fulvo, ad oras striato, inferne albo, pediculo cylindrico, pariter albo. — In agrorum sulcos inter triticum.

2. Fungus e volva erumpens, pileolo fulvo, ad oras striato, inferne albo, pediculo cylindrico, superne pileoli parte veluti conicolore, & maculis saturationibus notato. — In silvosis locis.

p. 184.

Albi & obscuri.

Fungus e volva erumpens, pileolo desuper obscuro, & ad oras striato, inferne albo, pediculo concolore, cylindrico, valde fistuloso. — Octobri.

Tricolores albi, grisei, & rufi.

Fungus e volva erumpens, pileolo fornicato, desuper griseo, & ad oras tenuissime striato, inferne subrufo, pediculo cylindrico, crasso, albo, fistuloso, & polline concolore resperso. — Autumno.

Grisei, albi, & medii coloris.

Fungus e volva erumpens, superne griseus, inferne albus, pediculo cylindrico, altiori, fistuloso, externe laevo, & medii quasi coloris.

Obscuri, grisei, & medii coloris.

Fungus esculentus, e volva erumpens, pileolo desuper ex obscuro-griseo, & ad oras striato, inferne griseo albo, pediculo fistuloso, medii quasi coloris. In pratulis.

IV. Pediculo anulato.

V. Pileolo ad oras non striato.

Unicolores albi.

Fungus esculentus magnus, e volva erumpens, totus albus, graviter odoratus, lamellis crebris, & creberrime denticularis, pediculo obeso anulato.

? Fungus e volva erumpens, totus albus, pediculo cylindrico, parvo, & anulato. — Bubbola bianca, o uovo bastardo. — In Sylvis autumnis.

p. 185.

Purpureo-carnei.

Fungus e volva erumpens, totus purpureo-carneus, pediculo cylindrico, anulato. — Bubbolina di Color Colombino, o di principe. — In Sylvis Abnegis.

Bicolores albi & ochroleuci.

Fungus e volva erumpens, pileolo desuper ochroleuco, sive albo-pallido, inferne lamellis, & cylindrico, anulato, & fistuloso pediculo albis.

? Fungus esculentus, e volva erumpens, parvo, pileo desuper pallido, inferne lamellis albis, pediculo altiori, fistuloso, cylindrico, & anulato, pariter albo.

Albi & Grisei.

Fungus parvus, & Volva erumpens, pileolo desuper dilute griseo, inferne Tab. 76. cum fistuloso, ac anulato pediculo albo. — In pratens. &c. f. 3.

Albi, & Subpurpurei.

Fungus esculentus, & Volva erumpens, albus, pediculo palnari, cylindrico, & anulato, pediculo maculis subpurpureis notato. — Cocolla bianca buona &c. Autumno in agrorum sulcis inter triticum.

Fulvi, & rufescentes.

Fungus & Volva erumpens, pileolo extensorii forma, obtuse fastigiatum, utraque parte fulvo, pediculo cylindrico, anulato, pro albo, & ex albo-rufescente. — In Ericetis, & Sametis &c. Autumno.

Tricolores Sulphureo-grisei, albi, & pallidi.

Fungus esculentus, & Volva erumpens, pileolo desuper ex sulphureo-griseo, quandoque prorsus griseo, inferne albo, pediculo nunc concolore, nunc pallido, cylindrico, altiori, anulato, & fistuloso.

V. Pileolo ad oras striato.

Unicolores albi.

Ag. Cocolla
Scop.

Fungus esculentus, & Volva erumpens, totus candidus, pileolo ad oras striato, pediculo cylindrico, anulo ampliore cineto. — In agris juxta Seminas.

2. Fungus & Volva erumpens, totus candidus, pileolo ad oras breviter striato, pediculo cylindrico, anulo perangusto cineto. — Uovolo Salvatico &c.

p. 186.

3. Fungus esculentus, & Volva erumpens, totus albus, pileolo ad oras striato, pediculo cylindrico, ampliore, anulato. — Uovolo buono, bianco. raris.

Bicolores aurei, & pallidi.

Tab. 77. f. 1. Fungus planus, orbicularis, aureus (pileo convexo) — Vere & autumno.

Albi & Rubri.

Fungus pileolo desuper sature rubra, & ad laudem colorem accedente, ad oras striato, inferne albo, pediculo palnari, cylindrico, & anulato. — Uovolo malefico rosso. — In Abiegnis, & fagineis sylvis Estate, & Autumno.

III. Volva, seu involuero parvo, & minus epparente erumpentes, quod insuperna pileoli parte in fragmenta solida dissectum, ac distributum diu remanet.

IV. Pediculo non anulato.

V. Pileolo desuper non striato.

Unicolores albi.

Fungus totus candidus, parvus, parvus, e Volva erumpens, pediculo non anulato, Tab. 80.
ac radicem versus sensim, & leviter crassescente. Autumnus. — *Tignosa bianca senza* fig. 4.
anello.

Bicolores albi, & cinerei, eunt plumbei.

Fungus perniciosus, e Volva erumpens, viscidus, Superne subcinereus, Subtus lamel-
lis albis, pediculo non anulato, pariter albo, radicem versus sensim & leviter
crassescente.

Albi, & Subobscuri.

Fungus e Volva erumpens, pileolo superna parte subobscurus, inferne albo, pediculo
non anulato, pyramidato, pariter albo, radice bulbosa. — In nemoribus.

Albi & Sordide purpurei.

Fungus e Volva erumpens, pileolo sordide purpureo, & ad fusco-ferrugineum col-
orem tendente, inferne lamellis albis, pediculo pyramidato, non anulato, superna
pileoli parti concolore, radice bulbosa. — *Tignosa cattiva, vosa, e bianca senza* anello.

p. 187. IV. Omnia ut in divisione antecedente, sed pediculo anulato.

Unicolores albi.

Fungus magnus, totus albus, esculentus, e Volva erumpens, pediculo pro alto anulato,
radice bulbosa. — *Tignosa bianca maggiore de' campi, di radice grossa.* — In agris.

2. *Fungus* magnus, e Volva erumpens, candidus, esculentus, inodorus, in arenosis
nascent, pediculo pro alto, cylindrico, & anulato, radice rostrata. — Junio.

3. *Fungus* esculentus, totus albus, bulbosus, e Volva erumpens, pediculo anulato.

4. *Fungus* esculentus, e Volva erumpens, parvus, totus candidus, pediculo anu-
lato, cujus cutis in reflexas, obtusas, & quasi in se convolutas squamas dissecta, ac
pulchre distributa soluitur. — In prati, &c. primovere.

Bicolores albi, & grisei, aut cervini.

Fungus e Volva erumpens, pileolo desuper griseo, ac limacino glutine infecto, pe-
diculo cylindrico, crassiore, albo, & anulato, radice bulbosa. — Autumnus.

2. *Fungus* e Volva erumpens, pileolo desuper griseo, inferne albo, pediculo pariter Tab. 78.
albo, anulato, in eam partem versus sensim crassescente, radice bulbosa. — f. 1.

3. *Fungus* esculentus, e Volva erumpens, pileolo desuper griseo, inferne albo,
pediculo cylindrico concolore, anulo strictioni cineto, radice bulbosa.

pag. 187.

4. Fungus esculentus, magnus, e volva erumpens, pileolo desuper cervini dilutissimi coloris, lamellis albis, pediculo pariter albo, ample anulato, cujus cutis in oblongas, obtusas, ac deorsum pulchre convolutas squamas dissecta, ac distributa solvitur, radice acuta, & veluti rostrata. — Maio in agris & seorsum ambulantibus.

Albi & spadicei.

Fungus e volva erumpens, pileolo desuper spadiceo, inferna parte & cylindrico, ac anulato pediculo albis. — Autumno in sylvis.

Albi & rubri, aut purpurei.

Fungus magnus, e volva erumpens, pileolo desuper rubro-aureo, inferne albo, pediculo anulato, concolore, radice bulbosa. — Uovolo Salvaticornalefio rosso, o. Tignosa maggiore rossa, e bianca. — In nemoribus.

p. 188. 2. Fungus bulbosus, magnus, e volva erumpens, pileolo desuper rubro, inferne albo, pediculo anulato, palmari, externe concolore, interna parte rubro, cujus cortex circa radicem in plures partes, tanquam vi elastica plerumque dirumpitur.

4. Fungus esculentus Alpinus, e volva erumpens, pileolo superna parte rubro, inferna & anulato pediculo albis, radice bulbosa.

3. Fungus esculentus Alpinus, e volva erumpens, desuper subrubens, subus lamellis & longo pediculo albis, radice bulbosa. — In sylvis abiegnis. Autumnus.

Ag. Scandiacinus Scop. Fungus e volva erumpens, pileolo desuper vinoso lundo colore tincto, inferne albo, pediculo anulato, superna pileoli parti concolore. — Octobri.

Albi & ex obscuro-purpurascetes.

Fungus e volva erumpens, pileolo desuper ex obscuro-purpurascete, dilute tincto, inferne albo, pediculo crassiore, ample anulato, pariter albo, radice bulbosa.

Agaricus Rubens Scop. Fungus esculentus, e volva erumpens, pileolo ex obscuro-purpurascete, inferne albo, pediculo crasse albo, nunc subpurpureo, anulato, radice bulbosa. M.

Albi & obscuri.

Fungus e volva erumpens, pileolo desuper obscuro, inferne albo, pediculo longo, anulato, concolore, radice bulbosa. — Octobri.

2. Fungus esculentus, e volva erumpens, pileolo desuper obscuro, inferna parte, & vix anulato pediculo albis.

V. Pileolo desuper, velle medio ad peripheriam, vel per ipsam peripheriam tantum striato.

Bicolores albi & aurei.

Agar. Muscarius L. Fungus bulbosus, e volva erumpens, pileolo superna parte aureo, & ad oras striato, Tab. 78. inferna & anulato pediculo albis, radice bulbosa. f. 2.

Albi & Grisei.

Fungus esculentus, parvus, pileolo superna parte griseo, & ad oras striato, inferne albo, pediculo longo, cylindraceo, pariter albo, anulo perangusto cineto, radice bulbosa. — Verius.

Albi & Spadicei.

Ag. Stramineus
Scop.

Fungus bulbosus, esculentus, & volva erumpens, pileolo desuper spadiceo, & ad oras striato, inferne albo, pediculo anulato, concolore, inam partem versus crassescente, radice bulbosa. — Tignosa bionda. — Autumno.

Albi & obscuri.

Fungus bulbosus, esculentus, & volva erumpens, pileolo desuper ex obscuro-griseo, & ad oras striato, inferne albo, pediculo cylindrico anulo perangusto cineto. — Autumno post diuturnas pluvias.

2. Fungus & volva erumpens, pileolo desuper ex obscuro griseo ad oras striato, inferne albo, pediculo concolore, anulato, inam partem versus crassescente, radice bulbosa. — In silvis ceduis, & in Ericetis.

III. Volva, seu involuero parvo, & minus apparente, erumpentes, quod in minutos veluti floccos per supernam pileoli partem, & etiam per pediculum tanquam in anulum resolvitur, & brevi tempore evanescit.

IV. Pediculo non anulato.

V. Pileolo desuper non striato.

Bicolores Fulvo-ferruginei, & grisei.

Fungus pileolo hemisphaerico, fulvo-ferrugineo, lamellis, & fistuloso, ac tenuiore T. 81.
pediculo griseis — Mayo. f. 3.

III. Volva ut in divisione antecedenti, sed in superna pileoli superficie partim in floccosis micis, partim in stellata portiancula dumtaxat, remanente.

V. Pileolo a vertice, ad oras striato.

Albi & Plumbei.

Fungus, qui vix e volva egressus in atramentum resolvitur, pileolo campanulato, T. 80.
vertice laevi, plumbeo, reliqua parte striato, pediculo cylindrico albo, fistuloso, f. 6.
radice rostrata. — In hortis autumno. — Michel. vidit sup. gallin. finium.

Quadricolores, Plumbei, rufi, albi, & pulli.

T. 80.

Fungus, qui vix e volva egressus in atramentum resolvitur, pileolo campanulato, vertice laevi, & griseo-rufi, reliqua parte tenuissime striato, & plumbeo, lamellis densissimis, pullis, pediculo albo, fistuloso, inferiora versus sensim, & leviter crassescente, radice in longissimum mucronem producta. — Loco & temp. cum antedicto. — Fungo lesina, di. pollina. f. 2.

p. 190.

- I. Fungi caespitosi, seu fasciculosi, nempe ab una tantum radice, plures exeuntes.
 II. Ramosi. — III. Pediculo non annulato. IV. Pileolo superne non striato.

Bicolores albi, & grisei.

Fungus ramosus, maximus, pileolo desuper griseo, inferne lamellis & lanu-
 -ginoso pediculo albis. — Autumno. in sylvis. Tab. 79.
fig. 1.

II. Non ramosi.

Unicolores albi.

Fungus esculentus, odoratus, infundibuliformis, multiplex, superne albus,
 inferne prorsus albus, pediculo brevi, lanuginoso. — ad Populos nigras autum.

2. Fungus ex una radice multiplex, totus albus, infundibuliformis, pedi-
 -culo tumido. — in nemora — autumno.

3. Fungus esculentus, infundibuliformis, albus, ex una radice multiplex
 pileolo in plures partes se dividente, tenuioris substantiae, & in superficie
 laevi, radice modo brevi, modo longissima. — Ad rad. populi & Sambuci.

4. Fungus alpinus, parvus, candidus, viscidus, ex uno pede multiplex
 pediculo cylindrico. — In montibus inter castaneas.

5. Fungus parvus, totus albus, ex uno pede multiplex, pediculo tumido.

6. Fungus minimus, fasciculosus, candidus, pediculo cylindrico. — In hor-
 -tis ad puros, aliasque arbores. autumno.

Grisei.

Fungus ex uno pede multiplex, bulbosus, griseus, pileolo sursum refle-
 -cto, & acetabuli modo cavo, lamellis dilute concoloribus. — ad fagorum radic.

Rufi.

Fungus esculentus, ex una radice multiplex, sature rufescens, lamellis
 primum albis, postea concoloribus, pediculo duro, plerumque crispo &
 complanato, ac radicum versus in acutum sensim attenuato. — In sylvis.
 Vere & autumno.

2. Fungus parvus, ex uno pede multiplex, totus rufescens, pileolo
 fornicato, tenuis substantiae, lamellis perangustis, pediculo cylindrico.
 In nemoribus loco, & tempore praedicto.

p. 191. 3. Fungus parvus, rufus, ex una radice multiplex, pileolo complana-
 -to, & ad oras plerumque undulato, & sursum reflexo, pediculo brevi,
 fistuloso, subhirsuto. — Majo in hortis.

Fulvi.

1. Fungus ex uno pede multiplex, fulvo-spadiceus, pileolo crasso, utrinque turbinato, ac desuper veluti subhiusculo, pediculo & lamellis primum quasi concoloribus, postea obscuris. — Octobri.

2. Fungus parvus, ex uno pede multiplex, fulvus, pileolo fornicato, pediculo tenui, cylindrico. — Ad dejectas Hlices.

Spadicei.

Fungus cespitosus, elegans, pileolo fornicato, spadiceo, in superficie veluti in proexiguas squamas pulchre lacinato, lamellis albis, pediculo cylindrico, superne pileoli parti concolore. — Astivo tempore in sylvis.

Aurei, Lutei, aut Pallidi.

Fungus ex uno pede multiplex, ruficaprini, seu lutei-pallescentis coloris, pediculo semiorbiculato, viscido, pediculo cylindrico. — Familiola buona de.

2. Fungus ex uno pede multiplex, totus luteus, pediculo radicem versus sensim & nonnihil attenuato. — In nemoribus, sed rarus.

3. Fungus perniciosus, intense aureus, ex uno pede multiplex, ad oleam nascent, pediculo radicem versus sensim & leviter attenuato. —

Fungo olivo dorato, malefico. — ff. Sylvas ad sepes & in agris. V. & A.

Albi & lutei.

Fungus esculentus, odoratus, ab una radice multiplex, totus albus, centro duntaxat pileoli lutei. — Autumno ad Populorum emortuorum pedamenta.

2. Fungus ex uno pede multiplex, pileolo cucullato, citrini coloris, ac limacino glutine infecto, lamellis & cylindricis, ac fistuloso pediculo albis. — Familiola di Lumaichini limonati, bianchi. — Octobri Circa Palearia.

Albi & Grisei.

Fungus ex uno pede multiplex, pileolo extensorii forma, griseo, lamellis albis, pediculo proalto, cylindrico, pariter albo. — Pisciacane speguitojo. Super frum. Equinum.

2. Fungus ex uno pede multiplex, pileolo leviter fastigiato, griseo, lamellis albis, pediculo & nonnihil rugoso, subtus concolore, pediculo albo, ~~proalto~~ cylindrico, fistuloso. — Super frum. Equinum.

3. Fungus parvus, ex uno pede multiplex, pileolo fornicato, tenui substantia, ac desuper albo, inferne griseo, pediculo cylindrico, fistuloso, superne pileoli parti concolore. — In nemoribus.

Albi & Purpurei.

Fungus ex uno pede multiplex, totus albus, purpureis, ac radiatis maculis, veluti acupunctis notato, pileolo parvo, excinetorii forma, pediculo longo, radicem versus sensim crassescente. — Famiglia di Spegueto; buona, brizzolata.

Albi & Obscuri, fusci, vel nigri.

Fungus cespitosus, esculentus, parvus, pileolo pulvinato, superne obscuro, inferne cum cylindrico pediculo albo. — Olanarino buono. — Ad ultim. radices.

2. Fungus parvus, obesus, ex uno pede multiplex, superne fusco-nigricans, inferne cumbrexi, ac ventricoso pediculo albus. — Carbonajo ab atro colore, tamquam carbonum. — Autumno in Arvis Carbonariis crescit.

3. Fungus ex uno pede multiplex, tenerimus, pileolo in longum & acutum conum attenuato, fusco, lamellis concoloribus, pediculo altiori, cylindrico, albo, punctis sulphureis notato. — Famiglia di Piscicani cattivi detti altrimenti Guglie. — In Strescore canino.

4. Fungus parvus, ex uno pede multiplex, pileolo pulvinato, obscuro, lamellis albis, pediculo brevissimo, laterali pileoli parti ferme affixo, & pariter albo. — In agris & aggerosis. — Majo.

Leucophaei & Spadiceo-rufi.

Fungus esculentus, ex uno pede multiplex, pileolo desuper spadiceo-rufo, in medio nonnihil umbilicato, & viloso, inferne lamellis multifidis, Leucophaei, pediculo nonnihil tumido, & superne pileoli parti conicolore.

Grisei & Obscuri, vel Fusci, aut Pulli.

Fungus parvus, ex uno pede multiplex & griseo subfuscus, pileolo hemisphaerico, pediculo cylindrico, spirae modo intorto, ac punctis nigris notato. — Per herbosa ambulacra.

2. Fungus ex uno pede multiplex, obscurus, & ad purpureo-ferrugineum tendens, pileolo pulvinato, subus lamellis griseis, pediculo cylindrico, angustissime perforato, & superne pileoli parti conicolore. — Octobri in fimi Equini tumulis.

Cinerei & Rufi.

Fungus ex uno pede multiplex, Alpinus, esculentus, pileolo desuper cinereo-griseo, inferne lamellis copiosissimis, eleganter rufis, pediculo dilute conicolore. — Orcella Cast. Dur. 191.

#. 193.

Rufi, & ex rufo-ferruginei.

Fungus parvus, pileolo amplo, superne eleganter rufo, inferne primum albo, deinde conicolore, pediculo ex rufo ferrugineo, inferiora versus sensim attenuato. — Ad Sepes. Majo.

Fulvi & Ferruginei.

Fungus parvus, ex uno pede multiplex, pileolo leviter fastigiato, fulvo, lamellis ferrugineis, pediculo cylindrico, ferre fistuloso, & superna pileoli parti conicolore. — In agris stercoretis. Majo.

Obscuro-fusci, & nigricantes.

Fungus caespitosus, parvus, gracillimus, pileolo campanulato, ex obscuro-fusco, lamellis nigricantibus, pediculo praetenui, vix lineam crasso, & superna pileoli parti conicolore. — In feni Equini Aggestis. V. Oct.

Lutei & carnei.

Fungus ex uno pede multiplex, pileolo conico, infra, & supra roseo, t. 78. vel carneo, pediculo cylindrico, fistuloso, luteo. — In resectis tabescentibus f. 3. Coniis oritur. Veris tempore.

Lutei, crocei, aurei, & prasini.

Fungus ex uno pede multiplex, pileoli vertice croceo, vel aureo, reliqua parte dilute conicolore, inferne lamellis prasinis, pediculo cylindrico, fistuloso, luteo. — In sylvis. Vere & autumno. ad Sepes &c.

Lutei & subnigri.

Fungus ex uno pede multiplex, pileolo extensorii forma, per vetustatem in plures partes, tamquam elastica vi se dividente, & subnigro, inferne luteo, pediculo fistuloso, cylindrico, superna pileoli parti conicolore. In pratis ad umbras, & in hortorum, & ambularis. — Octobri.

Aurei & Lutei.

Fungus ex uno pede multiplex, pileolo aureo, & dorsum reflexo, lamellis, & cylindrico pediculis luteis. — Ad quercus. Autumno.

Aurei, & ex albo-rufescentes.

Fungus ex uno pede multiplex, pileolo inequali, clipeato, desuper ex aureo-rufescente, in medio vero saturationis coloris, inferne lamellis rufis, pediculo cylindrico, fistuloso, conicolore, sericea, ac per brevi lanugine infecto.

pag. 194.

2. Fungus ex uno pede multiplex, pileolo utraque parte eleganter rufo, lamellis sinuatis, pediculo exaureo-ferugineo, cylindrico, & fistuloso.

Aurei, aut lutei & fulvi.

Fungus luteus, ex uno pede multiplex, pileolo usque ad centrum in plures partes plerumque se dividente, ac desuper per maculis fulvis ob lacerationem cutis veluti asperso. — Octobri ad Quercus.

2. Fungus minimus, ex uno pede multiplex, pileolo conico, aureo, lamellis, & pediculo fulvis. In Equ. sim. globulis.

Tricolores, albi, spadicei, & ex obscuro-fusci.

Fungus esulentus, odoratus, ex uno pede multiplex, superna pileoli parte spadicea, inferna alba, pediculo longo, & ex obscuro-fusco.

Albi, griseo-rufi, & ex livido - Subpurpurei.

Fungus parvus, ex uno pede multiplex, pileolo leviter fastigiato, desuper & griseo-rufo, inferne lamellis albis ex livido - purpureis, pediculo fistuloso, albo. — Vere ad Populos in arenosis plerumque provenit.

Albi, grisei, & obscuri.

Fungus ex uno pede multiplex, pileolo obscuro, concavo, cum oris subtus repandis, lamellis griseis, pediculo albo, radicem versus attenuato. Autumno.

2. Fungus cespitosus, duriusculus, esulentus, parvus, pileolo superna parte obscuro, inferne griseo, pediculo albo. — Fot. Soderino. - Piazzajolo.

Albi, rufo-grisei, & aurei.

Fungus parvus, ex uno pede multiplex, pileolo desuper ex rufo-griseo, subtus lamellis albis, pediculo cylindrico, aureo, fistuloso. Autumno.

Albi, obscuri-fusci, & nigri.

Fungus Cespitosus, pileolo ampliori, extinetorii forma, ex obscuro fusco, lamellis nigricantibus, pediculo albo, fistuloso. — In Sylvis ad Quercus. A.

Rufi, obscuri, & purpurei.

Fungus parvus, ex uno pede multiplex, pileolo extinetorii forma, rufo, maculis obscuris in vertice notato, lamellis, & pediculo purpureis. — In Dumetis ad Arbores - Autumno.

IV. Omnia aut supra, sed pileolo a vertice usque ad eas striato.

Unicolores grisei, aut cinerei.

1. Fungus parvus, totus griseus, ex uno pede multiplex, pileolo galericulato, ubi vis striato, pediculo tenui, fistuloso. T. 79. f. 5.

2. Fungus parvus, cinereus, ex uno pede multiplex, pileolo galericulato, ubi vis striato, pediculo tenui, fistuloso longo, capillaceo, fistuloso. — Autumno ad arbores, & super ligni putridi fragmenta.

Obscuri, vel subfusci.

Agar. sulphureus
Scopoli

1. Fungus parvus, cespitosus, obscurus, pileolo galericulato, ubi vis striato, pediculo crassiore. — Tempore & locis consimilibus, ut superior.

Idem.

2. Fungus parvus, ex uno pede multiplex, subfuscus, pileolo galericulato, ubi vis striato, pediculo tenui, fistuloso. — Majo ad detruentata, & semiputridas arbores.

Albi & cinerei.

Ag. rotula

1. Fungus fimetarius, parvus, cespitosus, fugax, pileolo fornicato, utraque parte cinereo, desuper striato, ac in medio pileolo umbilicato, subus lamellis naris, ad tubum quemdam cecantibus, ei denique junctis, cui inseritur pediculus albus, & fistulosus. — Super vacuam, & ovum finum. rago. T. 79. f. 7.

Albi & nigri.

1. Fungus cespitosus, parvus, pileolo fornicato, utraque parte albo, desuper striato, ac in medio pileolo umbilicato, subus lamellis naris, tubo cuidam firmis, cui inseritur pediculus capillaceus, nigricans. — Autumno ad illinos &c. T. 74. f. 8.

Tricolores, albi, murini, & obscuri.

1. Fungus loboliferus, fugax, pileolo galericulato, obscurus, vertice levi, reliqua parte subtilissime striato, lamellis murinis, pediculo albo, fistuloso. — Primovere in pseudum fimo.

Ag. lignorum
Scopoli

2. Fungus parvus, ex uno pede multiplex, pileolo griseo, & ubi vis striato, inferne nigricante, pediculo albo, fistuloso. — Ad arborum radices V. & Aug.

Albi, rufi, & nigricantes.

Ag. truncorum
Scop.

1. Fungus ex uno pede multiplex, pileolo galericulato, rufo-fulvo, vertice levi, reliqua parte striato, subus lamellis nigricantibus, pediculo albo, fistuloso. Ad arbor. & lign. Emort. pedes, tum in sylvis, tum in agris, & hortis passim. Autumno

2. Fungus sterquilinus, fugax, ex uno pede multiplex, pileolo fastigiato, rufescente, striato, lamellis primis obscuris, postea nigricantibus, pediculo altiori, albo, fistuloso. — Majo in hort. sup. ovium finium.

3. Fungus parvus, ex uno pede multiplex, pediculo foenicato, rufo, centro umbilicato, & laevi, reliqua parte striata, subtus lamellis albicantibus, pediculo fistuloso, nigricante. — In fimo Equini aggregatis cum reliquis congenerebus crescit.

IV. Pileolo a vertice ad medium laevi, reliqua parte, vel undique, vel juxta peripheriam striato.

Unicolores Grisei.

Fungus alpinus, Cespitosus, pileolo conico, griseo, a medio ad peripheriam striato, lamellis torosis, remissi coloris, pediculo fistuloso, pariter griseo. — Ad putrida Ligna. Autumno.

Bicolores albi, & lutei.

Fungus parvus, ex uno pede multiplex, pileolo utraque parte albo, ac de super circum oras striato, pediculo luteo, fistuloso.

Dilute purpurei.

Fungus Cespitosus, dilute purpureus, pileolo galericulato, a medio ad verticem crispo, reliqua parte striato, pediculo tenuiori, & altiori, fistuloso.

Albi & grisei.

Fungus fasciculosus, pileolo ampliori, cucullato, a medio ad verticem laevi, & griseo, reliqua parte striato, & albicante, lamellis, & altiore, ac fistuloso pediculo albis. — In disruptis Salicis fragilis caudicibus. Autumno.

Grisei & obscuri.

Fungus parvus, ex uno pede multiplex, pileolo leviter fastigiato, obscuro, livido, ad oras striato, lamellis & pediculo griseis. T. 78. f. 9.

Albi, Griseo-fusci, & livido-purpurascetes.

Fungus Cespitosus, pileolo extinetorii forma, & griseo-fusco, & a medio ad peripheriam striato, inferne lamellis ex livido-purpurascetibus, pediculo albo, fistuloso. — Ad vitium Pedamenta. Autumno.

Albi, lutei, & obscuri.

p. 197. Ag. galericularis Scop. Fungus fasciculosus, pileolo obscuro, extinetorii forma, a medio ad peripheriam striato, lamellis albis, pediculo altiori, luteo, fistuloso. — In fimo Equino. &c.

III. *Pediculo anulo non permanenti cincto*. IV. *Pileolo desuper non striato*.

Unicolores Ruffi.

Fungus atro-rufescens, ex uno pede multiplex, esculentus, pileolo parvo, pediculo crassiore, cylindrico, anulo perangusto cincto.

2. *Fungus parvus, ex uno pede multiplex, ex rufo-aureus, postea ad fulvum colorem tendens, pediculo anulato, fistuloso, radice bulbosa.* Tab. 80, f. 6.

Lutei, vel Aurei.

Fungus esculentus, totus luteus, ex uno pede multiplex, pediculo longo, cylindrico, anulato. — Fungicicla buona, gialla. — Ad quercus &c. Autumno.

2. *Fungus esculentus, luteus, nanus, ex uno pede multiplex, pediculo tumido, anulo perangusto cincto. Autumno.*

3. *Fungus esculentus, ex uno pede multiplex, aureus, pediculo longo, cylindrico, anulo perangusto cincto, radice bulbosa.*

Albi & Grisei.

Fungus esculentus, ex uno pede multiplex, pileolo desuper griseo, & veluti in squamas lacerato, lamellis albis, pediculo cylindrico, conicolore, anulo perangusto cincto.

Albi & Fulvi.

Fungus minimus, ex uno pede multiplex, pileolo, & pediculo fulvis, lamellis albis.

Tricolores albi, Mellini, & Subobscuri.

Fungus parvus, ex uno pede multiplex, pileolo fornicato, desuper mellino, subtus albo, pediculo cylindrico, anulato plenique subobscuro. — In Sylvis ad Arbor. radices. Autumno.

p. 198.

Albi, Flavo-subobscuri, & Anei coloris.

Fungus esculentus, ex uno pede multiplex, pileolo desuper e flavo-subobscuro, inferne albo, pediculo longo, cylindrico, anulato, & aeneo colore tincto.

Albi, grisei, & Purpurei.

Fungus esculentus, ex uno pede multiplex, griseus, inferne sordide, & dilute purpureus, pediculo albo, cylindrico, & anulato. — Famiglia di Pontajoli.

Albi, rufi, & Fulvi.

Fungus ex uno pede multiplex, pileolo desuper rufo, & protuberante centro, inferne fulvo, pediculo albo, anulato, & circa medium tumido, ad radicem vero in rostrum veluti incurvato, atque attenuato.

Albi, rufo-fulvi, & obscuri.

Fungus ex uno pede multiplex, pileolo desuper ex rufo-fulvo, subrus albo, pediculo alio, cylindrico, anulato, subobscuro. — Ad Roborum radices. Familia buona, bianca, & Leonata.

Quadricolores albi, cervini, Fulvi, & obscuri.

Fungus esulentus, populeus, ex uno pede multiplex, pileolo corrugato, vel potius Lichenis Pulmonariae arboreae instar lacunulis excavato, colore primum obscuro, postea fulvo, & tandem in subalbium faescente, inferne lamellis lineam latis, cervini coloris, pediculo albo, ample anulato. — Ad populos & Quercus campestris V. & A. cit. — Poppini. — alberini.

2. Fungus esulentus, populeus, ex uno pede multiplex, pileolo corrugato, vel potius Lichenis Pulmonariae arboreae instar lacunulis excavato, colore primum obscuro, postea fulvo, & tandem in subalbium faescente, inferne lamellis cervinis, semiuinciam latis, pediculo albo, anulo perangusto cincto. — Cum Super. crescit.

IV. Pileolo a vertice ad oras striato.

Fungus lespitosus, parvus, pileolo galeculato, & striato vertice fusco, Tab. 81. reliqua parte spadiceo, subrus lamellis albis, pediculo brevi, cylindraceo, & ad radicem versus anulato. — In aggerosis locis, nec non in fimo Equino. V.

p. 199. IV. Pileolo ad oras tantum striato.

Albi, Spadicei, & Purpurei.

Agarius
purpureus Scop.

Fungus esulentus, ex uno pede multiplex, pileolo desuper ex spadiceo — Tab. 81. glabrescente, ad oras nonnihil undulato, subrus albo, pediculo subobscuro, f. 2. inferiora versus crispescente, & veluti bulboso. — In Sepibus.

III. Pediculo anulo fugaci, seu non permanenti cincto. IV. Pediculo desuper non striato.

Unicolores aurei, lutei, vel Pallidi.

Fungus obesus, aureus, ex una radice multiplex, pileolo fornicato, centro umbilicato. — ad arb. radices.

2. Fungus ex una radice multiplex, totus aureus, pileolo nonnihil fastigiato, pediculo cylindrico, in superficie lacero, & veluti filamentoso. — Ad Arbores.

A. Olivaceus ^{p. 199.} 3. Fungus parvus, ex uno pede multiplex, pileolo in medio saturate croceo, ad Tab. 80. latera vero dilute, subtus lamellis sulphureis, pediculo cylindrico, fistuloso, concolore. Autumno. ^{Gmelin. p. 1417.}

Bicolores albi, & obscuri.

Fungus ex uno pede multiplex, pileolo fornicato, subobscuro, subtus lamellis albis, pediculo longo, superna pileoli parti concolore, & inferiora versus crescente. Semenzini. Edul.

Albi & rufi.

Fungus ex uno pede multiplex, pileolo conico, rufescente, inferne concolore, sed ad griseum tendente, pediculo albo, cylindrico, fistuloso. — P. Prata.

Tricolores albi, grisei, & rufi.

Fungus ex uno pede multiplex, pileolo leviter fastigiato, rugoso, rufescente, & subhirsuto, inferne lamellis griseis, pediculo albo, fistuloso, radicem versus non-nihil crescente.

3. Fungus ex uno pede multiplex, pileolo subrufo, lamellis griseis, pediculo cylindrico, albo. —

2. Fungus ex uno pede multiplex, pileolo pulvinato, desuper rufescente, inferne griseo, pediculo albo, cylindrico, fistuloso. — In Sylvis.

(pag. 200.)

Albi, Pallidi, & rufescentes.

Fungus ex uno pede multiplex, pileolo desuper pallido, subtus lamellis albis, pediculo cylindrico, atro-rufescente, ac pulvisculo superna pileoli parti concolore asperso. Octobri.

Albi, Flavescents & fusci.

Fungus Alpinus, bulbosus, ex uno pede multiplex, pileolo superna parte obscuro, & stuposo, inferne albo, pediculo flavescente. Octobri.

Albi, Glauco-Argentei, & nigri.

Fungus in arenosis nasens, ex uno pede multiplex, pileolo cucullato, & glauco argenteo, splendente, inferne lamellis amplioribus, nigris, pediculo fistuloso, candido, radice rostrata. — Fungus multiplex, oratus, cinereus. Bot. Paris. 73. n. 16. Tab. XII. f. 10 & 11. — Autumno in Populeis.

Fungoidaster.

Fungoidastri semine in superna parte donati.

Fungoidaster parvus, ex squadicea rufescens, capitulo villosa, sphaerico, Tab. 82.
pede fornicato, fungis semiputridis innascens, semine scellato. fig. 1.
Super fungis piperatis, albis, lacteo succo turgentibus.

p. 201. 2. Fungoidaster parvus, gelatinosus, lubricus, pileolo subviridi, oris Tab. 82.
subtus repandis, pediculo aureo, fistuloso. — Fungus gelatinus, flavus. f. 2.
Bot. Paris. 58. Tab. XII. n. 7. 8. & 9. — Funghevello di gelatina di color
verde gajo, e dorato. — Autunno fr. sprata, & herbosa ambulacra.

3. Fungoidaster minimus discoides, albus, semine ovato donatus, foli- T. 82.
is, vel lignis semiputridis innascens. f. 3.

4. Fungoidaster minimus, incarnati coloris, acaulis ferme, Ana- T. 82.
gijridis non foetida, & semimortua innascens. — Funghevello incarnati di f. 4.
legni mortui.

Fungoidastri semine in inferna parte donati.

Peziza cornuop. Fungoidaster caespitosus, superne fuscus, inferne cinereus. — In sylvis. T. 82.
Pez. Cornuopoid. 5. Fungoidaster, qui fungoides nigricans, majus, cornuopid forma. Bot. f. 5.
Par. 57. Tab. XIII. f. 2. 3.

7. Fungoidaster qui fungoides tuba acustica forma, fuscus, externe T. 82.
cinereus. D. Breijni. f. 6.

8. Fungoidaster Alpinus, infundibuli forma, cinereus. — Trombetta Tab. 82.
di morto cenerina Alpestra. f. 7.

9. Fungoidaster infundibuli forma, ex obscuro fulvus. — Trombetta
di morto di color leonato. — Autunno.

10. Fungoidaster minimus, infundibuli forma, pullus.

Tab. 82.
f. 8.

Phallus.

Phalli pileolo cellulato, ac umbilicato pervio summa parte instructo,
Donati.

Ph. Impudicus: Phallus vulgaris, totus albus, volva rotunda, pileolo cellulato, ac sum- T. 83.
ma parte umbilico pervio, ornato.

p. 202. 2. Phallus albus, volva ovata, externe purpurascens, pileolo cellulato, ac
summa parte umbilico pervio, ornato. — Lumacone bianco di guscio, e invoglia
rossa, e ovata.

p. 202.

3. *Phallus albus*, parvus, pileolo cellulato, ac summa parte umbilico pervio, & peramplo ornato. — Autumno in sylvis.

Phalli pileolo cellulato, umbilico pervio destituto, ornati.

Phallus Alpinus, volva subrotunda, alba, pileolo cellulato, umbilico pervio carente, pediculo dilate fulvescente. — D. Gron. Abb. Tozzi.

1. *Phallus*, qui fungus *Phalloides Virginianus*, glande tessellato. D. Banist. Raii Hist. Tom. 3. 25.

2. *Phallus* qui fungus *Phalloides*, parvus, seu penis caninus, Virginianus. D. Banist. Ejusd. ibid.

3. *Phallus*, qui fungus *Phalloides Gallicus*, pileo rugoso (absque umbilico) Ejusd. ibid. & Sterb. Theatr. fung. p. 280. n. 141. Tab. 30. H. F. Fung. qui *Phalloides* genus J. B. 3. 845. XXIII. genus perniciosorum fungorum. Species Clusii. Hist. CCLXXXI.

4. *Phallus Hadriani junii* (capitulo non cellulato, sed umbilico pervio donato) Clus. Hist. CCXCV. Lob. icon. part. 2. 278. — Fungus — marinus. Dod. pempt. 483.

5. *Phallus*, qui fungus *Phalloides Major*, Germanicus, pileolo cor-rugato. Sterb. fung. 281. n. 114. 3. Tab. 30. K. L. M.

Phallus, aut potius *Ichthyphallus*, apud Græcos *Phallós*, membrum virile sonat, & *ὀφθαλμός* membrum virile erectum, nudata glande nam hac planta hominis pudenda representat.

Phallo-Boletus.

1. *Phallo-boletus esculentus*, pileolo conico, ampliore, subobsuro, pediculo Leucophæo, fistuloso. — Verno tempore nascitur in arenosis locis &c. Tab. 84. f. 1.

p. 203 2. *Phallo-boletus esculentus*, pileolo ampliore, rufescente, & crispo, pediculo Leucophæo, fistuloso, foris reticulatis insignito — ad Rudera. Tab. 84. f. 2.

3. *Phallo-boletus esculentus*, pileolo parvo, conico, ex fulvo-subobsuro, pediculo Leucophæo, fistuloso. — Primovere. Tab. 84. f. 3.

Boletus.

Boletus Boletus dicitur a voce Graeca Βολη, id est gleba, ob figuram inaequalem, & superficiem perforatam, ut in glebis observatur.

- phallus
Esculentus
1. Boletus esculentus, rugosus, ~~angustior~~, & orbicularis.
Primovire in arenosis agris &c. Tab. 85.
f. 1.
 2. Boletus esculentus, rugosus, albicans, quasi fuligine infectus -
Primovire. Tab. 85.
f. 2.
 3. Boletus esculentus, rugosus, fulvus. -
 4. Boletus esculentus, in metam fastigiatus.
 5. Boletus esculentus, compressus, deinde foraminulatus, & per longitu-
dinem costatus, & cinereo-virescens, pediculo crassiore, albo. - p. agros. Tab. 85.
f. 3.

pag. 204.

Fungoides.

Fungoidea Fungiformia.

- Helvella mitra
1. Fungoides magnum, tricuspidatum, oris retro reflexis, obsolete luteum,
pediculo fistuloso. - Sub Fagis - Autumno.
 2. Fungoides, quod Boletus Autumnalis, lutescent. D. Breijni.
 3. Fungoides fungiforme, crispum, laciniatum, & varie complicatum,
pediculo crasso, striato, rimoso, ac fistuloso. - In nemoribus post diu. plur. Tab. 86.
f. 7.
 4. Fungoides fungiforme, crispum, & laciniatum, ~~superne nigrum, in-~~
~~ferne sub ex obscurum fuscum~~, pediculo ~~striato~~, rimoso, ac fistuloso tenuiori.
In nemoribus humidioribus.
 5. Fungoides fungiforme, crispum & laciniatum, Superne nigrum,
inferne albidum, pediculo fistuloso, crassiore albo. - Fungo Canino, o fungo
Monacella fetido. - April.
 6. Fungoides fungiforme, crispum, laciniatum, & varie complicatum, su-
perne sub obscurum, inferne simul cum fistuloso pediculo alburn. - Cum super. Tab. 86.
f. 8.
 7. Fungoides fungiforme pullum, crispum, & varie complicatum, super-
~~ne sub obscurum, inferne cum fistuloso pediculo~~ pediculo tenuiori, non fis-
tuloso. - Autumno in pratis. Tab. 86.
f. 9.
 8. Fungoides fungiforme, crispum, & varie complicatum, Superne sativae gri-
seum, & ad subobscurum vergens, inferne cum pediculo non fistuloso alburn.
- phallus Monacella

p. 204.

9. *Fungoides fungiforme*, galericulatum, superne & fulvo subfuscum, inferne
griseum, pediculo longiore, rugoso, albo, tubulato, intestinorum forma. — April.

p. 205. 101

Fungoidea cava, aut plana, pediculo donata.

Fungoides picipitatum, coriaceum, maximum, sordide virescens, pediculo donatum.
Cistolone. Autumno.

2. *Fungoides infundibuliforma* griseum, externe costis, seu venis ramosis,
& invicem implexis minutum. — Maio.

3. *Fungoides fuscum*, acetabuli forma, griseum externe ramificatum, sive
Fungoides maximum picipitatum. Bot. Paris. n. 4. Tab. XIII. f. 1.

4. *Fungoides cespitosum*, infundibuliforma, fulvum, pediculo donatum.
Imbutini di bosco, colore di foglia morta. — Octobr.

5. *Fungoides cespitosum*, infundibuliforma, fulvum, radice nigra, *capitata* T. 86.
tuberosa, perenni. — April. Indis. l. f. 10.

6. *Fungoides picipitatum*, intus corineum, externe albidum, pediculo pro- T. 86.
sus albo. — Pispide Scarlatina. — Autumno. f. 8.

per. ligans

7. *Fungoides hippocrateis* forma, pediculo donatum, superne fulvum, infer- T. 86.
ne album. — Fungo sottocoppa. f. 6.

8. *Fungoides globosum*, striatum, griseum, pediculo longo, albo, fistuloso. T. 86.
April. f. 3.

9. *Fungoides parvum*, picipitatum, externe ex obscuro-griseum, interne ni- T. 86.
grum, & pellucidum. f. 11.

10. *Fungoides griseum*, infundibuliforma, pendulum, pediculo donatum. T. 86.
f. 13.

11. *Fungoides minimum*, cernuum, corineum totum, pediculo donatum T. 86.
Brumali tempore super emortua ligna. f. 12.

12. *Fungoides minimum*, picipitatum, album, externe hirsutum, pediculo — T. 86.
donatum. — Maio. f. 13.

13. *Fungoides minimum*, picipitatum, obscurum, externe hirsutum,
pediculo donatum (fuscus). — Januario.

14. *Fungoides minimum* infundibuliforma, candidum, pediculo incurvo
donatum. — Januario & Sylvas.

Pezizalicyathoidea 15. *Fungoides minimum*, infundibuliforma, albicans (Totum vivum p. 15.
Bulliard. pite brevi), pediculo donatum hederæ foliis semiputridis innascens. Tab. 86.
f. 14.

Fungoidea Scutellata, sive olivacea:

1. Fungoides Scutellatum, majus, cere flavæ colore.
 2. Fungus tenuis, cere flavæ similis, ventricosus, mortarium referens, Romanus.
 Boec. Mus. part. 1. 300. Lycopod. Mortarii forma J. R. H. 561.
 Scodellacia, o berrettacia di conio. — In fimi Equini tumulis, necnon
 in agris eodem fimo impingatis. — Romanale tempore.
 3. Idem album. Cum supradicto, sed raro.
 4. Fungoides angulatum, acetabuli forma. J. R. H. 560. — Vere.
 5. Fungoides crispum, & undosum, acetabuli forma, intus & foris obscu-
 rum. Octobri & prota.
 6. Fungoides Scutellatum, asperum, sordide album.
 7. Fungoides Scutellatum, asperum, & veluti auleatum, fulvum. In
 fictibus recens Stercoratis interdum reperitur.
 8. Fungoides Scutellatum album, & glabrum. — In Syl. & Lincet. octo.
 9. Fungoides Scutellatum, interne album, externe obscurum, & sub hirsu-
 tum — Autumno in umbrosis et humeris Sylvis inter putrida folia. T. 86.
 f. 4.
 10. Fungoides Scutellatum, album, foris hirsutum. — Loco & temp. usq.
 11. Fungoides Scutellatum, pullum, foris hirsutum, intus glabrum.
 12. Fungoides Scutellatum, coccineum, intus glabrum, foris ubi vis pilosum. T. 86.
 f. 17.
 13. Fungoides Scutellatum, coccineum, oris pilosis, acetabuli forma. — Autumno.
 14. Fungoides Scutellatum, acetabuli forma. — Inst. R. H. 561. — Fungus
 membranaceus, seu coriaceus, acetabuli modo concavus, colore intus coccineo, seu se-
 -misino saturo J. Dale Ray. Synops. Ed. 2. 19. n. 39. & Ed. 3. 18. n. 5.
 Vere & autumno. Lignis adnatum.
 15. Fungoides obscurum, Scutellatum, crassioris substantiæ, externe sub-
 -asperum. — Majo post pluvias.
 16. Fungoides Scutellatum, minimum, atro-purpureum, & ad pullum
 vergens.
 17. Fungoides Scutellatum, pullum, interne lucidum, & quasi vernigi-
 -ne infectum.
 18. Fungoides Scutellatum, semisphaerium, sordide coccineum, externe
 villis obscuris obsitum. — Vere & ambulaera.

Per. Labellum
 Bull.

Periza Scutellata
 Bulliard.

Helv. Ciliaris. Gm.

Helvella Campu-
 -nularia Scopoli

18. *Fungoides parvum, nigrum, interne laeve, externe rugosum, & striatum.* T. 86. f. 18.

19. *Fungoides scutella nonnimis caeca forma, candidum, membranaceum, musco innascens - In montosis, & muscosis locis, ut plurimum.*

20. *Fungoides minimum, scutellatum, nigrum, in caudicibus arborum post pluvias toto anno oritur.*

21. *Fungoides scutellatum, minimum, membranaceum, candidum, arborum caudicibus innascens.*

22. *Fungoides coccineum, lentiforme, oris pilosis - Ad foveas & agg. loc.* T. 86. f. 19.

23. *Fungoides minimum, scutellatum, atro-purpureum, intus splendens.*

24. *Fungoides minimum, scutellatum, vernum, aureum, externe polline concolori aspersum. - P. vere.*

*Helvella lutea
Scopoli.*

25. *Fungoides scutellatum, patulum, minimum, aureum, externe sub-hirsutum. (cylathus parvus, lentis magnitudine, flavus, margine villosus), per foveas aquis iam plane carentes.*

26. *Fungoides minimum, lentiforme, vix cavum, fusco-rubrum, externe hirsutum, & obscurum.*

27. *Fungoides coccineum, minimum, oris non pilosis - Inter muscos.*

28. *Fungoides aureum, omnium minimum, turbinatum, & vix cavum, foliis euphrasi semiputridis innascens.* T. 86. f. 20.

29. *Fungoides spadiceum, membranaceum, omnium minimum. In silvis in arborum detuncatarum celsuris.*

Fungoidea Turbinata, aut pyri inversi, vel vasis fusorii forma.

Fungoides pyri inversi forma, ore laevo, & veluti coronato, ex albo-griseum. T. 86. f. 2.

2. *Fungoides pyri inversi forma, caespitosum, ex fulvo-fuscum. - Circa Palearia, & in triticea gluma.*

3. *Fungoides pyri inversi forma, intus coccineum, ore veluti marginato, extra corallinum, & glabrum. - Secus aqueductum - januario.*

4. *Fungoides coccineum, cupulam glandium referens, Sup. Tabefacta Ligna.*

5. *Fungoides pyri inversi forma, intus griseum, exterius subobscurum.*

6. *Fungoides infundibuli forma, exterius album, intus coccineum. In pms.*

Per. acetabulum. 7. *Fungoides maximum, vasis fusorii forma, subalbidum. - - - - -* T. 86. f. 1.

8. *Fungoides parvum vasis fusorii forma, perangustum, & quasi tubulatum, albidum.*

29. *Fungoides minimum*, vasi fusorii forma, niveum, externe hirsutum, Tab. 86. f. 18.
pendulum.

Clavaria

Clavaria non Cespitosa.

Cl. Pistillaris.

1. *Clavaria major, lutea*. — *Mazza d'Ercole gialla*. — Tab. 87. f. 1.
2. *Clavaria major alba*. — *Fungus clavatus, albidus, pistillaris, Kiecoparia*
~~clav. effigie~~ species crepitus lupi. *Bocc. mus. part. 1. Tab. 307. — cum sup.*
3. *Clavaria major atro-rufescens, crispa*. — *Idissem fere locis &c.* T. 87. f. 2.
4. *Clavaria major, ex rufo sordide aurea, vertice plano, & nonnihil cavo*. T. 87. f. 3.
5. *Clavaria media, albo-lutea*. In sylvestris locis.
6. *Clavaria Ophioglossoides nigra* — *herbida & umbrosa ambulacra*. T. 87. f. 4.
7. *Clavaria, quæ fungus Ophioglossoides viridis, serpentiformis. D. Brejini.*
8. *Clavaria minima nigra, clavi effigie, pediculo subhirsuto*. — T. 87. f. 8.
9. *Clavaria lutea, minima*. — T. 87. f. 9.
10. *Clavaria alba, pistillari forma*. *Bot. par. 39. n. 2. Tab. VII. f. 8.*
11. *Clavaria rufescens, truncialis, tenuissima*. — *Post diut. plu. Autumn.* T. 87. f. 7.
12. *Clavaria minima, nivea*. — In sylvestris vere & autumno. — T. 87. f. 6.
13. *Clavaria omnium minima, sordide alba*. — In fictilibus hortorum T. 87. f. 9.
terra stercoreata repletis, ut plurimum.

p. 209.

Clavaria Cespitosa.

1. *Clav. Cespitosa, major, candida*. — Autumnus. — Tab. 87. f. 10.
2. *Clavaria cespitosa, media, lutea* — *Primali & autumn. Temp. p. nem.* T. 87. f. 12.
3. *Clavaria vermiculata, non fistulosa, candida*. In aggeribus. — T. 87. f. 12.
4. *Clavaria Vermiculata, fistulosa, candida*. — *Cannelli de Prati*. — T. 87. f. 13.

Cl. Vermiculata
Scopoli -

Coralloides

- Coralloides flavum*. J. R. H. 162. Y. & aur. in Ericetis &c.
2. *Coralloides albidum*. Ibid.
 3. *Coralloides dilute purpurascens*. Ibid. Cum superioribus, sed raro.
 4. *Coralloides dilute rufescens*. Cum antecedit, sed non ita obvium.
 5. *Coralloides album*, corniculis dilute purpureis. Octobri in Sylvis.
 6. *Coralloides igneum*, vel corallini coloris, corniculis brevioribus. T. 88. f. 2.
In Ericetis & Sylvis caeduis.
 7. *Coralloides dilute luteum*, corniculis expansis, brevioribus, & ramosis, in summitate bifidis. T. 88. f. 4.
 8. *Coralloides luteum* Barrel. icon. 1260. - Cum antecedit, & sequens.
 9. *Coralloides rufescens*, corniculis brevioribus. Octobri.
 10. *Coralloides corniculatum*, griseum, parvum. Octob. & Sylvas.
 11. *Coralloides album*, ramulis bifurcatis tenuioribus, longis (Warr. i. 1280)
 12. *Coralloides ramosum*, ex rufocarneo, platyceron, seu latis corniculis, apicibus brevioribus. - Cum superioribus. Tab. 88. f. 3.
- pp. 210.
13. *Coralloides rufescens*, corniculis tenuioribus, bifidis. - - - T. 88. f. 1.
 14. *Coralloides parvum*, cristatum, rugosum, & verrucosum, album. T. 88. f. 6.
 15. *Coralloides parvum*, gelatinosum, caeruleum. - Semiputr. & Tabidis liq. adnascens.
 16. *Coralloides luteum*, parvum, juniperi caudicibus adnascens. - - - T. 88. f. 5.
 17. *Coralloides minimum*, capillare, dilute violaceum. Octobri.

Bijssus.

Bijssus est planta genus a precedenti distinctum, quod meris filamentis cylindricis aut ramosis, aut non ramosis, aut utriusque formae constat. Ex his filamentis prout diversas species prostraveris, quaedam longa, quaedam breviora, quaedam etiam brevissima reperies. Differt quoque a Conferva, quod eadem filamenta, neque recentia, neque exsiccata ullis externis nodis aspera appareant; a Borrifera vero, quod diuturnior sit, neque fugacis adeo naturae, & quod ejus specimina spicati, vel racemati disposita non appareant, sed secundum cauliculorum longitudinem locata. Quaedam ex his plantis coriacea, quaedam herbacea substantia donata donantur. Plures sericorum filamentorum congeriem, ut Conferva referunt, alia tapetum, aut villorum sericum, alia murinam, vel felinam pellem, alia ovium vellus, felinum alia, vel pannum, quaedam dumum araneorum telum eleganter simulant, quemadmodum in Iconibus tabularum patet. Semina, quae in quibusdam videre contigit, vel rotunda apparebant, vel oblonga.

p. 210.

1. *Bryssus maritima*, Confervoides, ramosa, viridis, sericum referens. — Tab. 89. f. 1.
2. *Bryssus palustris*, Confervoides, non ramosa, viridis, filamentis crassioribus, setas aprinas emulantes. — In aquosis foveis. Tab. 89. f. 6.
3. *Bryssus palustris*, Confervoides, non ramosa, viridis, sericum referens, filamentis longis, tenuissimis. — Tab. 89. f. 7.
- Bryss. aurea* L. 4. *Bryssus minima*, saxatilis, aurea, inodora, filamentis partim simplicibus, partim ramosis. — In rimis, & cavernulis super ingentia & Tartarea saxa &c. Tab. 89. f. 2.
- B. Foliohus* L. 5. *Bryssus germanica*, minima, saxatilis, aurea, *Viola Martia* odorem spirans. Tab. 89. f. 3.
6. *Bryssus minima*, cinerea, tenuissima, plerumque non ramosa, inodora, basi, seu carne crassiore, junioribus arboribus in parte, terra proxima, innascens, eamque convestiens. — Tab. 89. f. 4.
- B. Velutina* 7. *Bryssus terrestris*, viridis, herbaea, & molliissima, filamentis ramosis, & non ramosis. — Verno tempore in hortis ad umbras, nec non ad sepes, & circa fossas udas, & scillitidia. — Tab. 89. f. 5.
8. *Bryssus minima*, palustris, obscura, crassioribus filamentis, plerumque simplicibus. — per scillitidia, & scaturigines. — Tab. 89. f. 8.
9. *Bryssus major*, speluncis, & cellis vinariis innascens, latissima, primum alba, deinde aurea, postea fulva, filamentis crassioribus, & longioribus fissilibus. — In speluncis & ferri fodinae fornicibus, ubi etiam in fornicibus Cellarum vinariarum, quae claudunt nullo spiraculo gaudent, quandoque etiam in tubis, & canalibus ligneis, aquam ducentibus invenitur. — Tab. 90. f. 1.
10. *Bryssus latissima*, speluncis, & cellis vinariis innascens, felorum, vel pannum laneum simulans, primum alba, deinde nigra, filamentis tenuissimis non ramosis. — ubi antecedit. — Tab. 89. f. 9.
11. *Bryssus serica*, fulva, per elegans, tenuissima, & ramosissima, rimis terre innascens, & glebas circumvestiens. — In aggerosis locis. — Tab. 90. f. 4.
12. *Bryssus purpurea*, deliatisima, arborum corticibus adnascens, brevissimis, ac tenuissimis filamentis. — Autumnali, atque Hyemali tempore. — Tab. 90. f. 3.
13. *Bryssus subpurpurea*, Lichenis facie, lauri caudicibus constanter innascens, filamentis brevissimis invicem implexis, & colligatis. — ad lauros copiosissima. — Tab. 90. f. 2.
14. *Bryssus palustris*, subobscura, filamentis brevibus, non ramosis. — Tab. 89. f. 10.
15. *Bryssus aquatica*, tenuissima, atro-virens, pellem murinam referens, brevissimis, & simplicibus filamentis. — Hyemali tempore in aqua ductis. — Tab. 89. f. 11.
16. *Bryssus serica*, ex viridi-nigricans, filamentis brevibus, partim bifidis, partim integris. — per Viridaria & ad Quercus. — Tab. 90. f. 7.
17. *Bryssus sulphurea*, Lichenis facie, tenuissima, ac densissima, felorum & pannum laneum textura simulans. — Aestate, ad arbores, ubi ad Olives &c. — Tab. 90. f. 6.
18. *Bryssus Cespitosa*, nigra, filamentis ramosis, & non ramosis. — Ad arbores. — Tab. 90. f. 7.

p. 212. 19. *Bijssus minima* corulea, non ramosa, musco innascens — Ad saxa supra Tab. 90. f. 8.
 muscos squamosos. Primo vere.

20. *Bijssus minima*, sacatilis, nigra, ramosissima, viticulis nudis. Tab. 90. f. 5.
 In collibus ad Saxa. 6 Jan. & febr. mensibus oritur.

Bijssus vocatur, quia cum latius plerumque se diffundat, *bijssinam*,
 latamque telam representat.

Borjitis.

Borjitis est plantae genus, a *Bijssu* duntaxat discretum vix brevitate
 & seminum racematum, vel spicatum in Cauliculorum, vel ramorum summo,
 Constanti dispositione.

1. *Borjitis comata*, grisea, caule simplici, crassiore, seminibus rotundis. Tab. 91. f. 1.
Muffa griggia, arborea. — Ad marida, & semiputrida ligna, & Cortici culmos.
 Tempore Hyemali, non raro invenitur.

Mucor crustaceus L. 2. *Borjitis non ramosa*, alba, seminibus rotundis. — Omnium vulgarissima, T. 91. f. 3.
 est, & in quibuscunque corporibus, dum corrumpuntur, invenitur.

3. *Borjitis ramosa*, cinerea, seminibus rotundis. — ubi Superior. Tab. 91. f. 2.

4. *Borjitis spicata*, grisea, seminibus rotundis. — Per ambulastra fornicibus T. 91. f. 4.
 tecta, &c.

Borjitis dicitur a Voce Graeca *Borpus* racemus, id est racemosa, nam haec in
 hac planta semina racematum nascuntur.

Aspergillus.

Aspergillus dicitur a forma aspersorii, quo in Sacris utimur, quam praefert.

Mucor glaucus L. 1. *Aspergillus capitatus*, capitulo glauco, seminibus rotundis. — *Muffa* Lar. T. 91. f. 1.
china, *gambata*. — In Mali Limonii, atque Eidonii, & Pyri, nec non in Cucurbita frustulis, & aliis similibus locis semiputridis rebus oriri plerumque solet.

2. *Aspergillus capitatus*, capitulo aureo, seminibus rotundis. — *Muffa gambata*,
dorata. — Cum antedicto, sed rarissime invenitur.

3. *Aspergillus capitatus*, capitulo pullo, seminibus rotundis. *Muffa* nova
gambata. — ubi supra.

p. 213. 4. *Aspergillus capitatus*, omnium minimus, albus, seminibus ovatis — T. 91. f. 2.
 per Cellas Vinarias in vasis vitrei Veste.

Muc. leprosus L. 5. *Aspergillus caespitosus*, densissimus, initio niveus, deinde aureus, seminibus T. 91. f. 3.
 ovatis. — Ad arborum radices, in earundem cavernulis.

6. *Aspergillus niveus*, cespitosus, seminibus rotundis. — Post diut. plu. ad arb. T. 91. f. 7.
 7. *Aspergillus cespitosus*, ex obscuro nigricans, seminibus ovatis. Muffa. T. 91. f. 6.
 Toto anno viget in asperibus, quibus cancelli contexuntur, & ad ligneas columnas.
 M. Cespitosus L. 8. *Aspergillus albus*, tenuissimus, graminis *Dactyloctenii* facie, seminibus rotundis. — In dimidiatis & semipuridis Malis Limonibus. T. 91. f. 3.
 M. Cespitosus L. 9. *Aspergillus terrestris*, cespitosus, ac ramosus, albus. — Tab. 91. f. 4.

Puccinia. Maria, ~~Villars~~ Hill

Arthura Puccinia Patricio Pistoriense, in Florentino Lyceo Philosophiae,
 & Anthonio P. Professore.

1. *Puccinia non ramosa*, major, pyramidata. — Martio super junip. T. 92. f. 1.
 2. *Puccinia ramosa*, bifurcata, omnium minima, candidissima, pruina T. 92. f. 2.
 referens. — Super dejecta, & putrida Ligna. Octobri

Clathrus.

- Cl. Cancellatus. 1. *Clathrus ruber*. — Fuco Salvatico rosso. (vid. Batarr. & Gen. Bull. T. 93.
 2. *Clathrus albus*. — Fungus pro capitulo laminarum longam, laram
 multipliciter laminatam, & concoloram, albam intus, punctis nigris creberrimis
 pictam, emittens, calyce squamoso exceptam Rati. Hist. Tom. 2. 28.
 3. *Clathrus flavescens*. — Fungus Corall. &c. Barr. ic. 1265.

Clathri nomen in his plantis indidimus, quod ead clathrata, ac cancellata, retis
 aut ferrate fenestrae instar appareant.

Clathroides.

- Cl. Denudatus L. 1. *Clathroides purpureum*, pediculo donatum. — Tab. 94. f. 1.
 2. *Clathroides purpureum*, pediculo carens. — In emorruis lignis. — Tab. 94. f. 2.
 3. *Clathroides flavescens*, pediculo carens. — Rur. Lign. post pluvias.
Clathroides dicitur, quasi planta ad *clathrum* accedens.

Clathroidastrum.

Dicitur quasi planta ad clathroides accedens.

Clathrus
nudus.

- { 1. Clathroidastrum obscurum majus — In ligni putridi cavernulis. Tab. 94. f. 1.
2. Clathroidastrum obscurum minus. — Ad palos, & columnas. — T. 94. f. 2.

Mucor

Ab Etruscis dicitur *Muffa*, cujus vernacula vocis ætymon, forte a Græca voce *Mepluti* ortum ducit, quæ foetorem donat; nam planta hæc, dum introitus provenit clausis, ad quæ Solares radii non pertingant, ut in cellis vinariis aut dolis, male olentem spirat odorem, quem iidem Etrusci peculiari nomine *Tarfo* αὐτῶς τάρφον, idest Sepulchro, cui simile quid olet.

M. Mucedo. L.

1. Mucor vulgaris, capitula laevis, maturitate nigra, pediculis griseis T. 95. f. 1.
2. Mucor albus, minimus — In fimi Equini tumulis, super culmi tritici frag- T. 95. f. 2.
mentis.
3. Mucor globosus, lactis coagulati candorem, & substantiam emulans T. 95. f. 3.
Super detrunctis, & semiputridis Abietum Caudices.
4. Mucor minimus, cespitosus, candidus. — Super semiputr. culm. Trit. tumulis T. 95. f. 4.

216.

Lycogala.

Dicitur a Vocibus Græcis λύκος, Lupus, & γάλα, Lac, quasi diceretur Lac Lupinum.

1. Lycogala griseum, majus. — Vescia luttajola grigiadi Quercia — In Tab. 95. f. 1.
quercuum Caudicibus. (capitula crystallina, gelatinosa, subpellucida).
2. Lycogala globosum, rubrum granis magnitudine, & ris reoeti T. 95. f. 2.
colore — Ad Ligna uida, atque semiputrida. — Vescia luttajola rossa di albero.
3. Lycogala globosum, rubrum, granis parvis magnitudine, & forma — Ad T. 95. f. 3.
Subera.
4. Lycogala luteum, omnium minimum, reniforme — Ad seipsum T. 95. f. 4.
Arborum truncos semiputridos.
5. Lycogala terrestre, cespitosum, & ris reoeti colore — Vescia luttajola T. 95. f. 5.
rossa terrestre — In tumulis terre ad montanos agros fecundandos spar-
sim aggestis, atque excoctis igne vespribus, ac genistis immixto, ad triticum,
vel Secalem Serendam; rustici nostrates *Fornelli* vocant.

Mucilago.

Dicitur a Planta ad Mucum accedens.

1. Mucilago aestiva rufescens, hemisphaerica, caudicibus arbo. T. 96. f. 1.
num innascens - Aestivo tempore
2. Mucilago crustacea alba. - Mucicaglia - In pratis & nemori. T. 96. f. 2.
bus, variis quicquiliis innascens - Hyemali tempore - - -
3. Mucilago alba, ramosa, radices arborum fibrosas simulans - In T. 96. f. 3.
arborum casuris - Autumno.
4. Mucilago minima clavae effigie, lacteum candorem simulans, T. 96. f. 4.
pediculo donata. - Aprilis in viridariis - - -
5. Mucilago minima fungelli effigie, primum rufa, postea cinerea. T. 96. f. 5.
In agris in fumi Equini aggestis - Autumno.
6. Mucilago minima non crustacea, alba, grani panici magni - T. 96. f. 7.
tudine, & forma - In foliis semiputridis & saputibus.
7. Mucilago minima crustacea alba, capsulis grani panici magnitud. T. 96. f. 6.
dine & forma, dense positis. - Super semiputrida arborum folia. Br. 7.
8. Mucilago alba, crustacea, capsulis inter se longe distantibus - Cre. T. 96. f. 8.
- sit eodem loco, & tempore. i. e. Hyemali.
9. Mucilago crustacea, colore plumbeo, elegantissimo, capsulis T. 96. f. 9.
minimis, densissimis. - Ubi tres antecedentes.

Lycoperdon.

Appellatur a vocibus Graecis λυκος, Lupus, & οἶδος, Pedo; crepitum ventris
edo, quasi diceret, Lupi Crepitum.

Pediculati.

1. Lycoperdon album, totum aculeatum, altiori base donatum. - In sylvis T. 97. f. 1.
2. Lycoperdon album, aculeatum, basi altiori, crispum, & nonnihil as-
pera - In Ericetis & Castanetis.
3. Lycoperdon griseum, hirsute asperum, breviori base. In Castanetis
4. Lycoperdon album, lanuginosum, corticem primarium manifeste T. 97. f. 2.
exuens. - Vesica bianca, buona, che butta manifestamente la scorza.
5. Lycoperdon album, coniforme, altiori base insidens, totum asperum
Vere, & Autumno in sylvis, & dumetis, nec non in pascuis abunde oritur.

p. 217

6. *Lycoperdon album, asperum, leviter fastigiatum, basi altiori, & crispato donatum.*

7. *Lycoperdon album, cordis effigie, transverse positum, pediculo brevi donatum.*

8. *Lycoperdon parvum, album, clavatum, aculeis quadrilateris, & quadripartitis asperum.*

Lyc. pedunculatum. 10. *Lycoperdon (album, mammosum) Parisiense, minimum, pediculo donatum. Just. R. herb. 563. Tab. 331. 2. f. — 6 Jan. et febr. in syl-
locis, necnon ad sepes, vepres, & agrorum limites, & in muscosis locis.*

p. 218

11. *Lycoperdon album, mammosum, pediculo longo, & veluti squa-
-moso, ac fistuloso donatum. T. 97. f. 7.*

12. *Lycoperdon omnium minimum, album, unguibus Equinis pro-
-trescentibus innasens. T. 97. f. 8.*

Absque Pediculo.

*Lycoperdon esculentum, majus, subobscurum, & subasperum.
Vescia maggiore, bigia, buona da friggere. — Vere & autumno*

2. *Lycoperdon nivium, sphaerium, superficie in areolas adhaerens
instar dissecta, ac distributa. J. R. H. 564. Vescia maggiore, bianca, da friggere.
Fungus carnosus, niveus, globosus, adhaerens, in montibus Feltri-
-nis. Soc. Mus. part. 1. Tab. 306.*

3. *Lycoperdon esculentum, obscurum, echinis quadrangularibus, & quadri-
-partitis insignitum. T. 97. f. 5.*

4. *Lycoperdon esculentum, nitidum, molle, albo-cervinum, radicibus
crassioribus praeditum.*

5. *Lycoperdon turbinatum, leucophaeum, aculeis simplicibus, & nig-
-diusculis exasperatum.*

6. *Lycoperdon album, globosum, nitidum, esculentum.*

7. *Lycoperdon globosum, candidum, nitidum, & esculentum.*

8. *Lycoperdon globosum, luteum, glabrum, & nitidum.*

9. *Lycoperdon sphaerium, esculentum, cortice nitido, & nigro, pulpa
alba. — In arvis Carbonariae.*

10. *Lycoperdon globosum, album, cortice primario in stellulas ele-
-gantissimas dissecto, ac distributo. T. 97. f. 3.*

11. *Lycoperdon sphaericum*, album, ~~parvum~~, cortice primario in T. 97. f. 6.
furfuraceas portuunculas abeunte.
12. *Lycoperdon esculentum*, album, parvum, cortice primario in
adamantinas cuspides veluti pentagonas, & quadrupartitas secto.
13. *Lycoperdon esculentum*, hemisphaericum, griseum, villis, seu T. 97. f. 4.
aculeis tenuissimis, non exstantibus, obductum.
- p. 219. 14. *Lycoperdon esculentum*, obscurum, castaneae formam si-
mulans.
15. *Lycoperdon esculentum*, album, globosum, aculeis crassi-
oribus quadrilateris, & quadrupartitis munitum.
16. *Lycoperdon esculentum*, album, hemisphaericum, cortice pri-
maro in adamantinas cuspides fere pentagonas soluto.
17. *Lycoperdon sphaericum*, luteum, parvum, non asperum.
In truncis, vel asperibus piceis semiputridis.

Lycoperdoides.

Distinguitur a *Lycoperdo*, quod unius cortice, &que uniformi substantia
instructum sit. &c.

1. *Lycoperdoides* album, tinctorium, radice amplissima. T. 98. f. 1.
Autumno, in vestilibus, & sterilibus agris, &c.
2. *Lycoperdoides* tuberosum, ferrugineum, arrhizon, pulpa nigra T. 98. f. 2.
3. *Lycoperdoides* tuberosum, flavescens, multiplex. T. 98. f. 3.

Lycoperdastrum.

Lycoperdon
verrucosum
Bull.

1. *Lycoperdastrum* rotundum, majus, leucophorum, pulpa sordide T. 99. f. 1.
Cerulea — Vesica tartar. — In incoltris & quiescentibus agris. Autumno
2. *Lycoperdastrum* leucophorum, cortice verrucoso, pulpa sordide
Cerulea.
3. *Lycoperdastrum* obscurum, alius radicatum, pulpa atro-pur-
purea, cute lacera, & in furfurum veluti soluta.
- p. 220 6. *Lycoperdastrum* obscurum, alius radicatum, pulpa atro-pur- T. 99. f. 3.
purea, cute lacera, veluti punctata.

In Originali desunt n. 4. & 5., forte ob errorem impressoris.

7. *Lycopodastrum obscurum*, alius *radicatum*

7. *Lycopodastrum* quod *Lycopodon* e flavo-virescens, squamatum
Bot. Paris. 172. n. 4. *Lycop. verrucosum*, sphaerium, pediculo donatum
e flavo-virescens punctulis fuscis aspersum. Eiusd. Tab. XVI. n. 7.

8. *Lycopodastrum*, quod *Lycopodon* cepae facie. Bot. Paris. 173. n. 13.
Tab. XVI. f. v. vi.

Lycopod. aurantium
Gulliard.

9. *Lycopodastrum autumnale*, flavescens, cortice tenuiori, lavi, T. 99. f. 2.
pulpa sordide purpurea.

Lycopodon Cerinum
Linn.

10. *Lycopodastrum tuberosum*, arthizon, fulvum, cortice duore T. 99. f. 4.
crasso, & granulato, medulla ex albo-purpureascente, semine nigro,
crassiore.

Ad hoc quoque genus spectare videtur. Fungus subcaerulea pulpa, arthi-
lis flavis. Booc. Rarior. Plant. 23.

Lycopodastrum dicitur quasi planta ad *Lycopodon*, & *Lycopo-*
-dioides accedens.

Geaster.

Dicitur a Graecis vocibus γῆ Terra, & ἀστὴρ Stella, ac si Terrestrem
Stellam diceret.

Lycop. Stellatum L.

1. *Geaster major*, umbilico fimbriato. T. 100. f. 1.
2. *Geaster medius*, umbilico fimbriato. T. 100. f. 2.
3. *Geaster asper*, parvus, umbilico coronato, pediculo perbreui donatus. T. 100. f. 3.
4. *Geaster major*, umbilico, seu osculo stellato - fig. 6. eadem plan. T. 100. f. 4.
-ta iam effacta exprimitur.
5. *Geaster medius*, radiis plerumque multifidis, umbilico, seu osculo stellato T. 100. f. 5.

Carpobolus.

A vocibus Graecis καρπὸς fructus, & βάλλω jacio, ac si plantam fructum
ejaculantem diceret.

Lycop. Carpobolus L.

1. *Carpobolus* ... T. 101. f. 1.
Super ligna semiputrida, & fructus Cyprapus &c. Autumno post pluvias.
2. *Carpobolus aureus*, volva alba, fructu obscuro, seminibus subrotundis, T. 101. f. 2.
-dis, albicantibus. In sylvis ad arborum vetustarum radices, super cariei, &
tronco decidentis aggestos tumulos constanter provenit. Autumno. Breui Temp.

Tuber.

1. Lycopodium
Tuber. L.

1. Tuber Brunnale, pulpa obscura, odora.
2. Tuber Estivum, pulpa subobscura, minus sapida, ac odora.
Tuber albidum. Casalp. 613. Tastero nostrale.

Tab. 102.

Dicta autem sunt tubera, quasi tumores terræ, a similitudine tumorum, qui animalium corporibus aliquando spectantur. Sunt enim prominentiæ quædam supra reliquam superficiem exstantes, Græcis οἰσμήματα, idest tumores, & inflationes.

Cyathoides.

Dicitur a forma Cyathi quam refert.

Pez. lentifera L.

1. Cyathoides Cyathiforme, cinereum, & veluti sericeum. Tab. 102. f. 1.
In sylvis ad ligna putrescentia, nec non in agris, & circa palearia,
super cortices calvos tabefactos. Vere, autumnali, ac Brumali Temp.

Pez. hirsuta.

2. Cyathoides Cyathiforme, obscurum, externe hirsutum, interne plumbeum, glabrum, & striatum. Tab. 102. f. 2.
In sylvis supra ligna putrescentia & in terra.

3. Cyathoides luteum ~~Cyathiforme~~ Crucibuliforme. Tab. 102. f. 3.

4. Cyathoides Scutellatum, ore crispo, fructibus nigris, majoribus. Tab. 102. f. 4.

5. Cyathoides, quod fungus luminifer, minor, fere hemisphaericus
Raii. Ed. 2. App. 333. & Ed. 3. 20. 21. Tab. 1.

Sequuntur Lichenes a Michelio Descripti.

Ordo. I.

- I. Lichenes non crustacei, erecti, vel penduli.
- II. Flores in receptaculis planis, cavis, convexis, & sphaericis.
- III. Receptacula florum in una, vel in utraque parte, vel ad extremitatem plantarum posita.
- IV. Semina subhirsuta, vel in peculiaribus scrobiculis, vel in tuberculis, vel sub omnium foliorum cute enascentia.

L. Fraxineus Lin. Lichen pulmonarius, rufescens, durior, in amplas lacinias divisus. — T. 36. f. 1. — *L. arboreus, cinereus* Βλατυκαυλος, cornuoides. Potted. Comp. Tab. 21. — In arbor. stipitibus.

2. Lichen pulmonarius, cinereus, mollior, in amplas lacinias divisus. J.R.H. Tab. 525. A.

L. Calicaris Lin. ^{pag. 79.} 3. Lichen cinereus, latifolius, ramosus. J.R.H.

L. Farinaceus L. 4. Lichen cinereus, angustior, scutis (scrobiculis seminaalibus potius) in marginibus segmentorum. Bot. Paris.

Lichenoides arborum, ramosum, cinereo-virescens, segmentis angustioribus, circa margines crispis. Ray. Synops. ed. 3. 76. n. 84.

5. Lichen pulmonarius Alpinus, cinereus, durus, creberrime divarigatus, receptaculis florum rufescentibus. Tab. 36. f. 2. — In abietum, & Jagonum ramis.

6. Lichen Pulmonarius Alpinus, cinereus, durior, segmentis crebris ad extremitatem tenuissima divisis.

7. Lichen Pulmonarius mollior, cinereo-rufescens, segmentis lationibus, receptaculis florum peramplis. — Super neglectas arbores.

8. Lichen Pulmonarius cinereus, mollior, segmentis lationibus, varie divisis, receptaculis florum rufescentibus. — Ad arbores.

9. Lichen Pulmonarius mollior, dichotomos, superne cinereus, inferne albus, receptaculis florum interna parte ferrugineis Tab. 36. f. 3. Arboreus.

10. Lichen Cinereus, ramosus, verrucosus. Bot. Paris. Tab. XX. f. 13. Ad abietes in alpinis.

11. Lichen Pulmonarius, saxatilis, cinereus, crispus, varie divisus.
 12. Lichen Pulmonarius minimus, subluteus, receptaculis florum coronatis, Mali aurantii coloris. Tab. 36. f. 11. — Ad Pynos, & Abietes.

Ordo II.

- III. Receptacula florum ad foliorum extremitatem locata.
 IV. Semina in filamenta, plerumque multifida disposita, & ad margines, vel a summa plantae superficie erumpentia.

Lichen Alpinus, membranaceus, elegans, in amplas lacinias divisus, inferne albus, superne & glauco-sabrescens, receptaculis florum amplioribus, interna parte fuscis. Tab. 37. — Ad fagos, & Abietes.

pag. 76.

Ordo III.

- III. Receptacula florum in utraque parte plantae sita.
 IV. Semina

Tremella

Lichenoides L.

Lichen Terrestris membranaceus, mollior, fuscus, receptaculis florum sordide rubris, pereziquis. Tab. 38. — Inter Muscos & graminia crep.

Ordo IV.

- III. Receptacula florum in una tantum foliorum parte locata.
 IV. Semina in filamenta simplicia disposita quae per totam foliorum superficiem crebra nascuntur.

L. Prunastri.
 Cuneus adula.

Lichen Alpinus, cornua Cervi referens, subrus anthracinus, desuper cinereus, receptaculis florum amplioribus, intus fuscis. Tab. 38. f. 1. — In Abietibus, & fagis, sed rarus.

2. Lichen maritimus, albus, subhirsutus, cornua Damus referens, receptaculis florum interna parte flavescentibus. Tab. 38. f. 2. — In Sylvestrium prunorum ramis, & caudicibus.

3. Lichen maritimus, albidus, angustior, receptaculis florum nigricantibus. Tab. 38. f. 3.

Ordo v.

I. Lichenes ut plurimum teretes, non tubulati, erecti, vel penduli.

III. Receptacula florum secundum cauliculorum longitudinem, vel in eorum extremitate locata.

IV. Semina vel subhirsuta & interse connexa, in peculiaribus locis, vel lœvia, & in filamenta simplicia, aut multifida, per totam plantarum superficiem disposita.

L. Articulatus. L. 1. Lichen nodosus, cinereus, longissimus, receptaculis florum rufescentibus. Tab. 39. f. 1. — In Abietibus

L. Plicatus. Lin. 2. Lichen longissimus, ex cinereo-candicans, rugosus, & mollior, receptaculis florum rufescentibus. Tab. 39. f. 2. — Ex Fago, & Abiete pendens.

[Divaricati Proxim. 3. Lichen longissimus, ex cinereo-candicans, rugosus, & mollior, alcer. — ad arbores.

4. Lichen ex cinereo candicans, longissimus, surculis rigidioribus, receptaculis florum rufescentibus. Tab. 39. f. 4. — ubi n. 2. rep.

5. Lichen luteus, rugosus, tinctorius, surculis brevioribus — simul cum n. 3.

6. Lichen cinereus, longissimus, rugosus, junceus, & subasper. Tab. 39. f. 3. — in Abietibus.

7. Lichen capillaceus, longissimus, sive muscus arboreus nigricans. — In Abietibus, & ad Castaneas.

8. Lichen capillaceus longissimus, ex Fago, & Abiete pendens.

9. Lichen cinereus, longissimus, barbatus, receptaculis florum rufescentibus, coronatis — In Fagis, & Abietibus.

10. Lichen purpurascens Lusitanicus, capillaceo folio major. J. R. H. 150.

11. Lichen capillaceus, ex cinereo-rutilans, receptaculis florum subcinereis, & barbatis. Tab. 39. f. 5. — In glandiferarum arborum caudicibus.

12. Lichen capillaceus ex cinereo rutilans, tuberculis rufescentibus undique obsitus. — In Sepiariis plantis.

13. Lichen cinereus, capillaceo folio, minor. J. R. H. 150.

Muscus Quernus, fruticosus, Trichophyllum, Col. parv. 1. 331.

14. Lichen Polypoides tinctorius, saxatilis, Coroll. 40. — Lichenoides non tubulosum Platydasiphyllum, tuberculis pulverulentis donatum Rasi.

15. Lichen saxatilis, Italicus, Polygoides, cinereo-fuscus, crispus.
16. Lichen terrestris, fuscus, hirsutia asperus, receptaculis florum atro-rufis, coronatis. Tab. 39. f. 7. — In Ericetis.
17. Lichen terrestris, angustior, ramosissimus, fuscus. Bot. paris. 115.
18. Lichen terrestris atro-fuscus, minor, ramosior, ac rigidior, & veluti amuleatus.
19. Lichen alpinus, coralloides, cinereus, dichotomos, dense ramificatus, apicibus vix bifidis.
20. Lichen cinereus fruticosus, saxatilis, racemulis seminum undique obductus, receptaculis florum nigricantibus. Tab. 53. f. 5.
21. Lichen saxatilis, cinereus, fruticosus, ramulis habitioribus, minus ramosis, racemulis seminum undique, & dense refertis, receptaculis florum nigricantibus. Tab. 53. f. 6. — Sup. ingentia & deusta saxa.
22. Lichen alpinus, glaucus, ramosus, bostryoides (Tab. 53. f. 7.) Scheuchz.
- L. quisquiliaris 23. Lichen terrestris, fruticosus, cinereus, minimus. Tab. 53. f. 8.
Leers (Gmel. p. 1377.) In antiquis murorum fissuris, necnon in saxorum cavernis.
- p. 79. 24. Lichen saxatilis, minimus, nigerrimus, capillaceus.
25. Lichen arborum nigerrimus, vix conspicuus. — In nimis arborum corticem, & prodeque Populi nigri.

Ordo VI.

- I. Lichenes frutiosi, teretes, tubulati, Corallio edmuli.
- III. Receptacula florum in ramulorum apicibus.
- IV. Semina subhirsuta, plerumque simul juncta ob totam plantarum cutis solutionem provenientia.

L. Alpestris
Lin.

- Lichen coralloides, tubulosus major, candidus, ramosissimus, receptaculis florum rufescentibus, perexiguus. Tab. 40. f. 1. — In Ericetis.
2. Lichen coralloides, tubulosus, medius, cinereus, caulibus crassioribus, dense ramificatis, receptaculis florum rufescentibus. cū. sup.
3. Lichen coralloides, tubulosus, alpinus, medius, cinereus, caulibus crassioribus plerumque foliosis, brevissime ramificatis, receptaculis florum rufescentibus, perexiguus, ramulorum apicibus, & caulium dorso, atque foliorum superficie nascentibus.

p. 79.

4. Lichen coralloides, tubulosus, medius, cinereus, caulibus tenuioribus, crebris, ramosissimis, ramulis expansis, receptaculis florum rufescentibus. In Ericetis &c.

5. Lichen coralloides, tubulosus, medius, cinereo-candidans, caulibus crebris, tenuioribus, minus ramosis, receptaculis florum rufescentibus.

6. Lichen coralloides tubulosus, albidus, major, & mollior, caulibus crassioribus, minus ramosis, receptaculis florum perexiguis, rufescentibus. Tab. 40. f. 2.

7. Lichen coralloides, tubulosus, albidus, major, & mollior, caulibus crassioribus, minus ramosis, receptaculis florum perexiguis rufescentibus.

8. Lichen coralloides, tubulosus, major, ex cinereo-fusco-virescens, caulibus crassioribus, & durioribus, minus ramosis, extremitatibus palmatis, receptaculis florum exiguis, rufescentibus. Tab. 40. f. 3.

p. 80

9. Lichen coralloides, tubulosus, alpinus major, & durior, ex cinereo-virescens, caulibus primariis nonnihil compressis, cubino ad summum in ramulorum apicibus receptaculis florum perexiguis, ac rufescentibus ornatis. — In alpinis.

10. Lichen coralloides tubulosus, major, montanus, ex cinereo-viridi-rufescens, caulibus recurvis, nonnihil foliosis, inordinate dispositis, receptaculis florum crassioribus rufescentibus. Tab. 40. f. 4.

11. Lichen coralloides, tubulosus, medius, ex cinereo-viridans, ramulis eduncis, plerumque foliosis, extremitatibus palmatis, receptaculis florum rufescentibus. Tab. 40. f. 5.

12. Lichen coralloides, tubulosus, medius, ex cinereo-viridans, ramulis erectis, nonnihil foliosis, extremitatibus apertis & palmatis, receptaculis florum rufescentibus, exiguis. Tab. 40. f. 6.

13. Lichen coralloides, tubulosus, medius, ex cinereo-viridans, caulibus tenuioribus, acutis, minus ramosis, receptaculis florum rufescentibus.

Coralloides Cornua Corni referens, glabra, corniculis tenuioribus, bifurcatis. Hist. Pl. Paris. 423. & Bot. Paris. 42. — In Ericetis.

13. Lichen coralloides, tubulosus, cinereus, minor, parum ramosus, receptaculis florum coriineis.

14. Lichen Coralloides tubulosus, minor, & gracillimus, subviridis, ramulis erectis, nonnihil foliosis, receptaculis florum rufescentibus.

Ordo VII.

I. Lichenes Cauliferi a crassa foliacea peraequua nascentes, caulibus tubulatis, plerumque ramosis, vel in cornicula, vel in proboscideam vel in pyxidulas minus quam in sequenti ordine speciosas, atque patentes, & in ore clausas desinentibus.

III. Receptacula florum & pyxidularum marginibus erumpentia.

IV. Semina subhiolata, ut plurimum simul juncta & a solutione cutis cauliculorum, & inferna foliorum parte nascentia.

2. L. Deformis. Lichen pyxidatus, & corniculatus, proli ferax (e viridi obsolete lutescens) Scheuchz. In albis.

1. Lichen pyxidatus, teres, acetabulis minoribus repandis (Tab. 41. f. 1.) F.R.H. 549.

3. Lichen pyxidatus, corniculis aduncis (Tab. 41. f. 2.) H.F.R. 549.

p. 81. 4. Lichen pyxidatus, & corniculatus, cinereus, pulverulentus, major, & coarctior, plerumque multifidus.

5. Lichen pyxidatus, & corniculatus, cinereus, pulverulentus, corniculis brevioribus.

6. Lichen pyxidatus, & corniculatus, cinereus, angustior, & elatior, corniculis longioribus. — Tab. 41. f. 3.

7. Lichen pyxidatus, & corniculatus, albidus, ^{minor} major & gracilior.

8. Lichen pyxidatus & corniculatus, leprosus, corniculis tenuioribus, bifurcatis. Tab. 41. f. 4.

L. Gracilis. 9. Lichen pyxidatus, & corniculatus, ramosus, Alpinus, & fusco-cinereus, pyxidulis crenatis — Tab. 41. f. 5.

10. Lichen pyxidatus, ramosus, acetabulis fimbriatis. F.R.H. 549.

p. 81.

11. Lichen cinereus, crassus, ramosus, & non ramosus.
Lichenoides tubulosus ^{cinereus}, minus ramosus, cauliculis crassioribus, diffor-
-mibus. Rayi. Synops. 2d. 3. 68. n. 22.
12. Lichen cinereus, proboscideus, & corniculatus, ut plurimum non ra-
-mosus.
13. Lichen albus, proboscideus, & corniculatus, plerumque non ramo-
-sus, Proboscideum oris coccineis. — In Castaneis & Quercetis.
14. Lichen ex alba subcinereus, proboscideus, & corniculatus, minor, ut
plurimum non ramosus.
15. Lichen tubulosus, nivei fere candoris, ramosus, & non ramosus, ap-
-pibus recurvis, acutis. Scheuchz. Obs. Bot. Itiner. Alp. 2. ed. Lond. p. 63.
16. Lichen tubulosus, verrucosus, ex obscuro virore flavescent. Ejusd.
17. Lichen pixidatus albus, gracillimus, pixidulis multifidis, & ab-
-ra alteri innata. — In Quercetis & Sylvis caducis.

pag. 82.

Ordo VIII.

I. Lichenes communiter dicti pixidati, aut bifformes, constantes e crustu-
-la foliacea, & pixidiculis speciosis, atque majusculis, & in ore clausis,
vel simplicibus, vel ramosis, vel e margine, vel e medio altera ex
altera innascente.

L. Pixidatus Linn. Lichen pixidatus major — Tab. 41. f. 1. K. L. In omnib. sylv.

L. Pixid. var B. 2. Lichen pixidatus major, Alpinus, receptaculis florum copiosis-
-ribus, & rufescentibus. — Tab. 41. f. 2.

L. Cocciferus Linn. 3. Lichen pixidatus (rugosus, prolifer, & non prolifer) acetabulorum
oris coccineis, & tumentibus. — Tab. 41. f. 3.

4. Lichen pixidatus prolifer, acetabulis rudibus, & minus cavis,
receptaculis florum coccineis. — Inter fagos, & Abies.

5. Lichen pixidatus, acetabulorum oris proliferis, receptaculis
florum rufescentibus — Tab. 41. f. 7.

6. Lichen pixidatus, acetabulorum oris fuscis, & tumentibus. J. R. H. 59.

7. Lichen pixidatus ramosus, & prolifer, major, receptaculis florum rufescentibus.
Tab. 41. f. 8. — In Sylvis.

8. *Lichen pyxidatus ramosus, & prolifer medius D. Scheuchzerii.*
9. *Lichen pyxidatus, Endiviae crispae folio, prolifer, (superne flavescens, inferne albidus) acetabulorum oris crispis.* — Tab. 42. f. 7. — *Art. H. 549.*
Marpl. ic. 1278. n. 11.
10. *Lichen pyxidatus, Endiviae crispae folio, superne cinereus, inferne ex albo rufescens, acetabulis alter alteri usque ad quartum & quintum gradum innascentibus.* — Tab. 42. f. 2.
11. *Lichen pyxidatus, terrestris, Endiviae crispae folio, superne ex flava, & glauco subvirescens, inferne albidus, pyxidulis plerumque simplicibus, receptaculis florum rufescentibus.* — Tab. 42. f. 3.
12. *Lichen pyxidatus minor* (Tab. 41. f. 4.) *inst. R. H. 549.*
13. *Lichenoides pyxidatum, tubulosum, marginibus serratis.* *Dill. Cat. 916.*
Lichen non ramosus, acetabulis fimbriatis. — *Michel. Tab. 41. f. 5.*
14. *Lichen pyxidatus, minimus, foliis tenuiter & eleganter incis, receptaculis florum rufescentibus.* — Tab. 41. f. 6.

Ordo IX.

- I. *Lichenes pyxidatis affines, constantes e crustula foliacea, & caulis plerumque ramosis, ad extremitatem, & divaricationem hians, & fere pyxidatis.*
- Lichen tubulatus, ramosus, albus, scaber, & elatior, receptaculis florum rufescentibus.* — Tab. 42. — *Ad putrida Castan. ligna.*
2. *Lichen ~~tubulatus~~ tubulatus, minor, albus, ramosus, & scaber, receptaculis florum rufescentibus.*
3. *Lichen qui lichenoides tubulosum, cinereum, valde crustaceum, ramulis brevibus, & crebris ex acetabulis enascentibus.* *Dill. Cat. 203.*
4. *Lichen tubulatus, albus, ut plurimum non ramosus, scaber, receptaculis florum eleganter rufis, crispis, & confertis.* *In Ericet.*
5. *Lichen tubulatus, minor, vix semiuinciam altus, scaber, & albus, extremitatibus couineis.* — *In Sylvis caduis ad dejectarum Castanearum putrescentia ligna.*

Ordo x.

I. Lichenes pyxidatis affines, & crustula foliacea, & caulibus simplicibus, strigosis, minima, vel vix cavis constantes.

III. Receptacula florum, vel simplicia, vel multifida in Cauliculorum summitate posita.

Lichen minimus, lignis adnascens, foliis crispis, tenuissime divisis, inferne albis, superne & flavo-virescentibus, receptaculis florum rufis. — ubi seq.

2. Lichen minimus, lignis adnascens, foliis eleganter & tenuiter incis, inferne albis, superne & flavo-virescentibus, receptaculis florum cinereis. — Ad Emortua, & Semiputrida Castanearum ligna.

3. Lichen minimus, lignis adnascens, foliis latusculis, eleganter, tenuiter incis, inferne candidis, superne cinereis, receptaculis florum rufescentibus.

4. Lichen minimus terrestris, foliis perexiguis, receptaculis florum rufescentibus. Tab. 42. f. 1.

5. Lichen minimus, terrestris, foliis perexiguis, receptaculis florum fufis T. 42. f. 2.

Ordo XI.

I. Lichenes crustacei, Pulmonarii, coriacei.

III. Receptacula florum, si in hac planta ^{ita} vocari licet in adversa planorū parte undique sparsa.

IV. Semina disposita in filamenta multifida, tum in foliorum marginibus, tum per totam supernam eorum superficiem.

Lichen Pulmonarius, Saxatilis, fusco-rufus, receptaculis florum albidis. Tab. 43.

Ordo XII.

III. Receptacula florum in superna plantarum parte, tum ad latera, tum ad extremitates posita.

IV. Semina ut in ordine antecedenti, sed in peripheria plerumque erumpentia.

Lichen Pulmonarius maximus, & cinereo-rufescens superne, inferne subrufus, margine crispo, & veluti fimbriato, receptaculis florum rubris, vel ferrugineis plano-orbiculatis.

2. Lichen Pulmonarius maximus, & cinereo-rufescens, inferne subrufus, receptaculis florum rubris, plano-orbiculatis.

3. Lichen pulmonarius, maximus, verisimilis, superne e cinereo-virescens, inferne obscurus, receptaculis florum rubris, circinnatis.

4. Lichen pulmonarius major, inferne obscurus, desuper e cinereo-virescens, receptaculis florum nigricantibus, primum circinnatis, deinde teretibus. Tab. 44. f. 2.

5. Lichen pulmonarius minor, inferne subobscurus, superne cinereus, receptaculis florum rubris circinnatis.

L. horizontalis. 6. Lichen pulmonarius, minor, inferne obscurus, desuper cinereus, receptaculis florum nigricantibus, circinnatis. — Tab. 44. f. 6. — In querc. laudibus.

7. Lichen (Islandicus) pulmonarius, minor, angustifolius, spinis tenuissimis ad margines ornatus, receptaculis florum transverse oblongis, rubris, vel ex rubro-ferrugineis. — Tab. 44. f. 4. — In alpinis.

8. Lichen pulmonarius, maximus, superne e cinereo-rufescens, inferne subrufus, receptaculis florum rubris, ad latera oblongis. Tab. 44. f. 1.

9. Lichen pulmonarius maximus, cinereus, inferne albus, & niger, reticulatus, receptaculis florum rubris, transverse oblongis.

10. Lichen pulmonarius, maximus, inferne nigricans, superne cinereus, & splendescens, receptaculis florum rubris, transverse oblongis.

11. Lichen pulmonarius major, inferne albidus, desuper cinereus, receptaculis florum rubris, ad latera oblongis.

12. Lichen pulmonarius, minor minimus, inferne albus, & niger, reticulatus, superne e cinereo-virescens, receptaculis florum nigricantibus, ad latera oblongis. — Tab. 44. f. 3.

p. 86. 13. Lichen pulmonarius, minimus, inferne albus & niger, reticulatus, desuper e cinereo-virescens, receptaculis florum rubris, ad latera oblongis. — Tab. 44. f. 5.

Ordo XIII.

I. Receptacula florum in inferiorum plantarum parte adita, sed ita sursum reflexa, ut desuper locata esse videantur.

Lichen pulmonarius, major, ex obscuro cinereus, inferne ex albo rufescens, receptaculis florum rubris, amplioribus, ad latera oblongis. — Tab. 44. f. 1. ad laud. Castan.

2. Lichen pulmonarius, minor, ex obscuro cinereus, inferne ex albo rufescens, receptaculis florum rubris, ad latera oblongis. — Tab. 44. f. 2. ad querc.

Ordo XIV.

III. Receptacula florum ad margines plerumque superne plantarum partis.

IV. Semina in parvis globulis digesta, tum per totum marginem, tum undique in eorum superficie secundum lacunarium os nascentia, quemadmodum in portione magis exacta melius apparet.

Lichen arbores, sive Pulmonaria arbores. — In montanis sylv. ad arbores.

2. Lichen arbores, sive Pulmonaria arbores minor & angustifolia. — Tab. 45.
Ad Fagos, & Abietes familiaris.

Ordo XV.

III. Receptacula florum in medio superne plantarum partis nascentia.

IV. Semina in filamenta ramosa, aut multifida disposita, quæ filamenta singillatim erumpunt per totam foliorum superficiem, in plantis plerumque feminis, seu non floriferis.

Lich. lobatus

Gmel. Pars. II. p. 1372.

Lichen Pulmonarius Quercu folio, inferne nigricans, superne cinereus, receptaculis florum sordide virescentibus — Tab. 45. — In laud. & Mal. Syr. abies.

2. Lichen Pulmonarius Alpinus, inferne nigerrimus, superne pulchre cinereus, receptaculis florum obsolete gilvis. — Ad Castan. radices.

3. Lichen Pulmonarius, Saxatilis, tinctorius, tenuiter divisus, inferne nigricans, desuper e sulphureo-cinereus, receptaculis florum amplioribus, fuscis. — Ad Saxa.

p. 87.

4. Lichen Pulmonarius, arboribus adnascens, in segmenta latiora divisus, subtus niger, desuper ex obscuro-virescens, receptaculis florum concoloribus. — In Fraxinorum Corticibus.

5. Lichen Pulmonarius Saxi & arboribus adnascens, inferne nigricans, superne obscurus, receptaculis florum concoloribus. — Ad saxa quoque.

6. Lichen Pulmonarius Crustæ modo Saxi adnascens, pullus.

7. Lichen Pulmonarius, arboribus adnascens, tenuiter divisus, inferne nigricans, superne obscurus, & verrucis perexiguis undique exasperatus, receptaculis florum concoloribus. — In Sylvestr. Purnor. Caudicibus.

8. Lichen Pulmonarius, Saxatilis, tenuiter, & eleganter divisus, inferne cirrosus, & anthracinus, desuper obscuro-fuscus, & veluti rugosus, receptaculis florum fuscis. — In Saxorum Supericulis.

Ordo XVI.

1. Lichenes crustacei, Pulmonarii, Substratis gelatinosis.

Lichen Pulmonarius, membranaceus, gelatinosus, pullus, in segmenta latiora divisus, receptaculis florum exiguis, obscure rubeis, numerosissimis. Ad arbores, & ad Saxa.

2. Lichen Pulmonarius gelatinosus, crassus, atro-virens, receptaculis florum concoloribus, per siccitatem vero fusco-ferrugineis. — Ad Saxa.

3. Lichen Pulmonarius, gelatinosus, crassus, ex obscuro-virideans, receptaculis florum concoloribus, per siccitatem vero fusco-ferrugineis. ubique in Saxosis locis.

4. Lichen Pulmonarius, gelatinosus, crassus, minor, foliis latiusculis digitatis ex obscuro gilvris, receptaculis florum concoloribus, per siccitatem autem fusco-ferrugineis.

5. Lichen Pulmonarius, gelatinosus, crassus, minor, foliis latiusculis, digitatis, e griseo-subobscuris, per vetustatem fuscis, & in uiam se colligens, receptaculis florum concoloribus, postea fusco-rubris. — In ambulacris hortorum.

6. Lichen Pulmonarius, gelatinosus, terrestris, atro-virens, foliis crassis, brevibus, congestis, & nudis, receptaculis florum fulvo-fuscis. ubi saepe.

p. 88. 7. Lichen Pulmonarius gelatinosus, fuscus, arboribus adnascens, parvus, crassus, & crispus, receptaculis florum. In Fraxin. Caudicibus.

8. Lichen Pulmonarius gelatinosus, crassus, e griseo-subfuscus, in segmenta latiora divisus, globulis minutissimis plerumque, & undique aspersus, receptaculis florum concoloribus, per vetustatem fusco-rubris. — Cura reliquis.

9. Lichen Pulmonarius gelatinosus, crassior, & mollior, crispus, rugosissimus, e griseo-subfuscus, receptaculis florum. In Arborum Caudicibus, interdum ad Saxa.

10. Lichen, qui Lichenoides Terrestris, membranaceum, gelatinosum, & fusco-virescens, crispum, & rugosum. Dillen. Cat. Gips. 209.

11. Lichen Pulmonarius gelatinosus, parvus, foliis crassis, cristatis, e gilvo sordide virescentibus, receptaculis florum concoloribus. In Parietibus.

12. Lichen Pulmonarius, gelatinosus, terrestris, membranaceus, atro-virens foliis latiusculis Jacobae Marit. in modum divisus, receptaculis florum fusco-rubeis. In Viridariis cum per ambulacra, cum seorsus aqua ductus.

13. Lichen Pulmonarius, gelatinosus, terrestris, mediae crassitie, atro-virens, foliis carinatis angustioribus & Jacobae Marine in modum divisis, receptaculis florum fusco-rubeis. — ubi antea dictus.

14. Lichen Pulmonarius, gelatinosus, mediae crassitie, atro-virens, foliis carinatis angustioribus & Jacobae Marine in modum divisis, receptaculis florum fusco-rubeis. — Ad saxa. (laciniæ tenues, multifidae, atro-vivantes, scutellis copiosis, ruforubeis).

15. Lichen Pulmonarius gelatinosus, Opuntioides, exiguus, fontanus, griseo-fuscus, segmentis brevioribus, teretiusculis, receptaculis florum...
..... In crateribus fontium & vindaria.

16. Lichen Pulmonarius, gelatinosus, Opuntioides, griseus, parvus, aequatus, segmentis teretibus, acutis. — In Scillitidis.

Ordo XVII.

I. Lichenes Crustacei, Pulmonarii, Coniacei.

IV. Semina in femineis, seu non floriferis plantis ad laciniarum exortum cumulatione aggregata.

Lichen Pulmonarius, arboribus adnascens, maximus, inferne obscurus, de super e glauco-cinereus, receptaculis florum rubris, seminibus nigricantibus. Tab. 46. — Castan. fagorumque caudicibus adheret, atque latius se diffundit.

Obs. Folium latum, cinereum, laciniatum, laciniis lobatis, subtus pallide fusco.

Pag. 89.

Ordo XVIII.

IV. Semina in comosa arbuscula disposita, & per totam plantae superficiem sparsa.

Lich. Pustulatus. Lichen Pulmonarius, saxatilis, inferne reticulatus, & lacunatus, superne cinereus, ac verrucosus, receptaculis florum, & seminibus nigricantibus, & veluti crustas. Tab. 47.

Ordo XIX.

IV. Semina circa foliorum margines crebro nascentia, collecta veluti in corymbos, basi tubulara insidentes.

Lichen Pulmonarius, saxatilis, subtus nigricans, de super olivae conditae colore, receptaculis florum concoloribus. — Tab. 51.

pag. 87. M.

2. Lichen Pulmonarius, subtus nigricans, desuper ex obscuro-fuscus, receptaculis florum concoloribus.

3. Lichen Diasioridis, & Plinii Secundus, colore flavescente. Col.

Musci Crustæ modo arboribus adnascens, colore flavescente C.B.P. 361.

In arboribus, tectis, muris, aliisque consimilibus locis.

Ordo XX.

IV. Semina subhirsuta in glomerulos veluti distincta atque non modo per totum foliorum spatium, verum etiam in dorso receptaculorum, dissimulate, crebro nascentia.

L. Caperatus. 1. Lichen Pulmonarius, saxis, & arboribus adnascens, major, inferne nigricans, superne sulphureo-cinereus, receptaculis florum amplioribus, intus sordide, & obsolete viridibus. — Tab. 48. f. 1. — In Petris, & arborum stipitibus.

2. Lichen Pulmonarius, saxis, & arboribus adnascens, medius, inferne nigricans, superne sulphureo-cinereus, receptaculis florum

3. Lichen Pulmonarius, medius, arboribus adnascens, inferne ex albo-nufescens, superne cinereus & lacunatus, receptaculis florum fulvo-spadicis. — Frequens potius in arboribus quam in saxis / L. Saxatilis

pag. 90. 4. Lichen Pulmonarius, inferne obscurus, desuper ex glauco-subvirescens, receptaculis florum amplioribus, ac densioribus, atro-fuscis. — Tab. 48. f. 2. In Abietibus.

Ordo XXI.

Semina subhirsuta, tum per totum plantarum marginem sine ulla intervallo, tum in eorum plano dissimulate, in distinctos veluti glomos aggrégantia.

L. Caperatus. 1. Lichen Pulmonarius, arboribus adnascens, inferne obscurus, desuper lacunatus, ex glauco, & cinereo-flavescens, receptaculis florum rubris. — Tab. 49. f. 1.

Ordo XXII.

IV. Semina subhirsuta, tum per totam plantarum peripheriam, tum in earum superficie per reticulatas rimas emergentia.

Lich. Saxatilis. Lichen Pulmonarius, foliis eleganter divisis, inferne nigerrimis, & cirrosis, superne lacunatis, & glauco-cinereis, receptaculis florum fusco-virescentibus. Tab. 49. f. 1.

L. Omphalodes. 2. Lichen Pulmonarius, tinctorius, foliis eleganter, & tenuiter divisis, inferne nigricantibus, & cirrosis, superne purpureis, & lacunatis, receptaculis fl. concoloribus. Tab. 49. f. 2.

Ordo XXIII.

IV. *Semina subhirsuta circa foliorum margines erumpentia.*

Lichen Pulmonarius, crassus, superne & cinereo plumbeus, torosus, ac filamentosus, inferne albus, & villosus, receptaculis florum ex rubro-ferrugineis. — Tab. 43. f. 1.

In *Fagorum*, *abietum*, *Castanearumque* radicibus.

2. *Lichen Pulmonarius minor*, superne cinereus, inferne nigricans, receptaculis florum atro-rubeis, externa parte verrucosis — Tab. 43. f. 3.

Ad *quercus*, *cerros*, *Castaneas*, aliasque similes arbores provenit.

L. *Stellaris* L. 3. *Lichen Pulmonarius*, vulgarissimus, superne albo-cinereus, inferne nigricans, segmentis angustis, & eleganter divisis, receptaculis florum nigricantibus. — Tab. 43. f. 2. — Ad arbores ubique oritur.

4. *Lichen Pulmonarius*, *Alpinus*, foliis angustissimis, eleganter divisis, superne & cinereo-virescentibus, inferne nigricantibus, & ciliatis, receptaculis florum fuscis, coronatis, seu foliosis — Tab. 43. f. 4. ad *fagos*.

6. *Lichen Pulmonarius*, aureus, vix conspicuus, tenuissime divisis, receptaculis florum concoloribus. — Tab. 43. f. 5. — In *Arborum*, & *Fructuum* stipitibus ubique frequens.

Ordo XXIV.

III. *Receptacula florum Pedunculo veluti insidentia.*

IV. *Semina subhirsuta, circa margines supremæ foliorum partis, & in dorso receptaculorum florum & cutis laceratione veluti nascentia.*

Lichen Pulmonarius, crispus, inferne nigerrimus, & glaber, superne cinereus, receptaculis florum subobscuris. — Tab. 50. f. 1. — In *arb. laud.*

2. *Lichen Pulmonarius latifolius*, inferne albidus, superne cinereus, receptaculis florum concoloribus. — Tab. 50. f. 2. — *Arboreus*.

p. 92. 3. *Lichen Pulmonarius minor*, cinereus, flabelliformis, limbo superna parte repando. — In *abietum* dorso.

Ordo XXV.

I. *Lichenes Crustacei, Pulmonarii, coriacei, tubulati, ramulorum apicibus in prima specie Clausis, in secunda vero laxis.*

IV. *Semina subhirsuta nascentia & solutione cutis, vel ab externis, vel internis ramulorum extremitatibus.*

L. Phipsoies L. Lichen Pulmonarius, arboribus adnascens, desuper cinereus, subtus anthracinus, segmentis teretibus, tubulosis, corniculatis, ad extremitatem clausis, receptaculis florum subrubentibus. — Tab. 50. f. 1. — In Abietibus.

2. Lichen Pulmonarius, arboribus adnascens, desuper cinereus, subtus anthracinus, segmentis teretibus, tubulosis, corniculatis, crebre divisis, ad extremitates hiantibus, & veluti cristatis, receptaculis florum rubeis. — Tab. 50. f. 2.

Ordo XXVI.

I. Lichenes Crustacei, Pulmonarii, coriacei, non tubulati.

IV. Semina subhirsuta, circa margines inferioris foliorum partis, & solutione cutis veluti enascentia.

Lichen Pulmonarius, cristatus, arboribus adnascens, exiguus, inferne albidus, desuper cinereus, receptaculis florum subobscuris. Tab. 50. f. 1. In Castan. Cort.

2. Lichen Pulmonarius, cristatus, arboribus adnascens, exiguus, angustioribus segmentis, receptaculis florum obscurioribus. — Tab. 50. f. 2.

3. Lichen Pulmonarius, saxis, & arboribus adnascens, exiguus inferne albus, superne cinereo-virescens, receptaculis florum nigricantibus.

p. 93. Mich. Ordo XXVII.

I. Lichenes Crustacei, Pulmonarii, coriacei, ad margines radicati, seu barbati.

IV. Semina subhirsuta posita in scrobiculis a disjuncto, & laxo foliorum apice, & margine efformatis, quemadmodum in porri one hujus planta per lentem visa, & radicibus descripta melius apparet.

Lichen Pulmonarius, arboribus adnascens, exiguus, angustifolius, superne cinereus, inferne albus, receptaculis florum obscuris. Tab. 50. In Abietum Corticibus.

Ordo XXVIII.

IV. Semina subhirsuta, recondita, in tumidis receptaculis, vel ab inferna, vel a superna foliorum parte efformatis.

L. Ciliaris L. Lichen Pulmonarius exiguus, saxis, & arboribus innascens, ad margines radicatus, inferne albus, desuper subcinereus, receptaculis florum nigricantibus. — Tab. 50.

2. Lichen cinereus, arboreus, marginibus pilosis, major. Bot. Par. 115. n. 5. Ad arbores copiosus.

p. 93. Mich.

13. Lichen Pulmonarius, minor, ad margines radicans, inferne albus, superne cinereus, receptaculis florum nigricantibus. — In fruticibus ubiq.

Ordo XXIX.

IV. Semina subhirsuta, adita in scrobiculis per margines, & superficiem foliorum.

Lichen Pulmonarius minimus, arboribus innascens, ad margines radicans, superne cinereo-fuscus, inferne anthracinus, receptaculis florum fuscis. Tab. 51. — Ad Populos, ad Ulmos, &c.

2. Lichen Pulmonarius, minimus, arboribus innascens, ad margines radicans, desuper cinereus, subtus albus, receptaculis florum fuscis. C. prima species.

pag. 94.

Ordo XXX.

I. Lichenes crustacei, pulmonarii, arctissime adnascens, persiccitate rimosi, ex substantia plerumque farinacea, & ex loco, in quo proveniunt, nisi in fragmenta separabiles.

IV. Semina subhirsuta, vel per totam superficiem, vel in peculiaribus locis in plantis, ut plurimum non floriferis, reperiuntur.

L. fragilis L.

Lichen Pulmonarius, saxatilis, farinaceus, major, foliis crassis, subrotundis, & cinereo-virescentibus, inferne albis, receptaculis florum subrufis. Tab. 51. f. 1.

2. Lichen Pulmonarius, saxatilis, farinaceus, foliis brevibus, inferne albis, desuper & cinereo-virescentibus, receptaculis florum rufis. — Tab. 51. f. 2.

3. Lichen Pulmonarius, saxatilis, farinaceus, foliis brevibus, sordide virescentibus, ad fulvum colorem tendentibus, receptaculis florum nigricantibus.

4. Lichen Pulmonarius, saxatilis, farinaceus, foliis exiguis, multum laciniatis, viridantibus, receptaculis florum nigris.

5. Lichen Pulmonarius, saxatilis, farinaceus, foliis exiguis, inferne albis, superne aurantiacis, receptaculis florum nigris.

6. Lichen Pulmonarius, saxatilis, farinaceus, glauco-virescens, angustioribus segmentis, receptaculis florum griseis. — Tab. 51. f. 4.

Tectis, Parietibus, & saxis frequens.

7. Lichen Pulmonarius, Saxatilis, farinaceus, ex albo-subcinereus, foliis pul-
-posis, pulverulentis, receptaculis florum griseo-rufis. — Tab. 51. f. 8. — In
Saxis, & muris obuius.
8. Lichen Pulmonarius, Saxatilis, farinaceus, foliis pulposis, pulverulentis,
Sulphureo-virescentibus, receptaculis florum griseo-rufis. — Var. præcedens.
9. Lichen Pulmonarius, Saxatilis, farinaceus, albus, foliis pulposis, ad
extremitatem magis complanatis, receptaculis florum cinereis. T. 51. f. 3.
10. Lichen Pulmonarius, ~~Saxatilis~~ arboribus adnascens, farinaceus,
desuper e cinereo-albicans, inferne ex albo-rufescens, foliis pulposis,
receptaculis florum nigris.
11. Lichen Pulmonarius, Saxatilis, farinaceus, cinereus, crispus, recep-
-taulis florum In Muris, & tectis admodum familiaris.
12. Lichen Pulmonarius, Saxatilis, farinaceus, cinereo-fuscus, foliis
pulposis, angustioribus, receptaculis florum fuscis.
13. Lichen Pulmonarius, Saxatilis, farinaceus, tenuiter divisus, su-
-perne sulphureus, inferne nigricans, per siccitatem in porriunculas
perexiguas magis se dividens, receptaculis florum griseo-rufis.
- p. 95. 14. Lichen Pulmonarius, Saxatilis, farinaceus, coloris aurantiaci, fo-
-liis magis appressis, receptaculis florum concoloribus.
15. Lichen Pulmonarius, Saxatilis, farinaceus, luteus, vulgatissimus,
foliis pulposis, receptaculis florum concoloribus. — In muris & tectis obuius.
16. Lichen Pulmonarius Saxatilis, farinaceus, sulphureus, & mollior,
receptaculis florum ex rubro aureis.
17. Lichen Pulmonarius, Saxatilis, farinaceus, ex fusco-nigricans,
foliis angustissimis, & creberrimis, receptaculis florum ferè nigris. T. 51. f. 6.

Ordo XXXI.

I. Lichenes crustacei, Pulmonarii, coriacei.

III. Receptacula florum in substantia plantæ affixa, atque recondita, &
minime apparentia, nisi laceratione cutis, quemadmodum in folio per
microscopium valde aucto loculenter apparet. — IV. Semina

L. Saxatilis
Lin.

Lichen Pulmonarius, Alpinus, terrestris, glauco-virescens, receptaculis
florum fuscis. — Tab. 52.

Ordo XXXII.

- I. Lichenes Crustacei, non Pulmonarii, seu non foliosi, nec in laciniis secti, Substantia ut plurimum farinacea.
 III. Receptacula florum in interna verrucarum parte adhaerentia, & solum per rimam apparentia, rarissima extra eadem verrucas prorsus exeuntia.

IV. Semina

L. Sinuatus. L.

Lichen Crustaceus, verrucosus, Alpinus, arboribus adnascens, cinereus, receptaculis florum rufescentibus. — Tab. 52. — Ad fagos, & abietes.

Ordo XXXIII.

- I. Lichenes Crustacei, non Pulmonarii, nonnihil sinuati, Substantia farinacea.
 III. Receptacula florum in superficie plantae locata.
 IV. Semina

Lichen Crustaceus, Sinuatus, farinaceus, verrucosus, cinereus, Musco innascens, receptaculis florum virgicantibus. — T. 52.

p. 96.

Ordo XXXIV.

- I. Lichenes Crustacei, non pulmonarii, indivisi scilicet, neque laciniati, neque sinuati, Substantia farinacea, vel ex tartaro.
 IV. Semina subhirsuta in plantis ut plurimum non floriferis, seu femineis, vel per totam earum superficiem, vel in peculiaribus scrobiculis enascentia.

L. Tartareus L.

Lichen Crustaceus, saxatilis, farinaceus, verrucosus, candidus, omnium crispissimus, receptaculis florum virgicantibus. — Tab. 52.

2. Lichen Crustaceus, farinaceus arboribus adnascens, verrucosus, candidus, receptaculis florum rufescentibus. — Ad Cerasa.

3. Lichen Crustaceus, arboribus adnascens, farinaceus, verrucosus, candidus, receptaculis florum concoloribus. — (Lich. Fagineus)

4. Lichen Crustaceus, arboribus adnascens, farinaceus, verrucosus, sulphureus, receptaculis florum fuscis. — In Quercuum Caudicibus.

5. Lichen Crustaceus, arboribus adnascens, farinaceus, verrucosus, ex albo subvirescens, receptaculis florum eleganter rufis, extrinsecus veluti striatis. — In Abietum Stipitibus.

6. Lichen Crustaceus, saxatilis, verrucosus, albus, receptaculis florum concoloribus, & copiosioribus.

7. Lichen crustaceus, Saxatilis, farinaceus, verrucosus, cinereus, receptaculis florum nigris, crispis, & copiosioribus.
8. Lichen crustaceus, Saxatilis, & arboraeus, verrucosus, cinereus, receptaculis florum nigricantibus.
9. Lichen crustaceus, Saxatilis, farinaceus, obscurus, receptaculis florum nigris, non tumentibus.
10. Lichen crustaceus, Saxatilis, farinaceus, saturato-cinereus, receptaculis florum amplioribus, nigris, non tumentibus.
11. Lichen crustaceus, Saxatilis, farinaceus, subobscurus, receptaculis florum nigris, amplioribus, & tumentibus.
12. Lichen crustaceus, Saxatilis, farinaceus, subobscurus, receptaculis florum nigris, minoribus, & tumentibus.
13. Lichen crustaceus, Saxatilis, farinaceus, sulphureo-cinereus, receptaculis florum nonnihil tumentibus, primum nigris, deinde rufescentibus.
14. Lichen crustaceus, Saxatilis, farinaceus, cinereus, receptaculis florum nigris, & nonnihil tumentibus. — Var. praecedentis.
- p. 97. 15. Lichen crustaceus, Saxatilis, viridis, non verrucosus, receptaculis florum ferrugineis. — In muris & ad Saxa humida.
16. Lichen crustaceus, Saxatilis, farinaceus, verrucosus, sulphureus, receptaculis florum nigricantibus, per oras tenuissime striatis.
17. Lichen crustaceus, Saxatilis, farinaceus, verrucosus, albus, receptaculis florum nigricantibus, per oras tenuissime striatis. In aquaductis.
18. Lichen crustaceus, Saxatilis, farinaceus, verrucosus, alpinus, albus, mollissimus, receptaculis florum nigricantibus, majoribus, per oras tenuissime striatis. In rupibus.
19. Lichen crustaceus, Saxatilis, farinaceus, luteus, receptaculis florum nigris. — In collibus ad Saxa copiosus.
20. Lichen crustaceus, Saxatilis, recens luteus, per siccitatem farcus, receptaculis florum semper nigris. — In Saxis subhumidis.
21. Lichen crustaceus, Saxatilis, farinaceus, ex albo subcinereus, receptaculis florum exiguis, concavis, & nigricantibus, ac in substantia planta veluti infixis. — In tectorum tegulis, & ad Saxa ubique.

22. Lichen crustaceus, saxatilis, farinaceus, verrucosus, cinereus, receptaculis florum exiguis, concavis, & nigricantibus, ac in substantia plantae veluti infixis. — *Proced. Variet.*

23. Lichen crustaceus, saxatilis, farinaceus, non verrucosus, albus, receptaculis florum exiguis, nigricantibus, concavis, & crispis, ac in substantia plantae veluti infixis.

24. Lichen crustaceus, saxatilis, farinaceus, non verrucosus, ex albo-subcinereus, receptaculis florum atro-rufis, ad ferrugineum tendentibus.

25. Lichen crustaceus, arboribus adnascens, crusta cinerea, tenui, ex albo subcinerea, receptaculis florum atro-rufis, ad ferrugineum tendentibus. *Ad ficus.*

26. Lichen crustaceus, saxatilis, glaucus, tenuissimus, receptaculis florum exiguis, carneis.

27. Lichen crustaceus *Alpinus*, arboribus adnascens, luteus, receptaculis florum aureis. — *On Cassan. cortic. necnon in Abietibus.*

28. Lichen crustaceus, saxatilis, crusta tenuiori, lutea, receptaculis florum saturato-aureis.

Lichen subfuscus
Linn.

29. Lichen crustaceus, arboribus adnascens, ex cinereo-albicans, receptaculis florum crebris, subfuscis, limbo albo, crenato, cinctis.

30. Lichen crustaceus, arboribus adnascens, ex albo-subcinereus, verrucosus, receptaculis florum crebris, subfuscis, limbo albo, non crenato, cinctis.

31. Lichen crustaceus, arboribus adnascens, ex albo-subcinereus, receptaculis florum subfuscis, minus crebris.

p. 98.

32. Lichen crustaceus, arboribus adnascens, griseus, in transversalem lineam longe se diffundens, receptaculis florum copiosioribus, ac concoloribus. *Ad fagos.*

33. Lichen crustaceus, arboribus adnascens, ex albo subcinereus, receptaculis florum aureis, nudis. — *Ad Fraxinos.*

34. Lichen crustaceus, arboribus adnascens, griseus, in longam & transversalem lineam, veluti excurrans, receptaculis florum tuberculosis, nigris & tumulentibus. — *Ad fagos, & Abietes.*

35. Lichen crustaceus, arboribus adnascens, crusta tenuiori, cinereo-virescens, receptaculis florum nigris, & tumulentibus.

36. Lichen crustaceus, arboribus adnascens, pulverulentus, luteus, receptaculis florum rufis, & tumulentibus.

37. Lichen crustaceus, lignis adnascens, pulverulentus, sulphureus, receptaculis florum nigris, tumidis. — *Ad columnas ligneas.*

L. Elveloides Web. 38. Lichen crustaceus, Alpinus, lignis putridis adnascens, glaucus, receptaculis florum carneis, & tumentibus. — In dejectis, atque decorticatis Abietum truncis.

39. Lichen crustaceus, Saxatilis cinereus, crusta tenuissima, receptaculis florum luteis, exiguis.

40. Lichen crustaceus, Polline tenuissimo eleganter virenti veluti conflatus, receptaculis florum aureis.

L. Muscorum Web. 41. Lichen crustaceus, Musco plerumque innascens, polline cinereo veluti conflatus, receptaculis florum nigris.

42. Lichen crustaceus, Saxi humo adnascens, polline cinereo veluti conflatus, receptaculis florum ex rufo-fulvis.

43. Lichen crustaceus, Saxi, & arboribus adnascens, gelatinosus, & verrucosus, niger, receptaculis florum concoloribus. — In antiquis parietibus — aliquando ad fagos.

44. Lichen crustaceus, arboribus adnascens, rugosus, ex cinereo-virescens, receptaculis florum nigris, exiguis, tumidis. — Ad Pinos.

45. Lichen crustaceus, tuberculatus, arboribus adnascens, tenuissimus, ex cinereo-virescens, semina copiosissima lutea fundens, receptaculis florum concoloribus.

46. Lichen crustaceus, tuberculatus, arboribus adnascens, ex cinereo-virescens, semina lutea copiosissima fundens, receptaculis florum ex rufo-fulvis.

47. Lichen crustaceus, Saxatilis, Saturo-virens, receptaculis florum rufis. — In Edificiis antiquis.

48. Lichen crustaceus, Saxatilis, lacte virens, receptaculis florum fusco-cinereis.

49. Lichen crustaceus, Saxatilis, ex verrucis minutissimis, multifidis, atque viridibus veluti conflatus, seminibus luteis, receptaculis florum concoloribus. — ad vetustos muros.

p. 99.

50. Lichen crustaceus, Saxatilis, verrucosus, & cinereo-virescens, verrucis perexiguis, semina lutea ad latera fundentibus, receptaculis florum concoloribus. — In Maris Aqueductuum.

51. Lichen crustaceus, Saxatilis, tuberculatus, tuberculis minoribus, non cavis, viridibus, sed cum arrescunt farina veluti aspersis, receptaculis florum nigris. — In Antig. Murosum Cavernis & communis, cum sequenti oritur.

§ 2. Lichen crustaceus, saxatilis, tuberculatus, tuberculis minoribus non
cavis, viridibus, majoribus, cavis, vesicam referentibus, viridibus, sed cum
arescunt, farina veluti asperis, receptaculis florum nigris.

§ 3. Lichen crustaceus, saxatilis, farinaceus, ex albo subcinereus, recep-
taulis florum nigris, exiguis.

Lich. fagineus. L. § 4. Lichen crustaceus, arboribus adnascens, farinaceus, albus, superficie
in acetabulis pulverulentis veluti efflorescente. — Tab. 83. f. 1.

Lichen Gyssinus Scopoli § 5. Lichen crustaceus, arboribus adnascens, farinaceus, subcinereus, su-
perficie in acetabulis minoribus, pulverulentis veluti efflorescente. — Tab. 83. f. 1.

usque ad n^{um} 73. § 6. Lichen crustaceus saxatilis, farinaceus, albus, globulis minutissimis
undique refertus.

§ 7. Lichen crustaceus saxatilis, farinaceus, verrucosus, cinereus.
In muris.

§ 8. Lichen crustaceus, saxatilis, farinaceus, verrucosus, rimosus, tenui sub-
stantia, ex albo-rufescens.

§ 9. Lichen crustaceus, saxatilis, farinaceus, verrucosus, tenui substantia,
dilute luteus, & velut sulphureus.

§ 10. Lichen crustaceus, saxatilis, farinaceus, verrucosus, & granulatus,
luteus. — Tab. 83. f. 3.

§ 11. Lichen crustaceus, arboribus adnascens, farinaceus, verrucosus, &
non rimosus, luteus. — In Castanearum & Abietum corticibus.

§ 12. Lichen crustaceus, arboribus adnascens, neque rimosus, neque verru-
cosus, candidus, pulvisculo concolore undique conspersus. — Tab. 83. f. 4.

§ 13. Lichen crustaceus, saxatilis, neque rimosus, neque verrucosus, &
sulphureo virescente, pulvisculo minutissimo concolore undique consper-
sus. —

p. 100 § 14. Lichen crustaceus, saxatilis, tenuiori substantia, neque rimosus,
neque verrucosus, pulverulentus, cinerini coloris.

§ 15. Lichen crustaceus, arboribus adnascens, neque rimosus, neque
verrucosus, totus pulverulentus, griseus — In Castanearum corticibus.

§ 16. Lichen crustaceus, saxatilis, farinaceus, ex albo subcinereus,
seminibus Cereini coloris undique refertus.

67. Lichen crustaceus, saxatilis, farinaceus, mollissimus, cinereo-faucus, seminibus concoloribus repletus.

68. Lichen crustaceus, saxatilis, farinaceus, nonnihil sinuatus, ex albo-subcinereus, pulverulentus.

69. Lichen crustaceus arboribus adnascens, tenuissimus, pulverulentus, aureo colore elegantissimo, & immutabili. Ad Pinos. Alces, & columnas ligneas.

70. Lichen crustaceus, arboribus adnascens, tenuissimus, pulverulentus, pallide luteus, seu ochroleucus. — Ad fraxinos, castaneasque.

71. Lichen crustaceus, arboribus, & lignis adnascens, tenuissimus, pulverulentus, spadiceus. — Super var. arbor, caudic. & ligna.

72. Lichen crustaceus arboribus adnascens, tenuissimus, pulverulentus, griseus. — ubi n. 17.

73. Lichen crustaceus, arboribus adnascens, tenuissimus, pulverulentus, ruber. — Ad Populos.

Ordo XXXV.

III. Receptacula florum rotunda, interna parte cava, & basi superposita.

IV. Semina

Lich. Ericetorum

Lichen crustaceus, terrestris, crusta granulosa, ex albo-subcinerea receptaculis florum rotundis, carneis, pediculo insidentibus. — Tab. 89.

2. Lichen crustaceus, terrestris, crusta granulosa, ex albo-subcinerea receptaculis florum rotundis, fuscis, pediculo insidentibus. (fungilli fuscii, striptibus albis).

Pag. 101.

Ordo XXXVI.

I. Lichenes crustacei, pulmonarii, substantia coriacea.

II. Flores communis cum gelatinosa massa, comprehensa in cavitate receptaculi sphaerici.

III. Receptacula florum in substantia foliorum sunt inserta, & in eorum superficie vix apparent.

IV. Semina quae in illis plantis observari nobis contigit, ad fol. marg. occurrunt.

L. Deustus L. Lichen pulmonarius, saxatilis, & cinereo fuscus, minimus. — T. 54. f. 1.

2. Lichen pulmonarius saxatilis, minimus fulvus, foliis pulposis.

3. Lichen pulmonarius, saxatilis, sordide virescens, foliis minimis. T. 54. f. 2.
In arboribus, & vetustis muris.

4. Lichen Pulmonarius terrestris ellipticus, minimus, & indivisus, virescens.
Tab. 54. f. 3.

5. Lichen Pulmonarius Saxatilis, viridis, foliis vix conspicuis, squamatis
sibi incumbantibus, receptaculis florum nigris. — Tab. 54. f. 4. — In Panier. ver.

Ordo XXXVII.

I. Lichenes crustacei, non Pulmonarii, seu indivisi, farinacea substantia, & ex Tartaro.

II. Flores commixti ut plurimum cum massa gelatinosa, comprehensa in cavitate receptaculi sphaerici, pyriformis, transverse oblongi simplices, vel transverse oblongi multifidi.

III. Receptacula vel in plantarum superficie, vel in eorum substantia.

IV. Semina.

2. Lichen crustaceus, tartarius, lignis adnascens, niger, & veluti deustus, receptaculis florum pyramidalis, & verrucosis.

1. Lichen crustaceus, tartarius, niger, & veluti deustus, receptaculis florum crebris, rotundis. — In exiccatis, & semiparr. radic. abietum.

pp. 102. 3. Lichen crustaceus, tartarius, in arborum cavernulis proveniens, niger, & veluti deustus, receptaculis florum pyriformibus, non verrucosis. — Tab. 54. f. 1.

4. Lichen crustaceus, tartarius, arboribus adnascens, niger, & veluti deustus, receptaculis florum exiguis, inaequaliformibus. — Tab. 54. f. 4. — In ulm. caesus.

5. Lichen crustaceus, tartarius, arboribus adnascens, niger, & veluti deustus, receptaculis florum rotundis, per siccitatem nonnihil appressis, & umbilicatis. — In arb. caesus.

6. Lichen crustaceus, tartarius, arboribus adnascens, niger, & veluti deustus, receptaculis florum transverse oblongis, & intortis. — In limbo arb. caesus.

7. Lichen crustaceus, tartarius, arboribus adnascens, niger, & veluti deustus, receptaculis florum transverse oblongis, & quasi reniformibus, non intortis, brevibus. — Tab. 54. f. 2. — In Nivum cavernulis late se diffundens.

8. Lichen crustaceus, tartarius, corticibus arborum adnascens, niger, & veluti deustus, receptaculis florum transverse oblongis, compressis.

9. Lichen crustaceus, tartarius, corticibus arborum adnascens, cinereus, receptaculis florum sub cute erumpentibus, nigricantibus, transverse oblongis, varie divaricatis, & compressis.

10. Lichen crustaceus, tartarius, arboribus adnascens, ex spadiceo-fulvus, receptaculis florum sub cute erumpentibus, nigricantibus, transverse oblongis, varie divaricatis & compressis. — In cort. arb. & praecipue ad Coryloz. seg.

11. Lich. crustac. tartarius, arb. adnasc. ex spad. fulvus, receptaculis fl. in superficie nascentibus, nigris, transverse oblongis, ac varie divaricatis & compressis. T. 56. f. 3.

Lich. scriptus 2.

12. Lichen crustaceus, farinaceus, saxatilis, ex albo-roseus, receptaculis florum nigris, transverse oblongis, ramosis, & non ramosis.
13. Lichen crustaceus, tartaricus, arboribus innascens, sordide cinereus, receptaculis florum nigris, & rotundis. — In Aceribus & fagorum stipitibus.
14. Lichen crustaceus, tartaricus, arboribus adnascens, olivaceus, receptaculis florum nigris, perexiguus. — Tab. 84. f. 9. — Ad Corylos.
15. Lichen crustaceus, farinaceus, arboribus adnascens, ex albo-rufescens, receptaculis florum nigris, perexiguus. — Tab. 84. f. 6.
16. Lichen crustaceus, farinaceus, arboribus adnascens, albus, receptaculis florum rotundis, nigris, & inter se longe distantibus. — Tab. 84. f. 3.
17. Lichen crustaceus, saxatilis, farinaceus, Alpinus, aureus, & crispus, receptaculis florum rotundis, nigris.
18. Lichen crustaceus, saxatilis, farinaceus, Alpinus, ex cinereo albus, & crispus, receptaculis florum rotundis, nigris.
19. Lichen crustaceus, saxatilis, farinaceus, cinereus, receptaculis florum nigris, perexiguus.
20. Lichen crustaceus, saxatilis, minimus, valde rimosus, rimis, & veluti tessellatus, ex cinereo albicans, vulgatissimus, receptaculis florum nigris. T. 84. f. 7. — In Umbriticibus, & tectorum tegulis, necnon ad saxa ubique.
21. Lichen crustaceus, saxatilis, minimus, valde rimosus, rimis, & inferiori parte pullus, densus dum recens est, lutes-viridis, per siccitatem fuscus, receptaculis florum nigris. — Tab. 84. f. 8. — In vetustis parietibus.
22. Lichen crustaceus, verrucosus, albus, in arborum corticibus in transversalem lineam veluti excurrent, receptaculis florum in singulis verrucis pluribus.
23. Lichen crustaceus, saxatilis, verrucosus, pallidus, receptaculis florum concoloribus, & basi quadam superpositis, priusquam perbelle representantibus.

Ordo XXXVIII.

I. Lichenes fruticosi non tubulati.

III. Receptacula florum ut in ordine antecedente, sed in cauliculorum summitate locata.

IV. Semina

Lichen fruticosus, coralloides, non tubulosus, cinereus, ramosissimus, receptaculis florum sphaericis, concoloribus. — Tab. 39. f. 6. — Apud fagos.

2. Lichen saxatilis Maritimus, Muscosus, minimus, nigerrimus.

Lichen dicitur asanandis Lichenibus, seu Impetiginibus, sive quod eas ut plurimum referat.

*Musci et Michelio Descripti,
qui in Flora Pedemontana memorati non sunt.*

#109.
Michel.

1. *Muscus medius, foliis juniperinis, acutissimis, non serratis, capitulo tetragono, calyptra tomentosa, rufa.*
2. *Muscus medius foliis juniperinis, glaucis non serratis, in longum & canescentem pilum desinentibus, capitulo tetragono, calyptra tomentosa, rubra.*
3. *Muscus Major, Alpinus, foliis Juniperinis tenuissime serratis, capitulo longiori, tereti, calyptra tomentosa.*
4. *Muscus Major, Alpinus, foliis Juniperinis ^{tenuissime serratis}, capitulo longiori, tereti, calyptra tomentosa brevissima.*
5. *Muscus medius, Alpinus, ramosus, foliis Juniperinis tenuissime denticulatis, expansis, & retro-reflexis, capitulo longo tereti, calyptra tomentosa, flavascente, longa.*
6. *Muscus medius, ramosus, foliis Juniperinis, tenuissime serratis, expansis, & retro reflexis, capitulo tereti, brevissimo, calyptra tomentosa, candidante longa.*
7. *Muscus medius, foliis Juniperinis, minoribus, subrectis, brevibus, tenuissime serratis, capitulo longiori, tereti, pediculo brevi, calyptra tomentosa, longa, candidante.*
8. *Muscus medius, foliis Juniperinis, minoribus, subrectis, tenuissime serratis, capitulo tereti, in procalto pediculo, calyptra brevi, tomentosa, candidante.*
9. *Muscus minor, foliis Juniperinis, minoribus, subrectis, minus acutis, tenuissime denticulatis, capitulo tereti, pediculo brevi, calyptra tomentosa, candidante.*
10. *Muscus minimus, foliis Juniperinis, tenuissime serratis, minus acutis, capitulo exiguo, turbinato, calyptra villosa, albicante.*
11. *Muscus minor, foliis Juniperinis, minus acutis, non serratis, capitulo rotundo, calyptra tomentosa, albicante.*
12. *Muscus minimus, foliis Juniperinis, minus acutis, non serratis, capitulo rotundo, calyptra tomentosa, alba.*
13. *Muscus nanus, tuberosa radice, foliis juniperinis tenuissime serratis, capitulo magno, ovato, ventricoso, calyptra tomentosa. D. Montius.*

14. *Muscus minor*, & minus ramosus, foliis acutis, capitulis brevibus, nutantibus, pediculis longiusculis insidentibus, Calyptra striata subhirsuta, conoidea, fusca.

15. *Muscus minor*, ramosus, foliis acutioribus, magis expansis, capitulis pluribus caulibus adherentibus, quasi sine pediculis, Calyptra conoidea, striata, subhirsuta.

16. *Muscus Stellatus*, *Alpinus*, minimus, foliis Serpilli non serratis, Capitulo tenuiori, corniculato, corona non dehiscente, quatuor tantum radiis composita, operculo brevi, pyramidato, calyptra conoidea, striata, infra aperta, atque fimbriata, vel lacera. Huic propter radiorum corollae quaternum numerum in tota Muscorum classe nullus datur suppar, ideoque ab omnibus facile distinguitur.

p. 110
17. *Muscus minor*, foliis latiusculis, acutioribus, capitulis oblongis, rectis, tenuioribus, calyptra longa, conoidea, nitida, infra aperta, & coronata.

18. *Muscus Stellatus*, Serpilli folio, minor, foliis ex medio ad summum tenuissime denticulatis, capitulo singulari, nutante.

19. *Muscus Stellatus*, Polycephalus, foliis subrotundis, tenuissime serratis, costa in aculeum veluti producta, capitulis subrotundis, nutantibus.

20. *Muscus Stellatus*, parvus, foliis Myrti, tenuissime serratis, capitulo crassiore, & rotundiore, cernuo, corolla elegantissima.

21. *Muscus Stellatus*, foliis subrotundis, in peripheria neque serratis, neque nervo rubro cinctis, Capitulis. . . .

22. *Muscus Stellatus*, parvus, foliis latis, subrotundis, & undulatis, Capitulo crassiori, brevi, nutante.

23. *Muscus Alpinus*, palustris, Surculis longioribus, simplicibus, habitioribus, foliis latis, acutis, non multum expansis, ac cochlearis instar excavatis, Capitulis cylindraceis, nutantibus, in proaltis pediculis.

24. *Muscus* foliis congestis, latiusculis, acutis, in pilum brevem desinentibus, Capitulis brevibus, Pyri inversiformibus, nutantibus.

25. *Muscus Alpinus*, minor, foliis angustis, acutis, longioribus, Capitulis cylindraceis, nutantibus.

26. *Muscus palustris*, foliis congestis, pyramidalis, acutis, in pilum non, vel vix desinentibus, Capitulo tenuiore, nutante, operculo mammoso.

27. *Muscus alpinus*, minor, foliis angustis, acutis, capitulis cylindraceis, longioribus & tenuioribus, nutantibus.
28. *Muscus fontanus*, uncialis, foliis longis, angustis, juniperinis, cauliculo rubente, capitulo ovato, nutante.
29. *Muscus minor*, flavescens, in humidis proveniens, foliis capillatam tenuitatem praesefertentibus, per caulem brevibus & alernis, in summo vero crebris, & strallatum dispositis, capitulis Pyri inversiformibus, nutantibus.
30. *Muscus saxatilis minimus*, caespitosus, non lanuginosus, foliis angustis sensim in acutum productis, & retro nihil reflexis, circa fastigium albis, & fave cristallinis, capitulis ovatis, nutantibus, pediculo bilineari insidentibus, operculo in angustum, rectumque, & brevem mucronem attenuato.
31. *Muscus saxatilis minimus*, caespitosus, foliis in pilum desinentibus, capitulis sphaericis, nutantibus, pediculo bilineari insidentibus, operculo in angustum, rectumque, & longum mucronem prolongato.
32. *Muscus caespitosus*, minor, foliis brevibus, cucullatis, congestis, in longum, & canescentem pilum desinentibus, capitulis ovatis, reflexis, operculo in angustum, longumque mucronem procurrente.
33. *Muscus minor*, foliis latiusculis, expansis, acutis, capitulis Pyri inversiformibus, rectis, brevioribus, tantisper incurvatis, operculo mammoso.
34. *Muscus minor*, foliis latiusculis, capitulis Pyri inversiformibus, longioribus, & tenuioribus, erectis, parum incurvis, operculo mammoso.
35. *Muscus minimus*, foliis latiusculis, capitulis Pyri inversiformibus, saturate rubris, operculo mammoso.
36. *Muscus minimus*, caespitosus, foliis latiusculis, acutis, capitulis erectis Pyri inversiformibus, inter arscendum secundum longitudinem striatis, operculo longo, obliquo.
37. *Muscus minimus*, in humidis, & aquosis arborum cavernis nascens, foliis latiusculis, acutis, atro-virentibus, costa purpurea, capitulis erectis, Pyri inversiformibus, inter arscendum secundum longitudinem striatis, operculo longo, obliquo.

38. *Muscus Stellatus, palustris, Alpinus, major, viticulis longioribus, & habitioribus, foliis acutissimis, hamatis, unam partem tantum spectantibus, capitulo subrotundo, crassiore, eadem parte respiciente, pro alto pediculo insidente.* — Tab. 59. f. 4.
39. *Muscus Stellatus, palustris, foliis acutis, subrectis, viticulis curtis, tenuioribus, capitulis subrotundis, brevibus, unam partem spectantibus, operculo inammoso.*
40. *Muscus Alpinus, major, ramosus, foliis longis, tenuissimis, & angustissime denticulatis, capitulis sphaericis, per caulem sparsis, & plerumque ab eodem exorte geminis, breviori pediculo fulvis.*
41. *Muscus Alpinus, medius, foliis tenuissimis, & angustissime denticulatis, capitulis subrotundis, unam partem spectantibus.*
42. *Muscus minimus, foliis latiusculis, acutis, in longiusculum & tenuissimum apicem, tanquam pilum attenuatis, capitulis sphaericis, crassioribus, pediculo orbatis.*
43. *Muscus Alpinus, acaulis, foliis latiusculis, congestis, trifidis, in tres pilas (ex quibus medius longior) desinentibus, fructu magno, pyramidato, & non-nihil in nervo, corolla non fimbriata, operculo, & calyptra conoidea.*
44. *Muscus minor, foliis longioribus, crispis, tenuissime serratis, capitulo longo, falcato.*
45. *Muscus ramosus, elatior, foliis latiusculis, obtusis, expansis, & retro nonnihil reflexis, cum oris subtus repandis, costa rubente, atque in pilum album aristae more dentatam desinente, capitulis longioribus, corniculatis.*
46. *Muscus ramosus, minor, foliis latiusculis, obtusis, expansis, & retro nonnihil reflexis, cum oris subtus repandis, costa rubente, atque in lineam pilum desinente, capitulis longioribus corniculatis.*
47. *Muscus ramosus, minor, foliis latiusculis, retusis, cum oris subtus repandis, costa in cuspidem vix visibilem desinentem, capitulis corniculatis.*
48. *Muscus ramosus, minor, foliis latiusculis, obtusis, expansis, & retro reflexis, cum oris subtus repandis, costa in cuspidem sexam lined partem longam exserta, capitulis corniculatis, operculo in mucronem longius producto, calyptra brevi, subfusca veluti producta, capitulis longioribus, corniculatis.*
49. *Muscus minor, foliis angustis, undulatis, & veluti crispis, ad extremitatem ex rotunditate acuminatis, quorum costa in cuspidem sexam lined partem longam exserta, capitulis corniculatis, operculo in mucronem longius producto, calyptra brevi, subfusca.*

50. *Muscus minor, vernalis, foliis longis, crispis, & pellucidis nonnihil intortis, ac retro reflexis, paullo ultra indurata sua, sensim in acutum productis, ac deinde in aculeum veluti prolongatis, capitulis corniculatis, operculo, & calyptra brevibus.*

51. *Muscus saxatilis, cespitosus, minor, glaucus, & veluti argenteus, foliis congestis, crassis, exiguis, obtuse mucronatis, superne planis, inferne hinc inde ad costam duntaxat aliquantisper sulcatis, in pilum duplo, vel triplo longiorem desinentibus, capitulis corniculatis, corolla brevi, operculo productiore.*

52. *Muscus minimus, quatuor lineas altus, foliis latiusculis, brevibus, ac retusis, in pilum perbreve desinentibus, capitulis corniculatis.*

53. *Muscus minor, foliis latiusculis, circa medium paululum dilatatis, ad extremitatem ex rotunditate acuminatis, atque in brevissimam cuspidem, tanquam pilum terminatis, capitulis longioribus, corniculatis, per siccatem simul cum pediculis atris.*

54. *Muscus minor, foliis latiusculis, brevibus, subrotundis, capitulis corniculatis, operculo in longiusculum, & curvulum mucronem attenuato.*

55. *Muscus minor, foliis latiusculis, circa medium paululum dilatatis, ad extremitatem ex rotunditate acuminatis, & in cuspidem vix perceptibilem, tanquam pilum terminatis, capitulis longioribus, corniculatis.*

p. 112.

56. *Muscus minor, foliis latiusculis, brevibus, circa medium dilatatis, ad extremitatem ex rotunditate acuminatis, atque in perbreve, & vix visibilem cuspidem, tanquam pilum terminatis, capitulis corniculatis, per maturitatem simul cum pediculis aureis.*

57. *Muscus minimus, tertiam unciæ partem altus, foliis latiusculis, brevibus, circa medium dilatatis, ad extremitatem ex rotunditate acuminatis, atque in perbreve cuspidem, tanquam pilum terminatis, capitulis ovatis, fuscis, corolla non expansa, pyramidata.*

58. *Muscus minimus, tertiam unciæ partem altus, foliis latiusculis, brevibus, circa medium dilatatis, ad extremitatem ex rotunditate acuminatis, atque in perbreve, & vix conspicuam cuspidem, tanquam pilum terminatis, capitulis ovatis, operculo brevi, instructis.*

59. *Muscus minimus, semiuncialis, & forte annuus, foliis latiusculis circa medium, ad extremitatem ex rotunditate acuminatis, costa in brevissimum, tenuissimumque ^{veluti} pilum prolongata, capitulis ovatis operculo statim brevior, & curvulum mucronem coarctato.*

60. Muscus minimus, tres lineas altus, foliis latiusculis, non expansis, concavis, in cuspidem longiusculam, tamquam aristam prolongatis, Capitulo non coronato, brevi, fusco, operculo longiore, sensim in acutum fastigiato.

61. Muscus minimus, tres lineas altus, foliis latiusculis, brevissimis, concavis, ac congestis, in pilum longiusculum desinentibus, capitulo ovato non coronato, operculo statim in brevius atque incurvum corniculum coarctato.

62. Muscus minimus, tres lineas vix altus, & forte annuus, foliis latiusculis, acutis, in pilum perbreve desinentibus, capitulis ovatis, fuscis, operculo brevissimo, pyramidato.

63. Muscus minimus quatuor lineas altus, pallide vivens, foliis longis, angustis, sensim in acutum ^{non} productis, capitulis longiusculis, non coronatis, fuscis, operculo in longum, & angustum mucronem sursum exsertum coarctato.

64. Muscus minimus quatuor lineas altus, pallide vivens, foliis longis angustis, sensim in acutum productis, quod per siccitatem crinidum retortorum instar crispantur, capitulis ovatis, non coronatis, fuscis, operculo in longiusculum corniculum attenuato.

65. Muscus saxatilis, minimus, tres lineas altus, foliis non multum expansis, pyramidatis, & fere triangularibus, cochlearis instar excavatis, atque in pilum longum acutis, nec non per siccitatem surculum teretem cupressi instar efficientibus, capitulis ovatis, calyptra brevissima parum & varie dehiscens, operculo cum mucrone brevissimo.

66. Muscus ramosus ex viridi flavescens, vulgarissimus, foliis longis, angustis, crispis, sensim in acutum productis, magis expansis, & deorsum reflexis, quod per siccitatem crinidum retortorum instar crispantur, capitulis oblongis corniculatis.

67. Muscus ramosus ex viridi flavescens, minimus, foliis angustis, crispis, sensim in acutum productis, magis expansis, & retro reflexis, quod per siccitatem etiam crinidum retortorum instar crispantur, capitulis tenuioribus, corniculatis.

68. Muscus Alpinus, ramosus, ex viridi flavescens, foliis crispis, longis, & angustis, sensim in acutum productis, expansis, & retro reflexis, quod per siccitatem crinidum retortorum instar pulchre crispantur, capitulis longioribus, corniculatis.

69. Muscus pallide vivens, foliis longioribus, tenuissimis & acutissimis, eduntis, & unam partem spectantibus, capitulis brevibus, tenuioribus, erectis. In pediculis, aureis, & capillaceis pediculis, calyptra longissima operculo conoideo.

p. 112.

70. *Muscus Alpinus*, pallide virens, foliis tenuissimis, aduncis, & unam partem spectantibus, capitulis curvulis, & veluti pendulis, pediculis altioribus, insidentibus, breviter coronatis.

p. 113.

bis 70. *Muscus Alpinus*, minor, cujus portio caulis vestita, magis reclinata, foliis capillaceis, acutis, aduncis, & uno versu dispositis, capitulis erectis, tenuioribus, operculo longo sursum exserto.

71. *Muscus minimus*, sericeus, pallide virens, foliis crebris, capillaceis, longioribus, acutissimis, nonnihil aduncis, & uno latere spectantibus, capitulis curtis, gibbis, breviter coronatis, calyptra leucophylla, operculo curto & curvulo. Corollis, corolla brevi, operculo

72. *Muscus minimus*, semiuunciam circiter altus, foliis crebris, capillaceis, longioribus, acutissimis, aduncis, & uno latere spectantibus, capitulis curtis, gibbis, breviter coronatis, operculo curto & curvulo.

73. *Muscus minimus*, semiuunciam circiter altus, foliis capillaceis, variis dispositis, acutissimis, nonnihil aduncis, ex uno latere spectantibus, capitulis gibbis, breviter coronatis, operculo curto, curvulo.

74. *Muscus minor Alois facie*, late virens, & quasi lucidus, foliis pyramidalis, floribus in superua parte undique ornatis, quarum latera in medio ita arcte, & valde desuper complicata, ut unum alteri coeant, capitulis corniculatis, calyptra brevi, subfusca. Tab. 89. f. 6.

75. *Muscus Alpinus*, Saxatilis, uncialis, & sexquiuuncialis, plerumque non ramosus, foliis expansis, angustis, undulatis, atque in obtusam cuspidem terminatis, capitulis exiguis, curvulis, curto pediculo natis, breviter coronatis, operculo in longum mucronem procurrente.

76. *Muscus minor*, ramosus, parvus, in humidis nascent, atro-viridis, foliis subrectis tenuissimis, & latiuscula basi sensim in acutissimum apicem attenuatis, capitulis corniculatis, brevibus, erectis, operculo, mucrone longo, & angusto instructo.

77. *Muscus ramosus*, parvus, sordide luteus, ad fulvum colorem tendens, foliis angustissimis, & lata basi sensim in acutissimum apicem attenuatis, capitulis corniculatis brevibus, erectis, tenuioribus, operculo cum mucrone pyramidato adunco, calyptra brevi subfusca.

78. *Muscus ramosus*, parvus, foliis brevibus, expansis, & lata basi sensim in acutum apicem attenuatis, capitulis corniculatis, operculo in longum mucronem producto.

79. *Muscus parvus, ramosus, Alpinus, foliis angustissimis, magis expansis & lata basi sensim in acutissimum apicem attenuatis, nonnihil undulatis, per siccitatem etiam eleganter crispantibus, capitulis corniculatis, operculo in longum mucronem attenuato, calyptra brevi.*

80. *Muscus parvus, ramosus in humidis nascent, foliis expansis, crispis, brevibus, & lata basi sensim ad extremitatem in minus acutam cuspidem attenuatis, capitulis erectis, corniculatis, breviter coronatis, operculo simul cum subfusca calyptra brevibus.*

81. *Muscus minor, terrestris semiviviparus, albus, foliis subrectis, non expansis, brevibus, & lata basi sensim ad extremitatem in minus acutam cuspidem attenuatis, capitulis corniculatis, operculo in longum mucronem exserto, calyptra brevi.*

82. *Muscus minor Terrestris, luteo-viridis, foliis oblongis, crispis, costa rubente, & lata basi sensim in minus acutum apicem attenuatis, capitulis longis, corniculatis, operculo, & calyptra longioribus.*

83. *Muscus Cespitosus minor, luteo-viridis, foliis brevibus, subrectis, & lata basi sensim in acutum minus, & sursum reflexum apicem attenuatis, capitulis erectis, curvis, corniculatis, corolla, operculo, & calyptra brevibus.*

84. *Muscus minor Cespitosus, densissimus, foliis equis, creberrime dispositis, & lata basi sensim in minus acutum apicem attenuatis, capitulis ovatis, operculo, & calyptra brevibus.*

85. *Muscus minimus, quatuor lineas altus, densissimus, tapeti instar per magnam tractum terram operiens, foliis creberrimis omnium brevissimis, & lata basi sensim in minus acutum apicem attenuatis, capitulis erectis, oblongis.*

p. 114.

86. *Muscus alpinus pennatus, vertebrae Piscium referens foliis capillarem tenuitatem & quantibus, capitulis corniculatis.*

87. *Muscus Pennatus Aquaticus, ramosissimus, Linariae folio, capitulis.....*

88. *Muscus Pennatus Aquaticus, ramosus, Strogosus, foliis brevibus, acutis, Capitulis.....*

89. *Muscus Pennatus, omnium minimus, capitulis in humilitate caulis erectis.*

90. *Muscus filicifolius, non ramosus, unicum longus, Capitulis incurvis, circa mediam costam egredientibus.*

91. *Muscus pennatus, repens, foliis Myrti, costa ferme carentibus, ex una parte caulis perinde tendentibus, ex altera quoque versum, Capitulis. . .*
92. *Muscus apocarpus hirsutus, saxi adnascens, foliis acutissimis, non multum expansis.*
93. *Muscus Alpinus, viticulis longis, bifurcatis, foliis acutis, deorsum reflexis, capitulis e surcalorum apicibus egredientibus*
94. *Muscus Alpinus, viticulis longis, bifurcis, procumbentibus, foliis acutis, hamatis, & unam partem spectantibus, ad ramulorum summitatem in apice flores proferentibus, Capitulis. . . . Tab. 89. f. 3.*
95. *Muscus aquaticus, ramosus, atro-virens, foliis oblongis, latiusculis, expansis, obtuse mucronatis, ac cum limbo subius repando, capitulis cylindraceis, in foliorum alis sine pediculis, dupliciter, & pulchre coronatis.*
96. *Muscus squamosus, erectus, palustris, albicans, & siccifragosus, capitulis subrotundis, absque pediculis.*
97. *Muscus squamosus, Aquaticus, Hollandicus, longissimus, & fluviatilis, foliis expansis, longioribus, subtilissimis, Capitulis. . .*
98. *Muscus squamosus Filicinus, repens, atro-virens, crispus, ramulos Abietis maris, conis onustos perbelle referens, foliis minimis subrotundis, creberrimis, ex una parte caulis appressis, altera expansis, Capitulis oblongis, erectis, pediculis quasi orbatis, calyptra subhirsuta.*
99. *Muscus squamosus, pennatus, aquaticus, ramulis confertis, foliis acutissimis, crebris, pulchre deorsum obvolutis, & unum latum spectantibus, capitulis incurvis, pediculis altioribus, insidentibus, operculo brevi.*
100. *Muscus squamosus, pennatus, Aquaticus, foliis longiusculis, acutis, unam partem spectantibus, capitulis incurvis & nonnihil aduncis, capitulis. . . .*
100. *Muscus squamosus, Pennatus, aquaticus, foliis acutissimis, crebris, pulchre deorsum obvolutis, & unam partem spectantibus, capitulis incurvis, longis pediculis insidentibus.*

102. *Muscus squamosus*, palustris, viticulis crassioribus, foliis angustis, acutissimis, aduncis, & unum latum spectantibus, capitulis brevibus, habitioribus, incurvis, operculo turbinato, brevissimo.
103. *Muscus squamosus*, minor, viticulis crassioribus, brevibus, foliis acutissimis, deorsum reflexis, & unum latum spectantibus, capitulis oblongis, curvulis, operculo acuto.
104. *Muscus squamosus albicans*, viticulis longis, compressis, tenuioribus, foliis acutissimis, aduncis, & unum latum spectantibus, capitulis brevioribus, habitioribus, nonnihil incurvis, alioribusque pediculis insidentibus, operculo brevi, firmo, acuto.
105. *Muscus squamosus*, viticulis non pennatis, tenuioribus, foliis acutissimis, unum latum spectantibus, & sursum reflexis, capitulis oblongis, parum incurvis, operculo brevi.
106. *Muscus squamosus, Alpinus*, foliis acutissimis, unum latum spectantibus, & deorsum reflexis, capitulis oblongis curvulis.
107. *Muscus squamosus*, aquaticus, longissimus, & ramosissimus, atro-virens, foliis longis, angustis, falcatis, & unum latum spectantibus, capitulis crassioribus, incurvis, brevibus pediculis insidentibus.
- p 115. 108. *Muscus squamosus*, ramosus, palustris, minor, viticulis tenuioribus, foliis acutis, concavis, ex una parte caulis sursum, ex altera deorsum spectantibus, capitulis incurvis, operculo brevissimo.
109. *Muscus squamosus*, aquaticus, atro-virens, viticulis tenuioribus, foliis brevibus *Mijrei*, costa donatis, obuse mucronatis, concavis, ex una parte cauli nonnihil appressis, altera magis expansis, & subrectis, capitulis
110. *Muscus squamosus* Aquaticus, atro-virens, viticulis longis, tenuioribus, foliis hincatis, angustis, & unam partem spectantibus, capitulis incurvis.
111. *Muscus squamosus*, ramosus, elatior, sordide virescens, foliis *Rusci*, striatis, & expansis, capitulis incurvis, operculo brevissimo, mammoso.
112. *Muscus squamosus*, minor, viticulis crassioribus, foliis *Rusci*, capitulis incurvis, operculo cum mucrone longo & aduncis.
113. *Muscus squamosus*, terrestris, minimus, foliis expansis, capitulis incurvis, operculo brevi.

114. *Muscus Squamosus*, minor, sordide luteus, foliis Ruscii, brevibus, concavis, & striatis, non multum expansis, tenuissime denticulatis, capitulis incurvis, brevibus, operculo cum mucrone longo, & angusto.

115. *Muscus Squamosus*, minor repens, ramulis confertioribus, foliis Ruscii, costulatis, tenuissime denticulatis, & admodum expansis, capitulis incurvis, operculo cum mucrone longiore.

116. *Muscus Squamosus*, repens, minor, surculis confertioribus, aduncis, foliis Ruscii, striatis, capitulis incurvis, operculo in angustum & acutum mucronem producto.

117. *Muscus Squamosus*, minimus, surculis densioribus, pennatis, foliis Ruscii, striatis, ac tenuissime denticulatis, & admodum expansis, capitulis incurvis, operculo in longum mucronem producto.

118. *Muscus Squamosus*, repens, minimus, serici modo luens, foliis oblongis, tenuissimis, & lata basi sensim in acutissimum apicem attenuatis, atque ex una parte caulibus appressis, altera vero expansis, capitulis longioribus, operculo in longum mucronem procurrente.

119. *Muscus Squamosus* repens omnium minimus, atro-virens, non splendens, foliis oblongis, tenuissimis, & lata basi sensim in acutissimum apicem attenuatis, atque ex una parte caulibus appressis, altera vero expansis, capitulis incurvis, operculo in longum mucronem producto.

120. *Muscus Squamosus*, aquaticus, parvus, viticulis crassioribus, brevibus, foliis concavis, latis, obtuse mucronatis, & quasi rotundatis, capitulis subrectis, operculo in longum mucronem producto.

121. *Muscus Squamosus*, minimus, viticulis brevioribus, teretibus, semi-unciam circiter longis, foliis Myrti, concavis, capitulis crassioribus, nonnihil incurvis, operculo in angustum mucronem longius producto.

122. *Muscus Squamosus*, Aquaticus, repens, surculis Cyperidinis, foliis pyramidalis, acutis, capitulis parvis, curvulis, operculo brevi sensim in acutum producto.

123. *Muscus Filicifolius*, non ramosus, unciam longus, capitulis incurvis, mediam costam egredientibus

124. *Muscus Squamosus*, ramosus, repens, surculis, foliis, colore varians, capitulis incurvis, operculo in longiusculum mucronem attenuato.

125. *Muscus squamosus*, repens, ramulis confertioribus, Cupressinis, foliis triangularibus, brevibus, & concavis, capitulis incurvis, operculo mucrone longiusculo insignito.

126. *Muscus squamosus*, minimus, surculis brevibus, plerumque simplicibus, tenuioribus, foliis acutissimis, capitulis oblongis, subrectis, curvulis, operculo brevissimo.

p. 116.

127. *Muscus Alpinus*, squamosus, strigosus, erectus, luteo-viridis sericeus, foliis e lata basi sensim in acutissimum apicem attenuatis, Capitulis

128. *Muscus squamosus*, minimus, viticulis tenuissimis, brevibus, foliis e lata basi sensim in acutissimum apicem attenuatis, capitulis incurvis, operculo brevissimo.

129. *Muscus squamosus*, minimus, viticulis capillaribus, parvis, & inordinate divisis, foliis e latiuscula basi sensim in acutissimum apicem attenuatis, capitulis incurvis, operculo brevissimo.

130. *Muscus squamosus*, pennatus, surculis Cupressinis, parvis compressis, foliis pyramidalibus, concavis, obtuse mucronatis, in ramulorum extremitatibus ita invicem implexis, ut veluti rigidum, & obtusiusculum aculeum efficiant, Capitulis

131. *Muscus squamosus*, fruticosus, aquaticus, atro-virens, valde compressus, foliis utrinque tendentibus, oblongis, obtuse mucronatis, & a medio ad summum tenuissima denticulatis, Capitulis

132. *Muscus squamosus*, aquaticus, fluctans, viticulis longissimis, compressis, foliis Ruscii, acutis, costa donatis, capitulis incurvis, operculo brevissimo, mammoso.

133. *Muscus squamosus*, repens, caulibus compressis, foliis Ruscii minus acutis, capitulis incurvis, operculo in tuncem & longiusculum mucronem attenuato.

134. *Muscus squamosus*, repens, minor, caulibus compressis, foliis angustis, capitulis incurvis, operculo in longum mucronem producto.

135. *Muscus squamosus*, minor, repens, viticulis compressis, foliis Ruscii, concavis, in acutum apicem attenuatis, capitulis incurvis, operculo in longiusculum mucronem exacto et tuncem mucronem prolongato.

136. *Muscus squamosus, minimus, repens, viticulis compressis, foliis angustis, sensim in acutum productis, capitulis brevibus, incurvis, operculo in longiusculum mucroneum exprorecto.*

137. *Muscus squamosus, minimus, viticulis pennatis, foliis brevibus, pyramidatis, hinc inde tendentibus, capitulis incurvis, operculo in longiusculum mucroneum prolongato.*

138. *Muscus squamosus, minimus, viticulis pennatis, foliis longiusculis utrinque tendentibus, pyramidatis, capitulis incurvis, operculo in longiusculum mucroneum attenuato.*

139. *Muscus squamosus, minimus, caulibus compressis, plerumque simplicibus, foliis angustis, acutissimis, capitulo incurvo, operculo in acutum & longiusculum mucroneum prolongato.*

140. *Muscus squamosus, ramosus, repens, ramulis Cyperpinis, aduncis, foliis oblongis, pyramidatis, concavis, capitulis brevissimis, rectis, longis pediculis insidentibus.*

141. *Muscus squamosus, repens, surculis densioribus aduncis, Myosuricoidis, foliis acutissimis arctis vestitis, capitulis oblongis, rectis.*

142. *Muscus squamosus, aquaticus, viticulis longissimis, chordam muscicam minorem representantibus, foliis pyramidatis, acutis, costa donatis, Capitulis. . . .*

143. *Muscus squamosus, alpinus, repens, viticulis tenuissimis, teretibus, foliis longiusculis, subrectis, pyramidatis, peracutis, capitulis oblongis sursum exprorectis, operculo brevissimo, acuto.*

144. *Muscus squamosus, repens, surculis tenuissimis, foliis Rusci, angustioribus, Capitulo oblongo, erecto, operculo brevissimo, mammoso.*

145. *Muscus squamosus, repens, perexiguus, viticulis capillaribus, foliis Rusci, in acutissimum, & longiusculum apicem tanquam pilum prolongatis, capitulis rotundis, operculo brevissimo, mammoso, pediculo sexquilineari insidente.*

146. *Muscus Squamosus*, *Alpinus*, viticulis procumbentibus, plerumque indivisis, foliis unam partem spectantibus, capitulis erectis, brevibus pediculis insidentibus.

147. *Muscus Squamosus minor*, *Alpinus*, raxens, surculis tenuioribus, foliis concavis, triangularibus, unam partem spectantibus, capitulis oblongis, erectis, operculo cum mucrone brevi, acuto.

148. *Muscus Pennatus*, *Splendens*, *arboraeus*, *minor*, capitulis erectis, brevissimo pediculo fultis.

149. *Muscus Squamosus*, *argenteus*, *surculis* *Cypripodinis*, brevibus, ut plurimum indivisis, capitulis tres lineas longis, falcatis, & veluti pendulis, Cucurbitam longam representantibus, operculo brevissimo, mammoso.

Alga. *Marchantia*

Marchantia

Polytrichum
Linn.

1. *Marchantia major*, Capitulo stellato, radiis teretibus, capsularum seminatum crenis in longiusculum veluti pilum desinentibus. flor. aurum. Tab. 1. f. 1.

2. *Marchantia* Capitulo stellato, radiis teretibus. In ambulantibus hortorum, & ad umbrosos, atque humidos parietes. Tab. 1. f. 2.

3. *Marchantia* foliis in medio atris, & non tepelatis, capitulo stellato, radiis teretibus. Tab. 1. f. 3.

4. *Marchantia* capitulo eleganter dissecto, radiis ad extremitatem complanatis, & infra cochlearis instar excavatis. — In Aquarum stillicidiis. Tab. 1. f. 4.

5. foliis intense glaucis, capsulis atris crenatis, capitulis, ut jam diximus, a reliquis suis speciebus facile dignoscitur.

Var. γ *Prodr.*

5. *Marchantia* Capitulo non dissecto. Circa fofas udas, ad aquar. Tab. 1. f. 5.
scaturigines, &c.

Hepatica

March. conica L.

1. *Hepatica vulgaris*, major, vel officinarum Italica. Ad font. scaturigines. Tab. 2. f. 1.

M. hemisphaerica
Lin.

2. *Hepatica media*, capitulo hemisphaerico. In pariet. & sax. superficie, locis Septentr. respicientibus, atque etiam ad umbros. fof. margines. Tab. 2. f. 2.

*Marchantia
androgyna* Linn.

3. *Hepatica minor, angustifolia, capitulo hemisphaerico. Inter muscos, & saxorum crepidines.* Tab. 2. f. 3.

Lunularia - pag. 4. Michel.

March. cruciata
Lin.

1. *Lunularia vulgaris*. - In humidis locis & fossarum aggeribus, & in spaciis hortorum ambulatoris ubique copiosissima, raro florentem reperitur.

Lunularia dicitur a fructu Luna nascentis, vel decedentis modo falcato.

Marsilea pag. 5. Michel

*Jungermannia
Epiphylla* L.

1. *Marsilea major, atro-virens, floribus albicantibus, e foliorum medio egredientibus.* T. 4. f. 1.
Iisdem in locis ubi *Marchantia* 5 reperitur, aliisque similibus locis quoque frequ.

*Jungermannia
Pinguis* Lin.

2. *Marsilea media, pinguis, pallide-virens, floribus majoribus, nigricantibus, e foliorum latera egredientibus.* - Ubi Suprascripta. T. 4. f. 2.

3. *Marsilea terrestris, minima, foliis sinuatis, floribus nigricantibus, e foliorum lateribus provenientibus.* - In umbrosis, & humidis foss. aggeribus. T. 4. f. 3.

Junag. furcata
L.

4. *Marsilea minima, angustifolia, floribus nigricantibus ex inferiori foliorum parte a subhirsuta, & turbinata vagina erumpentibus.* - In umbrosis nemoribus arborum caudices circumvestiens, post diuturnam pluviam per annum vegetat, ac floret. T. 4. f. 4.

pag. 6.

5. *Marsilea terrestris, minima, angustifolia, nigricans, flore sparsis.* T. 4. f. 5.

Marsilea dicitur a Comite Alojsio Ferdinando Marsilio Bononiense.

Jungermannia

*Minium
Jungermannia*
Lin.

1. *Jungermannia Alpina, palustris, purpurea, Cambria, foliis rotundioribus, auritis, tenuissime denticulatis.* T. 5. f. 16.

pag. 7.

*Jungermannia
numerosa*
Lin.

2. *Jungermannia numerosa, foliis acutioribus, auritis, tenuissime denticulatis, flore insidente pediculo breviori.* T. 5. f. 8.

3. *Jungermannia Alpina, lupina, foliis acutioribus, auritis, tenuissime denticulatis, flore insidente pediculo breviori.* - In rivulis.

pag. 7. michel.

Ordo II.

Jungermannia *coniplanata* L. *Jungermannia* foliis circinnatis, auritis, imbricatione dispositis, ex T. S. f. 21.
viridi flavescentibus. — In caudicibus arborum, & sepiariis plantis.

Jungermannia *asplenoides* Linn. B. *Jungermannia* major, foliis subrotundis, tenuissime denticulatis T. S. f. 1.
Ad aquarum rivulos, necnon in umbrosis sylvis ad arborum radices.

2. *Jungermannia* major, altera, foliis subrotundis, tenuissime denticulatis. T. S. f. 2.

Jungermannia *trilobata* Lin. *Jungermannia* foliis latiusculis, obtusis, undulatis, & veluti angulosis. — Circa fossas udas sub nemorum umbris, sicut etiam in apricis eructis. T. S. f. 10.

pag. 8.

2. *Jungermannia* *Alpina*, foliis subrotundis, latiusculis, angulosis. T. S. f. 11.

1. *Jungermannia* Major foliis brevioribus, & obtusioribus, non denticulatis. — Ad arbores. T. S. f. 3.

2. *Jungermannia* foliis oblongis, acuminatis. — Ex Anglia.

J. Viticulosa L. 3. *Jungermannia* terrestris, viticulis longis, foliis parvis, densissimis, ex rotunditate acuminatis. T. S. f. 4.
Ad saxa, sub umbris, & in eorum cavernis cum Lingua Cervina provenit.

J. Polyantha L. 4. *Jungermannia* palustris, repens, foliis subrotundis, densissimis, late virentibus ex rotunditate acuminatis. T. S. f. 5.

J. Lanceolata 5. *Jungermannia* palustris, minima, repens, foliis subrotundis, densissimis, late virentibus.

6. *Jungermannia* palustris, omnium minima, foliis subrotundis, densissimis, late virentibus. T. S. f. 7.

Jung. Varia L. 1. *Jungermannia* repens foliis cordatis, carinatis. Per Cassane T. S. f. 9.
arum Sylvas, & ad earum radices.

Mnium *fissum* 2. *Jungermannia* terrestris, repens, foliis ex rotunditate acuminatis, bifidis, apertura pene visibili. — Ad arborum radices in sylvis, necnon in fossarum aggeribus. T. S. f. 14.

J. Bidentata L. 3. *Jungermannia major*, repens, foliis bifidis.

T. 5.
f. 12.

4. *Jungermannia minor* repens, foliis subrotundis, bifidis, vagina florum cylindracea. In Sylvanum foveis ad umbras.

T. 5. f. 13.

J. Bicuspidata L. 4. *Jungermannia minima*, repens, foliis bifidis, vagina florum cylindracea.

T. 6. f. 17.

5. *Jungermannia minima*, repens, foliis bifidis, vagina florum ventricosa. — Ipsa planta duplo minor est, quam exprimat icon. — ubi antecedens, & in Scilicidii's

T. 5. f. 13.

in Appendice

Jungermannia Alpina, viticulis tenuioribus, pinnatis, foliis quadratis, ac tridentatis, perexiguis. — Ad Arbores.

pag. 9.

Jungermannia minima foliis auritis, ex rotunditate acuminatis, flore nigricante, vagina cylindracea. T. nemora.

T. 6.
f. 18.

2. *Jungermannia minima*, foliis auritis, ex rotunditate acuminatis, punctatis, ac veluti perforatis, floribus virescentibus, vagina cordiformi. — Ad Arborum radices.

T. 6.
f. 19.

3. *Jungermannia omnium minima* seu vix conspicua, Serpylli, aut Herniariae foliis, auritis, floribus ex albo-virescentibus, vagina cordiformi. — Plantula duplo minor est Icone. — p. arbores.

T. 6. f. 20.

Jungermannia a D. Ludovico Jungermannno. Auctore. Car. horri Medici Altdorfini editi Altdorfii anno 1662. & 1677.

Muscoides

Muscoides squamosum, saxatile, maximum, compressum, ex obscuro virescens, foliis subrotundis nonnihil denticulatis. In opacis.

T. 6. f. 1.

2. *Muscoides squamosum*, majus, atro-virens, foliis subrotundis. In silvis per arborum caudices, & in vetustis parietibus, opacisque locis.

T. 6. f. 3.

3. *Muscoides squamosum*, medium, rotundifolium, atro-virens.

T. 6. f. 4.

Jung. Tamarisci 4. *Muscoides squamosum*, saxatile, nigro-purpureum, involucris angustioribus, foliis circinatis, minoribus. Ad arbores, & ad saxa.

T. 6. f. 5.

Muscoides minimum, foliis alternis, superioribus circinatis, inferioribus cucullatis, flore pediculo femine carente. In arbor. T. 6. f. 6.
Caudicibus &c.

Muscoides terrestre, repens, ex obscuro-virescens, foliis superioribus, & inferioribus ad extremitatem dentatis. Per margines, & aggeres viarum. T. 6. f. 2.

Targionia pag. 3. Michel.

Targionia minima & vulgaris.

Tab. 3.

Lichen parvus, minimus, fructu orobi. C. B. Pin. 362.
In ericetis, nec non in muscosis locis, & ad Sylvarum margines.

Targionia a Doct. Cypriano Targionio Florentino
Academico Botanico Vede.

Spherocharpos pag. 4. Michel.

Spherocharpos terrestris minima In hortis in hieme, et T. 3. primovere.

Spherocharpos dicitur a σφαῖρα Sphæra & χάρπος fructus, quasi dicatur fructus sphaericus.

Anthoceros pag. 10. Micheli:

Anthoceros major. In ambulationis plerumque umbrosis, & in fossarum aggeribus. T. 7. f. 1.

2. *Anthoceros minor*, foliis magis carinatis, atque eleganter crenatis, subus incurvatis. In Sylvis ericetis, & m. loca T. 7. f. 2.

Anthoceros dicitur a ἄνθος flos, & κέρας cornu, quasi dices florem corniculatum.

Glasia

Glasia pusilla. *Glasia pusilla*, *Lichenis pyxidati* facie. Ad Scaturigines aquarum. T. 7.
Linn.

Glasia dicta est a R. Patri Glasio Biagi congregationis Vallis-
-umbrosæ Monacho, Botanico non gregario, &c.

pag. 15.

Lenticula

Lent. dicitur, quod folium sit lenticulae forma.

- Lemna gibba* L. 1. *Lenticula palustris*, major, inferne magis convexa, fructu polyspermo. T. 11. f. 1.
2. *Lenticula palustris*, media, pallide virens; inferne minus convexa, T. 11. f. 2.
radicibus longissimis, fructu dispermo.
3. *Lenticula palustris*, minima, atro-virens, utrinque pene convexa. T. 11. f. 3.

Lenticularia pag. 16.

Lent. dicitur quasi planta ad Lenticulam accedens.

- Lemna polyrrhiza* L. 1. *Lenticularia* major, polyrrhiza, inferne atro-purpurea. In fossis stagn. T. 11. f. 1.
2. *Lenticularia* media, monorrhiza, foliis oblongis, utrinque viridibus. T. 11. f. 2.
ubi antecedens.
3. *Lenticularia* minor, monorrhiza, foliis subrotundis, utrinque viridibus. T. 11. f. 3.
In aquarum receptaculis.
4. *Lenticularia* omnium minima, arrhiza. In piscinis.
Lemna trisulca L. 5. *Lenticularia* ramosa, monorrhiza, foliis oblongis, pediculis lon- T. 11. f. 5.
-gioribus donatis. In fossis lutulentis tam stagnantium, quam la-
bentium aquarum.

Montia

a Doctore Josepho Monti Mononicensi Botanices Professore &c.

Montia aquatica, major. — In udis & circa lacunas & pifinas. T. 13. f. 1.*M. fontanal.* 2. *Montia aquatica, minor.* — *Portulaca arvensis.* C. B. pin. 288. T. 13. f. 2.

ord. 1. & 11.

Riccia

pag. 106. Michel.

fructu e rimis foliorum surgente, & supra acuminem foliorum planum se extollente

Riccia major, coriandri Sapore, foliorum superficie, veluti tefe. T. 57. f. 1.
lata, fructu subrotundo, aspero. — In herbidis montosis ab autumno
usque ad Ver viget.2. *Riccia media*, obscure-virens, foliis alius Sulcatis, in Superf. T. 57. f. 2.
cie veluti punctatis, fructu pyramidato, glabro. — Inter muscos.

Fructu in foliorum substantia contento.


Riccia minor, latifolia, pinguis, aspergine Cristallina perfusa. T. 57. f. 3.
Mrunali, atque Vernali tempore in urbanis hortis ubique, & ita copiose
crescit ut ab hac hortulani, & floricultores abhorreant.*R. Glauca.* 2. *Riccia minima*, pinguis, foliis latiusculis, ample Sulcatis, & T. 57. f. 4.
glauco-virescentibus. Autumnas germinare incipit, & usque ad totam
Hyemem, & initio veris Viget.3. *Riccia minima*, glauca, segmentis angustioribus, ad margines pili- T. 57. f. 5.
latis. In liminibus vicarum.*R. Minima.* 4. *Riccia minima*, nitida, segmentis angustioribus, acutis. T. 57. f. 6.*R. Chrysellina.* 5. *Riccia minima*, pinguis, aspergine Chrysellina perfusa. T. 57. f. 7.
In Sylvis.6. *Riccia minima*, angustifolia, cinericia, segmentis crispis, non T. 57. f. 8.
Sulcatis. In Sylvis.7. *Riccia minima*, segmentis brevioribus, & obtusioribus, ample T. 57. f. 9.
Sulcatis. Ab autumno usque ad Aprilem inensem germinat in sylvis
si tellus a frequenti Pluvia madefiat.*Riccia* ab Off. & cl. Riccio Senatore &c. Pisano Acad. Auditore
& Soc. Bot. florent. Socio. &c. &c.

Salvinia

Tab. 68.

Marsilea natans. *Salvinia Vulgaris*, aquis innatans, foliis subrotundis, punctatis, lente virentibus. In fossis paludosis, tam stagnantibus, quam lente fluentibus.

Salvinia a Doctissimo ac Celeberrimo Antonio M.^o *Salvinio* patricio florentino valde a Cl. *Micheli* Laudato.



1841

Received of the Hon. the Secy of the Navy
the sum of \$1000.00 for the purchase of
land.

Witness my hand and seal this 1st day of
January 1841.

John C. Smith


Secretary of the Navy


Washington

1841


1841


1841































































































































































Marchantia pag. 138.

Tab. 1.



Hepatica p. 138.

Tab. 2.



Marsilea

Tab. 4.



fig. 1.

















fig. 2. eadem ut f. 1.






16
Minium jungermannia L.

14
Minium fipum L.



Targionia


Tab. 3



Sphaerocarpos





B ● C ● D ●



Blasia pusilla

Tab. 7.

Fig. 1



2






Fig. 1




Lenticula

2




3




Lenticularia


Fig. 1




2



3



5



4



Fig. 1.



2





Fig. 1.




Tab. 57


2.




3




4.




5.




6



7




8





9






1727










ordo-I.

Tab. 88.

fig. 1.
Clavaria
hypoxylon.



ordo II

f. 2.




f. 1.




fig. 1.


Tab. 86.



f. 2.
Lichen pertusus.



f. 3.



Ceratospermum.

Sive κέρας cornu, et σπέρμα semen quasi. Semen cornutum.

16

2






fig. 1


3



Ordo I.

Tab. 60.

Fistulina buglossoides Bulliard
Boletus Hepaticus L.



Ordo II.

Tab. 61.








Fig 1.




F 2.






F2.





*Hydnum
Coralloides*




*Hydnum Oecarium
Gmelin. p. 1439.*





*Hydnum...
Pectiniforme Gmel.
p. 1439.*






p. 8.



2

p. 9.



3

Agar. Lingua Gmel. p. 1429.

p. 9. 9.



4

p. 7.



5

p. 9.
9.

A. Caspitosus Gmel.
pass 11. p. 9. 1429.

A. ochraceus Willd.
prodr. fl. Gerol. n. 1095




6



7

p. 9.

fig. 1. *Peziza auricula* - Vid. Battarr. Tab. 3. F.
 Sed fig. *Michellii* Duplo Major. } *Auricularia tremelloides*
 Bulliard. - *Mesenterica*
 Comelin. p. 1440.





1900

Tremella Nostoc. Linn.

Tab. 67.

Fig. 1.




2

Tremella Verrucosa Lin.

The 67




Small, faint text or markings at the bottom of the page.




f. 2.

f. 1. *Bol. suillus*.




f. 1.




3

f. 2. *B. Rubeolarius* Bulliard.
Vid. Batarr. Tab. 30. fig. A.B.



Faint, illegible handwritten text, possibly a signature or date.



4.
Boletus
Infundibuliformis Gm.
 Sicut et f. 8. & 10.

Boletus coriaceus Scop. var. 1. *Boletus exasperatus*
 Gmelin pars II. p. 1433.






Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a signature or date.




Boletus hirsutus Gmel.

Boletus lacteus Gmel.




Top



18.


1

73



Vism. 7. VI.
p. 334.
et p. 336.
Ag. plicatus,
Ag. Trichopus
Scopoli

f. 4. *Agaricus angulatus*. A. albus pileo plano, margine fimbriato repando-angulari,
Lamellis variis, stipite elongato gracili. Gmelin. p. 1421.



ad Ag. fimevarium Scop.
refert.











John 18






f. 6. 8. *Ag. pileo fuscante-niveo, maculis striatis nigris subquamoso stripe subulato valido*
lamellisq.ue albis. Watsch. et. fung. 81. fig. 27. (B)
Ag. Conspicatus. Wild. prodr. fl. berol. n. 1104 - an distincta spec. satis a cristato?
(Gmel. p. 1419.)





agaricus alliaeus. scopul.





Vitru. Tom. vi.
p. 334



f. c. *A. rosstratus* ,



*et. pileo conico-campyulato striato plumbeo caudis cuculli rudimentis aspero,
lamellis acris, stipite albedo, medio incrassato deorsum subulato. Pinel. p. 1428.*





1

81.



2

Agaricus putridus Scopoli






3

Agaricus prebalus Gmel. p. 1398.



4



Helvella
Gelatinosa
Bulliard.
H. Lubrica Scopoli





I
Phallus Gigas.
Gmelin p. 1448



2
Ph. Undosus. Gmel.
Tom. II. p. 1448.









3
Phallus rete
Gmel. ed. Linn. Tom. II.
pag. 1449.



3

Phallus anastomosis Gmel. ed. Linn.
 part. II. p. 1449. Tom. II.

- f. 1. *Pez. Crucibulum*. Gmel. p. 1454. n. 53.
- f. 2. *Pez. coronata*. Gmel. p. 1455. n. 57.
- f. 3. *Peziza Sceptum*. f. *Depressoglobosa* grisea extrinsecus rugosocostata, ore contracto
vulgarum apicibus dentato, stipite albo elongato distincte inserto,
Gmelin. Pars. II. pag. 1451. n. 6.
- f. 4. 11. *Pez. caliculata*. Gmel. p. 1452. n. 11. *Epidendrum* Bull.
- f. 5. - *Pez. hians*. Gmel. p. 1453. n. 32.
- f. 8. *Helvella brunnea*. Gmel. p. 1450. n. 5.
- f. 9. *Phallus fungoides*. Gmelin. pars. II. tom. II. p. 1448.
- f. 10. *Helvella Tuba*. Gmel. p. 1451.
- f. 12. 13. *Peziza Nucans*. Gmel. p. 1452. n. 14.
- f. 14. - *Pez. conivalis* Gmel. p. 1453. n. 33.
- f. 15. *Pez. Virginea*. Gmel. p. 1453. n. 36. - *Pez. candidissima* ejusd. p. 1454. n. 40.
- f. 16. *Pez. Cruciformis*. Gmel. p. 1453. n. 35.
- f. 18. *Pez. Diadema*. Gmel. p. 1455. n. 62.
- f. 20. *Peziza Cupressi*. Gmel. p. 1454. n. 54.




Helvella infundibuliformis
Scopoli

f. 7. *Cl. cylindrica* Gmel. p. 1445. n. 42.




f. 8. *Clavaria atra*. Gmel. et. noviss. Linn. pars II. p. 1443. n. 3.
Cl. pedunculata Eiusd. p. 1445. n. 43.

f. 10. 11. *Clav. Lumbricalis* Gmelin. p. 1445. n. 44.

f. 13. *Cl. fistulosa* Gmel. p. 1445. n. 33.









Puccinia Halleri
Glaria ~~Villanovi~~ Hill.

Tab. 92¹

fig 1.

Clavaria resinosorum
Gmel. p. 1443. pars II.








f. 2. & 4.

Mucor Mucedo L.






Mucor pag. 90.









95.



Lycogala pag. 90.

Fi.





Mucor paniceus.
Gmel. ed. Linn. p. 1485.









Fig. I
Lycoperdon gemmatum
Gmel. p. 1463.




Lycoperdon perfractum
Gmel. p. 1464.



Lycoperdon lanatum
Gmel. p. 1464.



Lycoperdon muricatum
Gmel. p. 1464.



Lycopodium Caputatum Smel. ed. Linn. novissima
p. 1463. n. 10.

f. 2. Lycopodium ^{Polyrhizon} ~~fruticosum~~ Smel. p. 1464.






Fig. I.




2



Lycosp.
Polyrhizon
Gmel. p. 1462.



3



4




f. 1. *Lycop. Geaster.* Gmel. p. 1468. n. 37.

f. 2. *L. Pedicellatum* Gmel. p. 1468. n. 38.


f. 3. *L. Corollinum* Gmel. p. 1468. n. 40.

f. 4. *L. Multifidum.* Gmel. p. 1468. n. 41.


Fig. 1



2




3




Lycop. coronatum

4



5



6








Fig. 1.



Cyathoides



174

Cypripedium



175

Cypripedium





















Agaric. V. Michel. gen. 177. Tab. 6. Videretur *Fistulina hyglopora*
- des Mull.

a cause d'opinion politique

